



М.Г. Головатин, д.б.н.

# ПТИЦЫ



2.



3.



1.



5.



6.



4.



7.

## 1. ГЛУХАРЬ *Tetrao urogallus*

**Отряд курообразные (Galliformes), семейство тетеревиные (Tetraonidae)**

**Ареал.** Лесная зона, северная граница гнездования – долина р. Таныо (басс. р. Войкар) на Полярном Урале.

**Характерные признаки.** Крупная птица длиной 45–87 см, размах крыльев 87–125 см, вес самцов 2,7–6,5 кг, самок – 1,7–2,3 кг. Оперение самцов темных тонов с белыми пятнами на брюхе, крылья коричневые. Глухарка (копалуха) – серовато-рыжей окраски с многочисленными темными и светлыми пестринами, зоб рыжий, на крыльях и боках тела рыжие перья. Токовая песня своеобразная, состоит из щелкающих и скрежещущих звуков.

**Места обитания.** Самые разные смешанные и хвойные леса, предпочтительно с сосной или кедром.

**Питание.** Зимой – хвоя сосны, кедр и можжевельника, летом – зелень, побеги ягодных кустарничков, бутоны и цветки, ягоды, семена. Во второй половине августа охотно поедают увядающие листья осины, в сентябре – хвою лиственницы. Птенцы в первые дни жизни питаются беспозвоночными.

**Образ жизни.** Оседлая птица. Весной собираются на тока. Гнездо строят на земле, число яиц обычно 5–8. Выводки водит самка, птенцы в возрасте 8–10 дней способны взлетать на деревья высотой до 1 м. Самцы летом (июнь–июль) линяют и прячутся в глухие места. В конце лета совершают вылеты на осины, в сентябре – на лиственницы. Зимой часть птиц совершает сезонные перемещения в сосняки и кедряки.

## 2. ДЯТЕЛ БОЛЬШОЙ ПЕСТРЫЙ *Dendrocopos major*

**Отряд дятлообразные (Piciformes), семейство дятловые (Picidae)**

**Ареал.** Лесная зона от Южного Урала до лесотундры.

**Характерные признаки.** Птица размером с дрозда. Длина 22–27 см, размах крыльев 42–47 см, вес 60–100 г. Окраска черно-белая, подхвостье ярко-красное, у самцов на затылке красное пятно, у молодых птиц все темя красное, у самок верх головы черный.

**Места обитания.** Самые разные, преимущественно смешанные и хвойные леса, особенно предпочитает сосновые древостой.

**Питание.** Основная пища летом – насекомые, которых собирает в основном на стволах деревьев, зимой – семена хвойных, которые добывает из шишек, раздалбливая их в специально устроенных «кузницах».

**Образ жизни.** Преимущественно оседлая птица. Гнездится в дуплах, которые выдалбливает ежегодно. В кладке обычно 5–6 яиц. Молодые птицы осенью широко кочуют.

## 3. КАМЕНКА ОБЫКНОВЕННАЯ *Oenanthe oenanthe*

**Отряд воробьинообразные (Passeriformes), семейство дроздовые (Turdidae)**

**Ареал.** Вся территория Урала.

**Характерные признаки.** Небольшая птичка, меньше воробья. Длина 15–18 см, размах крыльев 28–32 см, вес 18–30 г. У самца верх серый, низ тела светлый с рыжеватым оттенком на груди. «Маска» на глазах и крылья черные. На белом фоне надхвостья и хвоста – черный рисунок в виде перевернутой буквы «Т» на конце. Передвигается по земле быстрыми прыжками с резкими остановками, частыми приседаниями и подергиванием хвостом.

**Места обитания.** Открытые ландшафты: в горах – каменистые россыпи, скалы, выходы камней, в лесной зоне – пустыри, откосы дорог. Охотно селится на окраинах населенных пунктов, строительных площадках, в карьерах.

**Питание.** Питается различными беспозвоночными, хватая их на земле и в воздухе над землей.

**Образ жизни.** Перелетная птица. Прилетает во время схода снега. Гнездится как в естественных укрытиях – пустотах и нишах среди камней, в трещинах земли, под вывалами дернины, так и среди труб, плит, кирпичей и остатков оборудования в местах присутствия человека. В кладке обычно 6 яиц. Насиживает самка. Кормят птенцов оба родителя. Отлет до листопада. Зимует в тропической Африке.

## 4. КАНЮК ОБЫКНОВЕННЫЙ, или САРЫЧ *Buteo buteo*

**Отряд соколообразные (Falconiformes), семейство ястребиные (Accipitridae)**

**Ареал.** Южная половина Урала, на север до южной границы Приполярного Урала.

**Характерные признаки.** Хищная птица несколько крупнее вороны. Длина 46–53 см, размах крыльев 100–130 см, вес 0,5–1,3 кг. Окраска изменчива – от темно-бурой до рыжей и рыжевато-охристой, чаще всего преобладает рыжеватый цвет. В полете на нижней поверхности крыла видно большое светлое поле, которое ближе к краю крыла окантовано темной полосой. Хвост также светлый, с темной полосой по краю. Глаза коричневые. Часто парит в воздухе. Голос – протяжный, гнусавый, нудный крик. Слово «канючить» (неотвязно ныть, плакаться, просить) происходит именно от голоса этой птицы.

**Места обитания.** Самые разные леса, перемежающиеся с открытыми пространствами: полями, пойменными лугами, вырубками, большими полянами.

**Питание.** Самая разнообразная животная пища. Преобладают полевки, мыши, при их отсутствии – лягушки, ящерицы, мелкие птицы или птенцы, насекомые, черви, моллюски.

**Образ жизни.** Прилетает незадолго до полного схода снега. Гнездо крупное, из сучьев, расположено на дереве. В гнезде обычно 2–4 яйца. Улетает на юг в сентябре. Мигрируют до ближайших бесснежных или малоснежных районов.

## 5. КЕДРОВКА *Nucifraga caryocatactes*

**Отряд воробьинообразные (Passeriformes), семейство врановые (Corvidae)**

**Ареал.** Лесная зона от горных лесов Южного Урала до р. Войкар (Полярный Урал). Наиболее обычна в местах произрастания кедр.

**Характерные признаки.** Большеклювая птица размером с сойку. Длина 27–38 см, размах крыльев 50–61 см, вес 120–200 г. Окраска темно-бурая с многочисленными каплевидными белыми пятнами. Шапочка и крылья темные, подхвостье и полоса по краю хвоста белые.

**Места обитания.** Различные хвойные леса, предпочтительно с участием кедр.

**Питание.** Кормится кедровыми орехами, а также семенами других хвойных, беспозвоночными, яйцами и птенцами мелких птиц. Зимой охотно поедает падаль и различные отбросы.

**Образ жизни.** Оседлая птица. Гнездование начинается еще при полном снежном покрове. Гнездо устраивает на дереве – большое, из тонких веточек, лишайников, волокон луба, травы и другого растительного материала. В кладке обычно 3–4 яйца. После вылета молодых широко кочуют в поисках кедровых орехов. Орехи заготавливают. Шишки расклеивают, набивают орехами подвязочный мешок и прячут в лесную подстилку. Способствуют произрастанию кедр.

## 6. КОНЕК ЛУГОВОЙ *Anthus pratensis*

**Отряд воробьинообразные (Passeriformes), семейство трясогузовые (Motacillidae)**

**Ареал.** Северная половина Урала к северу от линии Кизел–Новая Ляля.

**Характерные признаки.** Небольшая птичка, меньше воробья. Длина 15–19 см, размах крыльев 25–28 см, вес 14–24 г. Верх тела оливково-серый с темными пестринами, низ тела беловатый с густыми продольными пестринами на зобу, груди и боках. От лесного конька отличается отсутствием четкой темной уздечки между глазом и клювом и длинным, слабо изогнутым когтем заднего пальца, от краснозобого конька – отсутствием четких пестрин на поясице и надхвостье.

**Места обитания.** Открытые ландшафты с низкорослой растительностью, часто с отдельными деревьями и кустами кустарников. От более к менее предпочтительными: кустарниковые и травянистые тундры – травяно-моховые тундры – каменистые тундры – разреженные кустарники – каменистые россыпи – редины.

**Питание.** Питается на земле различными беспозвоночными.

**Образ жизни.** Перелетная птица. Зимует на юге Европы, в Центральной Азии и Закавказье. Прилетает рано – при частичном снеговом покрове. Гнездится на земле. В кладке обычно 4–6 яиц. Насиживает самка. Кормят птенцов оба родителя. Отлет с конца августа до середины октября.

## 7. КУКУШКА ОБЫКНОВЕННАЯ *Cuculus canorus*

**Отряд кукушкообразные (Cuculiformes), семейство кукушки (Cuculidae)**

**Ареал.** Почти вся территория Урала, на север до р. Сось (Полярный Урал), в предгорьях несколько севернее – до последних лесных участков.

**Характерные признаки.** Птица размером с дрозда, но из-за длинного хвоста кажется больше. Длина 32–34 см, размах крыльев 55–65 см, вес 80–190 г. Верх тела и зоб серые, брюхи и бока белые с поперечными серыми полосами. У самок присутствует рыжеватый оттенок. Ноги короткие, глаза оранжевые или желтые. От глухой кукушки отличается цветом перьев на сгибе крыла – белыми с темными полосками. Голос самца – характерный громкий повторяющийся двусложный крик, а также глухое хлопанье. Брачный крик самки – звонкое улюлюканье.

**Места обитания.** Различные типы леса и кустарники, предпочитает редины и редколесья, тайги избегает.

**Питание.** Различные беспозвоночные, в том числе волосатые гусеницы, а также ягоды и яйца мелких воробьиных птиц.

**Образ жизни.** Перелетная птица. Зимует в Африке, к югу от Сахары. Прилетает одной из последних птиц. Гнездовой паразит — яйцо подкладывает в гнезда мелких воробьиных птиц, которые и выкармливают птенца. Отлет взрослых на юг в июле.

## 8. КУРОПАТКА ТУНДРЯНАЯ

*Lagopus mutus*

**Отряд курообразные (Galliformes),  
семейство тетеревиные (Tetraonidae)**

**Ареал.** К северу от г. Конжаковский Камень.

**Характерные признаки.** Несколько крупнее голубя, длина 34–36 см, размах крыльев 54–60 см, вес 400–550 г. От белой куропатки отличается небольшим клювом — высота его у основания меньше 9,3 мм. Окраска меняется в течение года: зимой — белая с черной полоской от клюва через глаз, весной (с середины июня) из-за появления темных перьев выглядит пестрой, летом и осенью (до начала октября) — охристо-серая с темным поперечным рисунком на перьях, грязно-белым брюхом и белыми маховыми на крыльях. Токовая песня самца состоит из серии негромких трещащих «деревянных» звуков.

**Места обитания.** Открытая гористая местность с выходами основных пород — от песчаных и щебнистых обнажений до каменистых тундр и россыпей, с обязательным наличием пятячковых моховой, лишайниковой или травянистой растительности. Встречается также в сухих парковых древостоях с нагромождениями камней.

**Питание.** Побеги и почки кустарников, сережки ольхи и карликовой березки, ягоды, цветы. Птенцы в первые дни жизни питаются беспозвоночными.

**Образ жизни.** Оседлая птица. Очень доверчива — легко подпускает на 20–30 м; к самке, сидящей на гнезде, можно подойти вплотную. Число яиц обычно 6–9. С выводком чаще ходит самка, самец находится неподалеку в нескольких сотнях метров. В недельном возрасте птенцы способны перепархивать. Зимой стайки держатся на вершинах гор выше границы леса.

## 9. НЕЯСЬТЬ БОРОДАТАЯ *Strix nebulosa*

**Отряд совообразные (Strigiformes),  
семейство совиные (Strigidae)**

**Ареал.** Лесная зона от заповедника «Шульган-Таш» (Южный Урал, Башкортостан) до южной границы Полярного Урала.

**Характерные признаки.** Крупная темно-серая сова с многочисленными темными и светлыми пестринами. Глаза желтые. На лицевом диске четкие концентрические круги, под клювом — черное пятно («борода»). Длина 63–70 см, размах крыльев 130–158 см, вес 0,6–1,9 кг. Брачный крик — серия глухих, низких, гукающих звуков.

**Места обитания.** Спелые и перестойные смешанные леса с открытыми пространствами: лугами, болотами, гарями, вырубками.

**Питание.** Мелкие грызуны, реж — небольшие птицы, лягушки.

**Образ жизни.** Оседлая птица. Брачный период начинается в марте-апреле. Гнездятся в старых гнездах канюков и других хищных птиц, на высоких обломках старых деревьев, густых «ведьминых метлах». В кладке обычно 4–5 яиц. Насиживает самка, самец ее кормит. Взрослые у гнезда очень агрессивны. В годы депрессии грызунов широко кочуют. Особо охраняемый вид, занесена в Региональные Красные книги.

## 10. НЕЯСЬТЬ ДЛИННОХВОСТАЯ, или УРАЛЬСКАЯ *Strix uralensis*

**Отряд совообразные (Strigiformes),  
семейство совиные (Strigidae)**

**Ареал.** Лесная зона от южной границы Челябинской обл. до р. Большая Сыня (Приполярный Урал, Республика Коми).

**Характерные признаки.** Крупная серая сова с многочисленными темными и светлыми продольными пестринами. Глаза черные. Длина 50–62 см, размах крыльев 114–134 см, вес 0,4–1,3 кг. От серой неясыти отличается длинным хвостом и отсутствием поперечного волнистого рисунка на нижней стороне тела. Брачный крик — три глухих двусложных звука.

**Места обитания.** Различные типы леса, предпочитает спелые смешанные, труднопроходимые леса с полянами, болотами и гарями.

**Питание.** Полевки, лесные мыши, бурундуки, белки, реж — мелкие птицы, лягушки.

**Образ жизни.** Оседлая птица. Брачный период начинается в марте. Гнездятся в старых гнездах канюков, ястребов, реж — в просторных полудуплах и дуплах, еще реж — на земле под прикрытием выворотня или еловых лап. В кладке обычно 3–4 яйца. Насиживает самка, самец ее кормит. Активность преимущественно сумеречная. В годы депрессии грызунов широко кочуют.

## 11. ОЛЯПКА

*Cinclus cinclus*

**Отряд воробьинообразные (Passeriformes),  
семейство оляпковые (Cinclidae)**

**Ареал.** Горные районы в пределах сплошного распространения лесов от Южного Урала до р. Таныу (Полярный Урал).

**Характерные признаки.** Коренастая, короткохвостая птица размером с дрозда. Длина 17–20 см, размах крыльев 25–30 см, вес 50–85 г. Окраска темно-бурая с ярко-белым «передником».

**Места обитания.** Небольшие быстрые речки и ручьи с лесом или кустарником по берегам.

**Питание.** Добывает личинок и взрослых беспозвоночных, ныряя в воду.

**Образ жизни.** Полуоседлая птица. В гнездовой период селятся обособленными парами. Гнездо недалеко от воды, в расщелинах и нишах на скалах, под обрывистым берегом, в полостях между корнями. Имеет вид неправильного шара, размером с футбольный мяч, с боковым входом. Состоит из травы, мха, корешков, водорослей. В кладке обычно 5 яиц. Насиживает только самка. Осенью молодые разлетаются. Зимуют на незамерзающих участках рек, где могут собираться как местные птицы, так и прилетевшие из других районов.

## 12. ПЕНОЧКА-ВЕСНИЧКА

*Phylloscopus trochilus*

**Отряд воробьинообразные (Passeriformes),  
семейство славковые (Sylviidae)**

**Ареал.** Вся территория Урала.

**Характерные признаки.** Мелкая птичка. Длина 12–20 см, размах крыльев 18–24 см, вес 6–11 г. Окраска верха оливково-бурая, с зеленоватым оттенком, снизу — буровато-белая. От теньковки отличается светлыми ногами, от таловки, зарнички и зеленой пеночки — отсутствием светлых полосок на крыльях.

**Места обитания.** Придерживается разреженных древостоев, высокорослых кустарниковых зарослей или открытых участков с большими группами кустарников. Выбирает сухие или умеренно увлажненные места. Крупных лесных массивов избегает и селится по их краю.

**Питание.** Питается различными беспозвоночными, предпочитая мягких гусениц.

**Образ жизни.** Перелетная птица. Прилетает в разгар весны. Гнездо расположено на земле, имеет форму шалашка из травы и мха, наполовину погружено в толщу лесной подстилки. Изнутри обильно выстлано перьями разных птиц. В кладке обычно 5–7 яиц. Насиживает самка. Выкармливают птенцов оба родителя. Отлет на зимовки в августе. Зимует в экваториальной и Южной Африке.

## 13. ПУХЛЯК, или ГАЙЧКА БУРОГОЛОВАЯ

*Parus montanus*

**Отряд воробьинообразные (Passeriformes),  
семейство синицевые (Paridae)**

**Ареал.** Территория Урала к северу до р. Шучья (Полярный Урал).

**Характерные признаки.** Мелкая птичка. Длина 12–14 см, размах крыльев 16–22 см, вес 9–14 г. Верх буровато-серый, низ беловатый. На голове черная шапочка и черное горловое пятно. Позывка перекликающихся птиц — жужжащие звуки, песня — неторопливые меланхоличные свисты.

**Места обитания.** Самые различные леса, на севере — пойменные.

**Питание.** Различные беспозвоночные, которых разыскивает на ветвях и стволе деревьев, а также семена хвойных и др. растений.

**Образ жизни.** Оседлая птица. Пение начинается в конце января — феврале, устройство гнезд — между сходом снега и первой зеленью. Гнездится в дуплах, которые выдалбливает сама в подгнивших или упавших стволах небольших лиственных деревьев. В кладке обычно 6–8 яиц. Насиживает самка. Кормят птенцов оба родителя. Запасают корм круглый год, устраивая небольшие тайники в щелях коры и других укромных местах. Зимой держатся небольшими стайками.

## 14. РЯБЧИК

*Tetrastes bonasia*

**Отряд курообразные (Galliformes),  
семейство тетеревиные (Tetraonidae)**

**Ареал.** Лесная зона к северу до р. Собы на Полярном Урале.

**Характерные признаки.** Немного крупнее голубя. Длина 35–37 см, размах крыльев 48–54 см, вес 300–500 г. Окраска пестрая, общий тон — серый, на крыльях и боках тела — рыжие перья. На груди — темные пестрины, у самцов на горле черное пятно, на конце округлого хвоста — черная полоса. Песня — тонкая свистовая трель.

8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.





15.



16.



17.



18.



19.



20.

**Места обитания.** Самые разные леса, предпочитает смешанные древостой вдоль рек и ручьев, с развитым подростом и подростом.

**Питание.** Зимой – почки и сережки ольхи, березы и осины, летом – зелень, бутоны и цветки, ягоды. Птенцы в первые дни жизни питаются беспозвоночными.

**Образ жизни.** Оседлая птица. Рябчики живут в парах и чаще всего – на отдельных индивидуальных территориях. Гнездо на земле в укрытых местах. Число яиц обычно 7–9. Уже в возрасте 2–3 дней птенцы способны вспархивать на ветки высотой до 1 м.

### 15. СВИРИСТЕЛЬ *Bombicilla garrulus*

**Отряд воробьинообразные (Passeriformes), семейство свиристелевые (Bombicillidae)**

**Ареал.** Лесная зона к северу от г. Нижний Тагил до границ распространения лесов.

**Характерные признаки.** Плотная птица размером со скворца, с характерным хохолком, зачесанным назад. Длина 19–23 см, размах крыльев 30–38 см, вес 40–85 г. Общий тон окраски коричневатого-серый. На горле черное пятно. На конце хвоста – желтая полоса. Кончики первостепенных маховых перьев желтовато-белые. На кончиках второстепенных маховых перьев – красные блестяшки. Голос – серебристая трель.

**Места обитания.** Разреженные хвойные и смешанные леса таежного типа, с подростом.

**Питание.** Летом питается насекомыми, остальную часть года – ягодами.

**Образ жизни.** Кочующая птица. В гнездовой период свиристели селятся обособленными парами. Гнездится на деревьях. В кладке обычно 4–5 яиц. После вылета молодых свиристели образуют стаи, которые зимой достигают сотен и даже тысячи птиц. Широко кочуют в поисках ягод и появляются за пределами гнездовой области, залетая в населенные пункты. Размах кочевков зависит от урожая ягод, в первую очередь – рябины.

### 16. ТРЯСОГУЗКА ГОРНАЯ *Motacilla cinerea*

**Отряд воробьинообразные (Passeriformes), семейство трясогузковые (Motacillidae)**

**Ареал.** Вдоль Урала от южной границы Челябинской области до р. Собь (Полярный Урал).

**Характерные признаки.** Длиннохвостая птица, меньше воробья. Длина 18–20 см, размах крыльев 25–27 см, вес 14–25 г. Верх тела серый, поясница и надхвостье зеленовато-желтые. Низ тела желтый. У самца есть черный «галстук». На раскрытом крыле – белая полоска.

**Места обитания.** Берега небольших рек (до 50–60 м шириной) и ручьев.

**Питание.** Кормится на земле мелкими беспозвоночными.

**Образ жизни.** Перелетная птица. Зимует на юге Азии. Гнездится в скальных нишах, на строениях, выворотнях, на земле под прикрытием растительности, среди камней, корней. В кладке обычно 5–6 яиц. Насиживание 12–14 дней, птенцы начинают летать в возрасте около 17 дней.

### 17. ФИФИ *Tringa glareola*

**Отряд ржанкообразные (Charadriiformes), семейство ржанковые (Charadriidae)**

**Ареал.** Почти вся территория Урала до Оренбургской области на юге. Наиболее обычна в северных районах.

**Характерные признаки.** Стройный длинноногий кулик размером со скворца. Длина 19–21 см, размах крыльев 36–40 см, вес 52–96 г. Верх буровато-серый с белыми пестринами, низ белый с темными пестринами на груди и боках. Поясница и надхвостье белые. От черныша отличается длиной, заходящей за глаза светлой бровью и светлыми подкрыльями.

**Места обитания.** Различные открытые ландшафты, включая редколесья и заросли кустарников при обязательном наличии небольших водоемов со стоячей водой, заросших по берегам кустарниковой и травянистой растительностью.

**Питание.** Различные беспозвоночные.

**Образ жизни.** Перелетная птица. Зимуют в Африке и Южной Азии. Прилетают в мае. Гнездо с толстой растительной выстилкой под прикрытием травы или куста. Иногда гнездятся на деревьях, в старых дроздовых гнездах. В кладке обычно 4 яйца. Насиживают оба родителя. При выводках ведут себя очень беспокойно и крикливо. Улетают в августе-сентябре.

### 18. ХРУСТАН *Eudromias morinellus*

**Отряд ржанкообразные (Charadriiformes), семейство ржанковые (Charadriidae)**

**Ареал.** Гнездится к северу от г. Конжаковский Камень (Северный Урал), летом отмечен на хр. Ирмель и Ямантау (Южный Урал).

**Характерные признаки.** Коренастый кулик размером с дрозда. Длина 20–22 см, размах крыльев 57–64 см, вес 75–150 г. Общий тон окраски серовато-песочный, на голове темная шапочка, окаймленная белой полосой. Нижняя часть тела рыжая, брюшко темно-бурое.

**Места обитания.** Выровненные участки каменных тундр в сочетании с лишайниковыми или кустарничково-моховыми тундрами выше границы леса.

**Питание.** Различные беспозвоночные.

**Образ жизни.** Перелетная птица. Зимует на севере Африки и Ближнем Востоке. Токует самка, совершая полеты на высоте до 300 м и издавая односложные сигналы. В кладке обычно 3 яйца. Насиживает и водит птенцов самец. Самки после выплупления птенцов обычно улетают, собираются в стайки и широко кочуют, продвигаясь к югу. Очень доверчивы и подпускают на несколько шагов, отчего в народе получили название «глупая свика».

### 19. ЧЕЧЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ *Acanthis flammea*

**Отряд воробьинообразные (Passeriformes), семейство вьюрковые (Fringillidae)**

**Ареал.** Северная половина Урала, включая Средний Урал.

**Характерные признаки.** Мелкая птичка. Длина 12–15 см, размах крыльев 19–23 см, вес 9–19 г. Верх серый с продольными темными пестринами, поясница и низ тела – беловатые с пестринами на груди и боках. Лоб красный, у самцов бывает красный цвет на щеках и груди. Горло – черное.

**Места обитания.** Самые различные леса с преобладанием хвойных пород, а также заросли кустарников.

**Питание.** Птенцов кормит мелкими насекомыми и семенами осок, пушиц, перенося их в зобе. Осенью и зимой основа рациона – семена берез, ольхи, хвойных, трав. Различные беспозвоночные, которых разыскивает на ветвях и стволе деревьев, а также семена хвойных и других растений.

**Образ жизни.** Кочующая птица. Размножаться начинают рано, еще при сплошном снеговом покрове. Охотно селятся колониями из нескольких пар. Гнездо на деревьях или в кустах в виде толстостенной чаши из тонких веточек, мха, растительного пуха, лоток обильно выстлан шерстью, перьями или растительным пухом. В кладке обычно 4–5 яиц. Насиживает самка, самец ее кормит. После вылета молодых широко кочуют. Часть пар приступает ко второму гнездованию. Отлет кочующих стаяк – в сентябре-октябре, часть стаяк держится всю зиму, перекочевывая с места на место.

### 20. ЩУР *Pinicola enucleator*

**Отряд воробьинообразные (Passeriformes), семейство вьюрковые (Fringillidae)**

**Ареал.** Северный, Приполярный и Полярный Урал.

**Характерные признаки.** Коренастая птица размером со скворца. Длина 20–24 см, размах крыльев 27–35 см, вес 40–65 г. Самец карминно-красный, наиболее ярко окрашены голова и грудь. У самки голова и грудь желто-оранжевые с примесью золотистого, спина, бока и живот зеленовато-серые. От сходных по окраске клестов отличается обычной (неперекрещенной) формой клюва и более длинным хвостом. Голос – негромкие флейтовые свисты.

**Места обитания.** Хвойные и смешанные леса с примесью ели.

**Питание.** В питании взрослых птиц преобладает растительная пища: почки, бутоны цветов, молодые листья, ягоды, семена хвойных. Птенцов выкармливают, помимо растительной пищи, насекомыми. Корм носят в зобе.

**Образ жизни.** Кочующая птица. Пары формируются во время кочевок, зимой и весной. Гнездятся в июне – июле. Гнездо обычно устраивают на ели или лиственнице на высоте 1–4 м. Оно аккуратно свито из тонких травинок, снаружи – с добавлением небольших веточек и корешков, в лотке иногда присутствует лосинный или олений волос. В кладке обычно 3–4 яйца. Насиживает самка, самец ее кормит. После вылета молодых широко кочуют небольшими стайками. Иногда долетают далеко на юг, вплоть до степей.