

Д О К Л А Д Ы
АКАДЕМИИ НАУК СССР

1974

т. 219, № 2

УДК 591.105+597.6

ЭКОЛОГИЯ

Г. Г. РУНКОВА, В. Н. МАКСИМОВ, Л. А. КОВАЛЬЧУК,
И. М. ХОХУТКИН

ЭНДОГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ОКСИДАЗ И ИХ РЕАКЦИЯ
НА ТИРОКСИН В ГОМОГЕНАТАХ ДВУХ МОРФ BRADYBAENA
FRUTICUM (MÜLL.) В УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУР

(Представлено академиком С. С. Шварцем 23 VII 1974)

При изучении экологической природы динамического полиморфизма широко используют такой подход, как поиск корреляции между частотой появления определенных генотипов в естественных популяциях и сменой климатических условий их обитания (¹, ⁵, ⁷, ⁹). По-видимому, не менее перспективным при исследовании той же проблемы является изучение биохимической специфики адаптаций отдельных генотипов к определенным факторам среды в лабораторных условиях. Экспериментальная оценка энергетической стоимости этих адаптаций, типичных для каждого из генотипов, может подсказать новые пути для изучения полиморфизма как приспособления надорганизменного популяционного характера.

В настоящей работе представлены результаты сравнительного изучения эндогенной активности оксидаз и их реакции на тироксин в гомогенатах полосатых и бесполосых морф *Bradybaena fruticum* при температуре +15, +8, 0 и -8° С.

Моллюски (48 экз.), использованные в опытах, собраны в районе г. Сапапула. Гомогенаты готовили из мышц ноги взрослых особей из расчета 20 мг ткани на 1 мл трис-буфера. Об эндогенной активности оксидаз судили по степени ингибирования «тетразоловой реакции» кислородом воздуха с помощью параллельного определения интенсивности восстановления 2,3,5-трифенилтетразолхлорида при инкубации гомогенатов в атмосфере аргона и в атмосфере воздуха (³). Тироксин в дозе 0,45 мг/кг вводили непосредственно в гомогенат. Опыты ставили по плану полного факторного эксперимента типа 2²×4, определялась степень ингибирования «тетразоловой реакции» кислородом воздуха (TTX аргон/TTX воздух) в гомогенатах полосатых и бесполосых морф Br. fruticum (X₁) при введении тироксина и без него (X₂) у животных, предварительно выдержаных в условиях разных температур (X₃). Расчет коэффициентов регрессии проводился по схеме Ятса (²). Значимость коэффициентов регрессии определялась методом построения полувероятностного графика (⁶, ⁸).

Статистический анализ полученных данных (рис. 1) показывает, что полосатые морфы Br. fruticum достоверно различаются по эндогенной активности оксидаз и их чувствительности к испытанной дозе тироксина. При этом различия между морфами зависят от температурного фактора. Уравнение регрессии имеет вид

$$y = 2,156 - 0,194X_1 + 0,449X_2 - 0,156X_1X_2 - 0,061X_2X_3^2 + \\ + 0,430X_1X_2X_3 - 0,0525X_1X_2X_3^3.$$

Экспериментальные и полученные с помощью уравнения расчетные данные представлены на рис. 2. На рисунке хорошо видно, что на понижение температуры полосатые и бесполосые морфы реагируют либо понижением, либо повышением эндогенной активности оксидаз.

При этом наблюдается явная корреляция между изменениями в исходном уровне интенсивности окислительно-восстановительных процессов и их чувствительностью к тироксину. При наличии высокой активности ферментов чувствительность к испытанной дозе гормона исчезает и, напротив, резкое понижение активности оксидаз при охлаждении сопровождается значительным повышением чувствительности к гормону. Создается впечатление, что исследованная популяция *Br. fruticum* обладает двумя различными биохимическими механизмами адаптации к холodu, которые




Рис. 1

Рис. 1. Полувероятностный график, построенный на основе данных статистического анализа полученных результатов




Рис. 2

Рис. 2. Эндогенная активность оксидаз и их реакция на тироксин в гомогенатах бесполосых (а) и полосатых (б) морф *Br. fruticum* в условиях разных температур. I – результаты, рассчитанные по уравнению; 2 – результаты, полученные в эксперименте при изучении гомогенатов, не содержащих тироксин; 3 – то же в гомогенатах с тироксином; I – расчетная кривая для гомогенатов с тироксином; II – то же для гомогенатов без тироксина

связаны с обратной корреляцией между эффективностью энергетического обмена и его чувствительностью к регуляторным сигналам. Данные показывают (рис. 2), что несмотря на наличие в морфах обоих гипотетических механизмов адаптации к холodu, у бесполосого генетического варианта преобладающим является понижение активности оксидаз, коррелирующее с ярко выраженной реакцией на тироксин (при 8° и -8°). У полосатого генетического варианта этот тип адаптации выражен слабее и в условиях изученного диапазона температур проявляется реже (при 0°). Возможно, преобладание одного из генотипов в естественных популяциях *Br. fruticum* (') связано с различной энергетической стоимостью обнаруженных нами биохимических механизмов адаптации к охлаждению.

Институт экологии растений и животных
Уральского научного центра
Академии наук СССР
Свердловск

Поступило
23 VII 1974

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Э. Майр, Зоологический вид и эволюция, М., 1968, стр. 267. ² В. Максимов, В. Д. Федоров, Применение методов математического планирования экспериментов при отыскании оптимальных условий культивирования микроорганизмов, М., 1969. ³ Г. Г. Рункова, Н. Ф. Завада, В. В. Купцова, Экология, № 3 (1974). ⁴ И. М. Хохуткин, Экология, № 4 (1971). ⁵ С. С. Шварц, Эволюционная экология животных, Свердловск, 1969, стр. 67. ⁶ J. Good, J. Statist. Soc., Ser. B, 20 (1958). ⁷ M. Lamotte, Heredity, v. 6, 3 (1952). ⁸ B. Margolin, Technometrics, v. 9, 2 (1967). ⁹ H. Wolda, J. Animal Ecol., v. 38, 3 (1969).