Материалы к распространению ПТИЦ на Урале, в Приуралье и Западной Сибири

Российская академия наук
Уральское отделение
Институт экологии растений и животных
Уральское орнитологическое общество

МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ НА УРАЛЕ, В ПРИУРАЛЬЕ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Сборник статей

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2004

УДК 598.2:591
М 341

Ответственный редактор:
доктор биологических наук
В. К. Рябицев

М 341 **Материалы** к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири: Сб. статей и кратких сообщ. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. — с.

ISBN 5-7525-1300-6

Девятый выпуск сообщений с новыми данными о местах гнездования, зимовки, путях миграций и залетах птиц, статьями с полным обзором орнитофауны отдельных территорий.

Сборник предназначен для орнитологов, биогеографов, преподавателей биологических факультетов, любителей птиц.

© Коллектив авторов, 2004
© Оформление. В. К. Рябицев, Издательство УрГУ, 2004
© Издательство Уральского университета, 2004

ISBN 5-7525-1300-6

ОТ РЕДАКТОРА

Предлагаем вниманию коллег очередной — девятый выпуск нашего сборника. Его содержание в общем традиционно: большая часть сообщений это новые данные о распространении птиц тех или иных видов в том или ином районе нашего региона, составляющего около четверти территории России. Есть несколько обзоров, написанных на основании одного, нескольких или даже многих полевых сезонов. Следует отметить, что большинство исследований проведено в тех же географических пределах, где авторы работали раньше. Проявляется известная закономерность: даже многолетние исследования не дают исчерпывающей картины о фаунистическом составе района, каждый новый сезон приносит что-то еще: новые виды в фауне, уточнения и поправки к картам ареалов, новое в путях пролета и местах зимовки, подтверждаются или опровергаются высказанные ранее предположения о статусе того или иного вида. Все это говорит о том, что даже в хорошо изученной местности всегда есть что делать. Занятие фаунистикой вовсе не обязательно предполагает путешествия в неизученные районы.

Свежие исследования на п-ове Ямал, одной из наиболее изученных территорий нашей страны, позволили найти там в качестве обычного гнездящегося вида сибирского конька, которого много лет там не находили. Зима 2003–2004 гг. — мягкая, с богатым урожаем рябины — позволила юркам зимовать на Среднем и даже Северном Урале, чего «не помнят старожилы». Севернее обычного встречен зимняк, доказав в очередной раз, что не зря носит это имя. Зарегистрированы новые залеты таких южан как кваква, желтая цапля, фламинго, стервятник.

На нашей карте появились новые орнитологические стационары. Точнее — опубликованы полные обзоры по территориям, где изучение птиц проводится много лет. О. В. Тарасов написал такой обзор по Восточно-Уральскому заповеднику. Еще одним орнитологическим стационаром теперь надо считать национальный парк «Припышминские боры»: В. А. Коровин подготовил к печати статью трагически погибшего А. К. Жукова и приводит результаты собственных исследований, а стационарные исследования продолжает сын А. К. Жукова — А. А. Жуков.

В нашем сборнике есть новые сообщения из «белых пятен» —

оттуда, где орнитологи не были никогда или были очень давно. Т. К. Блинова с соавторами в 2004 г. провела исследования в совершенно не изученном среднем течении р. Васюган. В малоизученном центре Курганской области провел успешный сезон В. В. Тарасов с коллегами. Мне с молодыми коллегами удалось очень интересно поработать в районе Сибирских Увалов — на рубежах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. По малоизученному Гыданскому п-ову приводят новые данные П. М. Глазов и А. Е. Дмитриев. Обзор неворобьиных прислала Н. М. Головина по почти не затронутому фаунистическими исследованиями северо-востоку Кемеровской области.

Обширных «белых пятен» в нашем регионе еще очень много. Чтобы спровоцировать коллег на их обследование, я опубликовал в нашем выпуске 2001 г. специальную аналитическую статью с картой изученности региона. Хочется надеяться, что эта карта, призывно зияющая пустотами, в ближайшие сезоны сможет кого-то спровоцировать на поездку в совсем новые и не исследованные места, и в очередных выпусках мы сможем напечатать эти материалы.

Север Казахстана тоже относится к Западной Сибири, а потому публикации по этим территориям постоянно привлекают наше внимание. У нас в сборниках регулярно появляются материалы по казахстанскому югу «нашего региона». Есть они и в нынешнем выпуске. Но казахстанцы и сами в последнее время активно публикуют свои орнитологические новости — большей частью в журнале «Селевиния», в «Русском орнитологическом журнале» и в новом (2002, 2003) «Казахстанском орнитологическом бюллетене», где, кстати, есть материалы и по пограничному с Казахстаном Оренбуржью.

В каждом нашем выпуске можно найти новые авторские фамилии. Это радует, потому что это и есть реальное воплощение эстафеты поколений и есть надежда на продолжение и расширение орнитологических исследований. Но с новыми именами довольно часто бывают связаны старые проблемы — недостаток опыта, а потому — ошибки. Иногда приходится убеждаться в том, что «трудные» виды — это не только традиционно считающиеся таковыми — к примеру, мелкие песочники, сверчки и камышовки. Вполне естественно, что чем меньше у наблюдателя опыта, тем шире спектр «трудных» видов, в определении которых он может ошибаться. Но

бывают и совершенно неожиданные ошибки. Мне как редактору с этим приходится сталкиваться постоянно, и я еще раз прошу прощения у авторов за навязчивые вопросы, а у читателей — напротив — за то, что бываю недостаточно придирчив к авторам и пропускаю в печать то, что потом оказывается сомнительным, а то и ошибочным. Приходится в оправдание приводить старую верную формулу: от ошибок не застрахован никто. И еще призвать коллег — не только молодых и малоопытных — смелее сомневаться и чаще себя проверять. Это не только борьба за качество информации, но и главный фактор накопления опыта, который в нашем деле лишним не бывает.

Желаем всем успешного нового полевого сезона, интересных встреч с птицами и всего самого доброго! Ждем сообщений в следующий, юбилейный — 10-й выпуск. Правила для авторов опубликованы в конце сборника.

Спасибо всем нашим авторам за соучастие в сборнике, а Н. С. Алексеевой и В. В. Тарасову — еще и за помощь в редакционных делах.

В. Рябицев

ОКОЛОВОДНЫЕ ПТИЦЫ ОЗЕРА АЙКЕ НА ВОСТОКЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 2004 ГОДУ

Е. В. Барбазюк

Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144. E-mail: bev@mail.esoo.ru; argentatus99@yandex.ru

Изучение орнитофауны Восточного Оренбуржья продолжается мной с 1999 г. (Барбазюк 2000, 2001, 2002, 2003). В 2004 г. стационарные наблюдения проводились в апреле–июне на озере Айке (50°58' с. ш., 61°30' в.д).

Гидрологические условия этого года характеризовались очень высоким подъемом уровня воды в озерах Восточного Оренбуржья, сравнимым по масштабам с разливом 2002 г. Это благоприятно сказалось на размножении некоторых рыбоядных видов птиц, поскольку запас карася в озерах сохранился за зиму и заметно вырос. В то же время, сильный разлив отрицательно отразился на размножении некоторых других околоводных видов, например, **шилоклювки** *Recurvirostra avosetta*, в результате затопления кормовых биотопов (песчаные мелководья) и сокращения гнездовых биотопов. Наиболее привлекательным местом гнездования и отдыха по-прежнему оставалась обширная песчаная коса, вдающаяся в озеро примерно на 1,3 км, подтопленная у основания и превращенная, таким образом, в длинный остров. В этом году из-за сильного разлива на поверхности оставались лишь возвышенные части этого острова–косы. Ниже приводится аннотированный список некоторых околоводных видов, встреченных на озере Айке.

Кудрявый пеликан *Pelecanus crispus*. Регулярно встречались на озере 10–15 птиц. Не гнездились. Часто пеликанов отмечали вместе с бакланами на острове-косе.

Большой баклан *Phalacrocorax carbo.* Регулярно встречались на озере. Постоянное место ночевки находилось на дальней оконечности острова–косы, а 10 июня там было обнаружено 25 конусовидных построек с кладками по 2–4 яйца.

Огарь *Tadorna ferruginea.* Численность по-прежнему оставалась высокой. Отмечались скопления до 150 отдыхающих птиц на берегах озера.

Шилоклювка *Recurvirostra avosetta.* За весь период наблюдений встречена только одна пара. Предполагается, что вид не загнездился из-за разрушения в первую очередь кормовых стаций, а также отсутствия в начале лета подходящих гнездовых биотопов из-за разлива.

Черноголовый хохотун *Larus ichthyaetus.* Сильный разлив и обширная кормовая база (карась) благоприятно сказались на численности этого вида. На оконечности острова–косы 29 апреля насчитывалось уже 207 гнезд, а 10 июня лишь в 12 гнездах сохранились яйца, в то время как в основной массе гнезд птенцы уже вылупились и хорошо бегали, сбиваясь в тесную группу при опасности.

Малая чайка *L. minutus.*Скопления по 60–70 птиц, перелетающих над водой, отмечались 4 мая. Гнезд не найдено.

Озерная чайка *L. ridibundus.* В большом заливе, неподалеку от острова-косы, 10 июня обнаружена колония в скоплениях молодого тростника. Я насчитал 88 гнезд, в 10–12 гнездах были птенцы.

Хохотунья *L. cachinnans.* На острове–косе 29 апреля насчитывалось не менее 70 гнезд этого вида, в кладках преобладало по 3 яйца. К концу мая число гнезд увеличилось как минимум вдвое, и в середине июня уже можно было найти хорошо оперенных, но еще не летающих птенцов.

Чайконосая крачка *Gelochelidon nilotica.* Примерно 170 птиц регулярно собирались на ночевку на острове с третьей декады апреля. Загнездились они только в середине мая, первые птенцы появились 5–6 июня. На начало вылупления первых птенцов было не менее 260 гнезд.

Чеграва *Hydroprogne caspia.* Несколько пар регулярно встречались вдоль затопленных травяных берегов озера, где они охотились за рыбой. Одно гнездо с 2–3 дневным птенцом было найдено 10 июня на краю большой колонии чайконосых крачек.

Речная крачка *Sterna hirundo.* Первые птицы появились 4–5 мая, а к середине июня на острове насчитывалось около 80 гнезд.

ЛИТЕРАТУРА

Барбазюк Е. В. К орнитофауне чайковых Восточного Оренбуржья // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2000. С. 5–7.

Барбазюк Е. В. Гнездование чайконосой крачки на крайнем востоке Оренбургской области // Там же, 2001. С. 16–17.

Барбазюк Е. В. О некоторых околоводных и водоплавающих птицах на востоке Оренбургской области в 2002 г. // Там же, 2002. С. 18–22.

Барбазюк Е. В. Чайковые озера Айке (Восточное Оренбуржье) в сезон 2003 г. // Там же, 2003. С. 29–31.

К ЛЕТНЕЙ ОРНИТОФАУНЕ БАССЕЙНА ОЗЕРА ШАЛКАР (НЕВОРОБЬИНЫЕ)

В. П. Белик

Кафедра зоологии Ростовского гос. пед. ун-та, пер. Днепровский, 116, г. Ростов-на-Дону, 344065, Россия. E-mail: vpbelik@mail.ru

В одном из предыдущих Уральских сборников была опубликована краткая сводка П. В. Дебело (2002) по фауне неворобьиных птиц бассейна оз. Челкар (Шалкар), расположенного в Казахстане на левобережье р. Урал в 70 км к югу от г. Уральска. В этой сводке приведено 107 видов гнездящихся, пролетных и залетных птиц. Мои небольшие материалы, собранные в этом же районе в мае 1996 г. в ходе экспедиции по поиску гнездовий **тонкоклювого кроншнепа** *Numenius tenuirostris* (Белик, 2000), дополняют список П. В. Дебело 15 новыми видами. Кроме того, они уточняют характер пребывания, современное распространение и состояние численности ряда встречающихся здесь видов, в том числе некоторых редких, особо охраняемых (орлан-белохвост, красавка, стрепет, кречетка, степная тиркушка и др.).

П. В. Дебело, принимавший участие на первом этапе упомянутой экспедиции, не смог продолжить ее в Зауралье и ему, к сожалению, осталось не известным большинство ее результатов, в том числе частично опубликованных (Морозов, 1998; Белик, Морозов, 1999; Белик, 2001 и др.). Поэтому я считаю целесообразным представить коллегам свои материалы по птицам Челкара, позволяющие дать более полную зоогеографическую характеристику этому интересному региону и выявить изменения, происходящие в настоящее время в его орнитофауне.

Материалы были собраны в основном в трех пунктах: 3–5 мая мы интенсивно работали в среднем течении р. Солянки в районе аула Октябрьский (Дуана) (около 60 км пешеходных маршрутов). Затем 6–7 мая неподалеку обследовали притоки р. Карабас (р. Шаматсай и р. Колдыбай) с хорошо известной старой ивовой рощей в месте их слияния в районе аула Тасшеген (35 км маршрутов). 8 и 9 мая мы провели в пойме р. Урал в районе сел Янайкино и Коловертное, а на обратном пути днем 9 мая вновь остановились на р. Солянке, где был обследован лиман Черный близ аула Байтура. После этого, заехав к оз. Челкар, мы отправились в долину р. Б. Анкаты (Исеньанкаты) в 20 км к востоку от озера, где экскурсировали 10 мая (10 км). Напоследок, по пути в пос. Джамбейты, 11 мая нами был осмотрен также обширный заросший лиман у аула Сасыкколь и соленое оз. Сорколь в долине р. Ащисай–Оленты.

Природные условия обследованного района кратко описаны

П. В. Дебело (2002) и другими авторами (Чибилев, 1987; и др.), поэтому на них я не останавливаюсь.

Малая поганка *Podiceps ruficollis.* П. В. Дебело (2002) в своей сводке этот вид не приводит. Его появление в Зауралье связано, вероятно, с недавним расселением европейской популяции на северо-восток. 10 мая несколько птиц токовало на заросшей старице в пойме р. Б. Анкаты.

Черношейная поганка *P. nigricollis.* Стая из 22 пролетных птиц, вероятно, привлеченных ночью криком чаек и куликов, обнаружена 4 мая на соленом озере среди степи, а 5 мая одиночная птица встречена на обширном заросшем пруду по р. Карабас, где охотилось много белокрылых крачек, в колониях которых эти поганки обычно гнездятся.

Серощекая поганка *P. grisegena.* П.В. Дебело (2002) этот вид не приводит. Мною 7 мая на р. Колдыбай отмечено токование поганок, 9 мая пара наблюдалась на карстовом оз. Шункырколь у южного берега Челкара, а 10 мая птицы оказались обычными на старице р. Б. Анкаты, где наблюдалось строительство гнезда.

Большая поганка *P. cristatus.* Нередка по рекам Карабас, Шаматсай, Колдыбай. 7 мая здесь найдено гнездо, возле которого держались 2 птицы. Нередка была также на карстовом оз. Шункырколь у берега Челкара. Изредка отмечалась по р. Б. Анкаты и ее старицам.

Большая выпь *Botaurus stellaris.* 5–7 мая токовавшие птицы отмечены в трех местах по р. Карабас и Шаматсай.

Большая белая цапля *Egretta alba.* Колония из 5–15 пар найдена в рогозовых зарослях на карстовом оз. Шункырколь диаметром около 100 м на южном берегу Челкара у подножия г. Сасай. 10 мая 3 птицы держались в колонии серых цапель на р. Б. Анкаты, но их гнездование здесь не подтверждено. Кочующие одиночки и пары отмечались на реках Солянка, Шаматсай и лимане Сасыкколь.

Серая цапля *Ardea cinerea.* Колония из 10–20 пар обнаружена в рогозовых зарослях на оз. Шункырколь. На заросшем озере в пойме р. Б. Анкаты обитало до 20 пар, у которых 10 мая В.В. Морозовым были осмотрены насиженные кладки. Цапли гнездились, по-видимому, также в обширных зарослях тростника на лимане Сасыкколь. Не исключено гнездование отдельных пар и в лесу по р. Шаматсай.

Серый гусь *Anser anser.* Обычен на полноводных, с широкими тростниковыми бордюрами, реках Карабас и Шаматсай. Несколько пар обитало на оз. Шункырколь, где 9 мая наблюдалось до 10–20 птиц. Обычен был также на старицах по р. Б. Анкаты, где 10 мая учтено несколько стаек общей численностью до 22 птиц.

Лебедь-шипун *Cygnus olor.* Одиночка и пара отмечены на реках Карабас и Колдыбай. Еще 1 птица наблюдалась на оз. Шункырколь у Челкара.

Огарь *Tadorna ferruginea.* Пары регулярно отмечались по всем рекам. Больше их было на р. Солянке, меньше — на пресном, заросшем Шаматсае.

Пеганка *T. tadorna.* Многочисленна на соленых озерах и старицах в долине р. Солянки (4 мая на озере — до 18–20 пар, 5 мая на старице — до 16 пар). На пресных реках редка, встречается случайно. Большое скопление (около 250 птиц, державшихся парами) обнаружено 11 мая на соленом оз. Сорколь.

Кряква *Anas platyrhynchos.* На открытых степных озерах редка, более обычна по рекам, особенно на залесенных участках Шаматсая. На р. Б. Анкаты 10 мая наблюдались самцы, начавшие уже объединяться в стаи.

Чирок-свистунок *A. crecca.* Стайки встречались на степных озерах в долине р. Солянки. На Шаматсае 7 мая отмечены 2 отдельных пары, еще 1 пара наблюдалась 10 мая на заросшей старице по р. Б. Анкаты. Но гнездовые ли это были птицы — неясно.

Серая утка *A. strepera.* По Солянке и Шаматсаю — наиболее многочисленна из речных уток (более 40 % встреч), предпочитающая открытые реки и широкие старицы. Но на р. Б. Анкаты учтены всего 1–2 пары.

Свиязь *A. penelope.* 4 мая была обычна на соленых озерках в степи (на одном из них до 15–25 птиц). На р. Солянке 5 мая отмечались лишь одиночки в стаях пролетных уток. На р. Б. Анкаты не встречена.

Шилохвость *A. acuta.* 4 мая пары изредка отмечались на соленых озерах в долине р. Солянки. Здесь самка поднята в степи близ озера, возможно — от гнезда. На реках практически отсутствует.

Чирок-трескунок *A. querquedula.* Стайки пролетных птиц 4–5 мая были обычны на озерах в степи и на старицах, а местные птицы изредка отмечались по рекам. Пары и одиночные самцы регулярно встречались на р. Б. Анкаты.

Широконоска *A. clypeata.* 4 мая на соленых озерах в степи учтены 10–15 и 20 пар, но это могли быть еще пролетные птицы. На старицах держались небольшие стайки и редкие пары. По рекам же в течение 6–7 мая была встречена всего 1 пара.

Красноголовая чернеть *Aythya ferina.* Отдельные пары, вероятно, гнездились в тростниковых бордюрах по водотокам и старицам на р. Солянке, Шаматсае и Б. Анкаты.

Хохлатая чернеть *A. fuligula.* 4–5 мая на озерах наблюдались про-

летные стаи до 15–20 птиц, состоявшие в основном из самцов. 10 мая на р. Б. Анкаты в стайке из 3 самцов и 2 самок наблюдалось токование. Гнездятся ли они здесь сейчас, выяснить не удалось.

Морская чернеть *A. marila.* 5 мая на старицах в устье р. Карабас наблюдалось несколько пар, державшихся в смешанных стаях нырков. П.В. Дебело (2002) этот вид на Челкаре не отмечал.

Гоголь *Bucephala clangula.* 4 мая в степи на соленом озере встречен самец. 11 мая стайка из 10 неполовозрелых птиц наблюдалась на р. Ащисай-Оленты.

Луток *Mergus albellus.* Две стайки встречены 4 мая на степном озере (1 самец и 2 самки) и старице (2 самки) близ р. Солянки. Лутки, по-видимому, гнездятся поблизости в пойме р. Урал, где 8–9 мая на лесистой старице наблюдались 2 территориальные пары.

Черный коршун *Milvus migrans.* Довольно обычен по галерейным лесам вдоль Шаматсая. 6–7 мая здесь найдены 4 гнезда на ивах и 1 гнездовой участок, размещавшиеся в 0,3–1,0 км друг от друга. Все гнезда были устроены в верхних частях древесных крон и отличались очень маленькими размерами, так что самки на них напоминали голубей, сидящих на гнездах. 4 мая и 10 мая на р. Солянке и Б. Анкаты отмечены, по-видимому, еще пролетные птицы.

Степной лунь *Circus macrourus.* 4–5 мая на р. Солянке наблюдались 3 одиночные самки, пролетевшие на север и восток. Гнездования этих луней выявить не удалось.

Луговой лунь *C. pygargus.* 3 мая территориальный самец встречен на р. Солянке. Брачные демонстрации пары луней наблюдались 6 мая на Шаматсае, 10 мая поселение из 4 самцов и 2 самок обнаружено на заросшей старице в пойме р. Б. Анкаты. Еще пара, державшаяся, по-видимому, на гнездовом участке, отмечена 11 мая на рогозовом озерце близ оз. Сорколь. Самец, летевший над степью на восток, наблюдался 4 мая.

Болотный лунь *C. aeruginosus.* Довольно обычен по р. Солянке и Шаматсаю. Довольно много птиц было на р. Б. Анкаты. Здесь на старице гнездилось до 10 пар, у двух из которых 10 мая в гнездах В. В. Морозов обнаружил неполные кладки из 1 и 2 яиц. Много луней было также на заросшем лимане Сасыкколь.

Перепелятник *Accipiter nisus.* Вечером 3 мая на р. Солянке отмечена 1 птица, пролетевшая высоко в небе на север.

Европейский т**ювик** *A. brevipes.* П. В. Дебело (2002) этого ястреба на Челкаре не встречал. Мною на Шаматсае 7 мая наблюдался самец, пролетевший вдоль галерейного леса на юг. Птица летела низко над землей, была освещена солнцем и ее удалось хорошо рассмот-

реть в бинокль. Лес здесь вполне подходил для обитания тювика, и его гнездование по Шаматсаю было вполне возможно.

(Курганник *Buteo rufinus*). Следует отметить отсутствие курганников как на р. Солянке, так и по р. Б. Анкаты, что связано, возможно, с депрессией численности сусликов в окрестных степях. Но курганник, по данным П. В. Дебело (2002), был редок здесь почему-то и прежде.

Степной орел *Aquila rapax.* Довольно обычен в водораздельных степях по левобережью р. Солянки (до 20–25 пар/100 км^2), а также по р. Б. Анкаты. В долинах рек встречался реже, а в полупустынях к юго-востоку от Челкара — до пос. Джамбейты, 11 мая орлов не было видно совершенно. 4 мая на р. Солянке найдены 3 гнезда (с 2 и 3 яйцами и еще пустое), сделанные на сусликовинах среди равнинной степи. На р. Б. Анкаты отмечены 3 гнезда, устроенные на опорах высоковольтной ЛЭП в 8–10 км друг от друга.

Могильник *A. heliaca.* 10 мая в долине р. Б. Анкаты в 15–20 км к востоку от оз. Челкар найдено гнездо с 3 насиженными яйцами, сделанное на старой высокой одиночной иве среди степи (Белик, Морозов, 1999).

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla.* В галерейных лесах по Шаматсаю в 2–3 км друг от друга гнездились 3 пары. Кроме того, на старицах р. Солянки постоянно держались 2 пары взрослых, 2 молодые и 1 неполовозрелая птица, прилетавшие сюда охотиться на многочисленных серебряных карасей, возможно, с р. Урал. На Шаматсае одно гнездо оказалось разорено, вероятно, во время зимней рубки деревьев вокруг гнезда, но в мае обе взрослые птицы находились рядом с ним, а в степи в 3–5 км все время держался годовалый орлан. В другом гнезде 7 мая орланы насиживали кладку из 2 «болтунов», тоже, возможно, замерзших зимой во время рубки леса. В третьем, дальнем гнезде В. В. Морозов 7 мая обнаружил птенцов 2–3-недельного возраста.

Чеглок *Falco subbuteo.* 4 мая в степи по р. Солянке отмечены 3 пролетные птицы, летевшие на север, северо-восток и восток. В лесу по Шаматсаю 7 мая найдена гнездовая пара. На р. Б. Анкаты 10 мая встречена 1 птица, охотившаяся на береговушек и скворцов, когда они устраивались в рогозовых зарослях на ночевку.

Кобчик *F. vespertinus.* На р. Солянке и Шаматсае 5–7 мая отмечены всего 2 одиночные птицы. Они, вероятно, к этому времени еще не все вернулись с зимовок.

(Степная пустельга *F. naumanni*). По данным П. В. Дебело (2002), по-видимому, гнездилась на р. Карабас. Мы этих птиц здесь в 1996 г. не видели.

Обыкновенная пустельга *F. tinnunculus.* Редка. На р. Солянке за

2 дня (4–5 мая) отмечены всего 4 птицы (3 и 1), на Шаматсае 7 мая наблюдалась 1 пара, птицы осматривали старые постройки вороны и сороки. На р. Б. Анкаты тоже встречена всего одна птица.

Тетерев *Lyrurus tetrix.* В комплексной степи со спирейниками в 20 км к югу от оз. Челкар 4 мая найдены остатки погибшего зимой самца. Тетерева залетают сюда, очевидно, из поймы р. Урал, где 8 мая наблюдалась токовавшая птица.

Серая куропатка *Perdix perdix.* Пара птиц поднята 7 мая на поляне среди леса по р. Колдыбай.

Перепел *Coturnix coturnix.* 4–5 мая на луговинах по р. Солянке отмечены 2 токовавшие птицы.

Серый журавль *Grus grus.* Гнездовий по р. Солянке, Шаматсаю и Б. Анкаты обнаружить не удалось, хотя журавли могли гнездиться на лиманах Черном и Сасыкколе, где 11 мая наблюдалась стайка из 6 птиц, пролетевших на юг. А на оз. Сорколь в долине р. Ащисай-Оленты 11 мая выявлено летнее скопление холостых журавлей общей численностью 80–90 особей.

Красавка *Anthropoides virgo.* Оказался обычен в комплексных степях на водораздельной равнине по левобережью р. Солянки (26–28 пар/100 км^2). Обычен был также в междуречье Шаматсая и Колдыбая (3 пары/15 км^2 или 20 пар/100 км^2), тогда как в долине р. Солянки учтена всего 1 пара (примерно 3 пары/100 км^2). Автомобильные учеты в этом районе 3 мая и 6 мая показали в среднем 10–15 пар/100 км^2, а 9 мая — 45 пар/100 км^2. Обычен красавка был и по р. Б. Анкаты, но здесь 10 мая часто отмечались одиночки и стайки холостых птиц, возможно, собиравшихся где-то в устье реки в летнее скопление. На р. Солянке и Шаматсае 5–6 мая найдены 3 гнезда с кладками по 2 яйца, а на р. Б. Анкаты 10 мая осмотрено 1 гнездо с 2 яйцами.

Пастушок *Rallus aquaticus.* П. В. Дебело (2002) этот вид не отмечал. Мною пастушок встречен в низовье р. Карабас (5 мая — 1 птица, по-видимому, у гнезда) и на р. Б. Анкаты (10 мая — несколько птиц на заросшей старице).

Малый погоныш *Porzana parva.* П. В. Дебело (2002) погонышей тоже не встречал. Мною найден на р. Б. Анкаты, где 1 птица активно токовала по ночам 9–10 мая на заросшей старице.

Камышница *Gallinula chloropus.* П. В. Дебело (2002) не приводит в своем списке этот вид. На старице в пойме р. Б. Анкаты 10 мая неоднократно отмечались крики камышниц, было слышно их токование.

Лысуха *Fulica atra.* Довольно обычна на полноводных реках Карабас и Шаматсай, тогда как на р. Солянке оказалась редка. Довольно обычна лысуха была также на старицах по р. Б. Анкаты.

Стрепет *Tetrax tetrax.* В связи с восстановлением численности стрепета в 1990-е годы (Белик, 2001), он вновь широко заселил степи в бассейне оз. Челкар. Довольно много стрепетов оказалось в солонцовых комплексных степях (75 % луковично-мятликово-терескеновых и 25 % типчаково-тырсовых группировок) на водораздельной равнине по левобережью р. Солянки, где обилие птиц местами достигало 6–7 пар/км^2, а в среднем равнялось 1–2 пары/км^2. Нередки стрепеты были также на злаково-полынных солонцовых комплексах и залежах в долине р. Солянки (0,3–1,0 пар/км^2). По Шаматсаю отмечена всего 1 птица, токовавшая среди старых изреженных посевов житняка. Практически не было стрепета лишь на сплошных типчаково-тырсовых ковыльниках с высоким густым травостоем, а также на обширных терескеновых солонцах по нижним террасам р. Солянки. В долине р. Б. Анкаты 10 мая отмечена всего 1 токовавшая птица. Еще 2 самца встречены 11 мая между р. Б. Анкаты и лиманом Сасыкколь и Сасыкколем и оз. Сорколь. Следует отметить, что в связи с характерной приуроченностью токующих самцов к обочинам дорог (Белик, 2001), обилие стрепетов, рассчитываемое по данным автомобильных учетов, обычно оказывается сильно (в 4–5 раз) завышенным.

Авдотка *Burhinus oedicnemus.* Встречена 11 мая на голом пустыре среди развалин хуторища у лимана Сасыкколь. П. В. Дебело (2002) этот вид для бассейна оз. Челкар не указывает.

Золотистая ржанка *Pluvialis apricaria.* П. В. Дебело (2002) не встречал этих птиц. Мною на Шаматсае 6 мая наблюдались две птицы, кормившиеся в сухой степи.

Галстучник *Charadrius hiaticula.* На берегу старицы по р. Солянке 5 мая встречена 1 птица, державшаяся в обществе двух малых зуйков.

Малый зуек *Ch. dubius.* Токовавшие территориальные птицы изредка отмечались по берегам старичных и степных озер по р. Солянке и Б. Анкаты.

Морской зуек *Ch. alexandrinus.* На соленых степных озерах в долине р. Солянки 4 мая встречена группа из 3 птиц и одиночный зуек.

Кречетка *Chettusia gregaria.* В последние десятилетия практически исчезла в бассейне оз. Челкар (Дебело, 2002). Мною встречена лишь 5 мая одна птица, кормившаяся на сильно сбитых и стравленных скотом солонцовых комплексах у старицы по р. Солянке, а затем улетевшая далеко на юг. В этот же день одиночную птицу здесь наблюдал и В. В. Морозов. Кречетка держалась среди низкого травостоя высотой всего 3–5 см на луковично-мятликово-белополынных толоках с участием чернополынно-камфоросмовых солонцовых пятен и многочисленных сусликовин.

Чибис *Vanellus vanellus.* Одиночные пары и небольшие колонии до 5–10 пар регулярно отмечались вдоль всех рек, стариц, степных озер, а также по луговым понижениям. На Шаматсае 7 мая найдено гнездо с кладкой, а также наблюдалась птица, рывшая гнездовую лунку.

Ходулочник *Himantopus himantopus.* Гнездовые пары изредка отмечались по берегам стариц и соленых озер в степи по р. Солянке и на р. Б. Анкаты.

Шилоклювка *Recurvirostra avosetta.* На соленом озере в долине р. Солянки 4 мая держалась стайка из 18 птиц, еще не приступавших к гнездованию.

Черныш *Tringa ochropus.* 3–7 мая отмечены 3 одиночные птицы, завершавшие миграцию на север.

Фифи *T. glareola.* П. В. Дебело (2002) этот вид в бассейне Челкара не отмечал. Мною 3–4 мая наблюдались 3 стайки по 4, 7 и 15 птиц, пролетавшие на север, а 5–7 мая на р. Солянке и Шаматсае регулярно регистрировались кормившиеся птицы. Стайка встречена также на болотце в пойме р. Б. Анкаты 10 мая.

Большой улит *T. nebularia.* Одиночные птицы отмечены 3-го, 6-го и 10 мая на р. Солянке, Шаматсае и Б. Анкаты.

Травник *T. totanus.* Одиночные пары или группы по 2–3 пары регулярно отмечались по берегам всех рек, стариц, степных озер — обычно в колониях чибисов и других куликов. 4 мая у озерка наблюдалась копулировавшая пара.

Щеголь *T. erythropus.* П. В. Дебело (2002) не встречал этих птиц. Мною 3 одиночных щеголя в брачном наряде наблюдались 4 мая и 6 мая на степном озере, на р. Солянке и Шаматсае.

Поручейник *T. stagnatilis.* Кормившиеся поручейники оказались нередки 4 мая на соленом озерце в степи по р. Солянке, но больше нигде встретить их не удалось. Возможно, это были еще пролетные птицы.

Перевозчик *Actitis hypoleucos.* Одиночные пролетные птицы несколько раз отмечались 3–5 мая на р. Солянке.

Мородунка *Xenus cinereus.* П. В. Дебело (2002) этот вид на Челкаре не встречал. Мною 10 мая на р. Б. Анкаты отмечен характерный крик пролетевшей птицы.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus.* 4 мая на соленом степном озере учтено около 60 птиц. Еще 2 стайки встречены 5 мая на старицах по р. Солянке.

Турухтан *Philomachus pugnax*. В течение 4–7 мая в степях, по берегам озер и рек были видны большие стаи пролетных птиц, по утрам

и вечерам шел их пролет на восток. Однако 9 мая на р. Солянке турухтаны уже почти полностью исчезли, а на р. Б. Анкаты 10–11 мая встречались еще регулярно, но были немногочисленны.

Белохвостый песочник *Calidris temminckii.* 10 мая на берегу озера в пойме р. Б. Анкаты встречены 2 птицы.

Гаршнеп *Lymnocryptes minimus.* П. В. Дебело (2002) этих птиц на Чекаре не встречал. Мною на болоте в пойме р. Солянки 5 мая вспугнута 1 птица.

Бекас *Gallinago gallinago.* 4 мая бекас поднят на луже в степи, а 5 мая вечером 1 птица пролетела на север.

Большой кроншнеп *Numenius arquata.* Оказался весьма обычен в степях вдоль рек Карабас и Шаматсай. Здесь на разных участках, по данным пешеходных и автомобильных учетов и картирования гнездовых территорий, регистрировалось от 8 до 16 пар/10 км^2, державшихся обособленными парами по степи и лугам на умеренно сбитых и стравленных пастбищах, избегая сильно сбитых участков вокруг чабанских летовок, а также густых высокотравных тырсовников вдали от них. Наиболее плотные поселения обнаружены в междуречье Шаматсая и Колдыбая, где гнездилось до 20 пар на 15 км^2, в том числе 6 и 7 мая найдены 2 гнезда с насиженными кладками по 4 яйца. По данным В. В. Морозова, довольно много кроншнепов было также в безлюдном низменном междуречье Колдыбая и Карабаса. По р. Солянке, где долина была суше и сильнее стравлена скотом, кроншнепов оказалось значительно меньше, а в степях на водоразделе в 3–5 км от постоянных водоемов их не было вовсе. В более сухой долине р. Б. Анкаты кроншнепов тоже было мало. Здесь 10 мая удалось обнаружить всего 3–4 пары, тогда как у юго-восточного берега лимана Сасыкколь на участке в 1 км^2 рядом с автотрассой днем 11 мая держалось до 5–7 пар кроншнепов.

Средний кроншнеп *N. phaeopus.* Днем 3 мая стая из 38 птиц кормилась в сухой комплексной степи по долине р. Солянки. По вечерам 4 и 6 мая вдоль р. Солянки и Шаматсая на север с криком пролетели 2 и 6 птиц. Днем 11 мая 3 небольших короткоклювых кроншнепа вспугнуты в сухой степи близ оз. Сорколь. Судя по голосу пролетных птиц и окраске кроншнепов, наблюдавшихся 3 мая, через Челкар в начале мая шла миграция северного подвида *N. ph. phaeopus.*

Большой веретенник *Limosa limosa.* Одиночными парами или небольшими группами регулярно отмечался по берегам всех рек, стариц и степных озер, иногда — по луговым понижениям. Встречался обычно вместе с большим кроншнепом, но чаще держался у воды, в смешанных колониях куликов, тогда как в степи гнездился редко. На Ша-

матсае найдено всего 4–5 пар на 15 км^2, а в пойме р. Б. Анкаты учтены 5–6 пар на 4 км длины долины.

Степная тиркушка *Glareola nordmanni.* На р. Солянке и Шаматсае выявлены 4 колонии (около 30, 50, 100 и 25 пар), размещавшиеся, соответственно, на степном пастбище, на сухих солонцах, на илистых косах стариц и в заболоченной низине в пойме р. Солянки. В начале мая колонии здесь еще формировались и численность птиц в них постепенно увеличивалась, но 5 мая некоторые пары в большой колонии в устье р. Карабас уже имели кладки. В пойме р. Б. Анкаты найдены 2 колонии (10–20 и 30–50 пар), располагавшиеся на пухлом солончаке и на обширных сухих солончаках.

Черноголовый хохотун *Larus ichthyaetus.* Стайки из 4–7 птиц держались на старичных озерах по р. Солянке и на оз. Шункырколь у Челкара, но их гнездовья остались неизвестны.

? Чайка черноголовая *L. melanocephalus.* Ночью 9 мая на р. Б. Анкаты отмечены «мяукающие» крики пролетных птиц, которые могли принадлежать, вероятно, этим чайкам. Однако их последующие поиски оказались безрезультатны. Тем не менее, залет черноголовых чаек на Челкар вполне возможен в связи с их недавним быстрым расселением на восток в Прикаспий (Ардамацкая, 1991).

Малая чайка *L. minutus.* Вдоль р. Солянки 4 мая шел выраженный пролет на север стай численностью до 20–40 особей. 5 мая этих чаек было уже мало, а позже они не отмечались вовсе.

Озерная чайка *L. ridibundus.* Очень много птиц держалось 3 мая по берегам оз. Челкар, где известны их большие колонии (Дебело, 2002). Стайки регулярно отмечались также по всем степным рекам, где местами они, вероятно, гнездятся. 7 и 10 мая у озер дважды наблюдались тревожившиеся птицы, 5 и 7 мая на р. Солянке и Шаматсае дважды отмечены копуляции.

Морской голубок *L. genei.* На соленом степном озере в долине р. Солянки 4 мая встречена пара.

Хохотунья *L. cachinnans.* Колония не менее 50–100 пар обнаружена на небольшом, около 100 м в диаметре, карстовом оз. Шункырколь у южного берега Челкара, где чайки гнездились преимущественно по периферии рогозовых зарослей. Здесь 9 мая птицы насиживали кладки и были хорошо видны с берега. Небольшая колония найдена на старичном озере в пойме р. Б. Анкаты. Отдельные пары гнездились, возможно, и на старицах в устье р. Карабас.

Черная крачка *Chlidonias niger.* На старицах в устье р. Карабас 5 мая учтены 4 птицы, охотившиеся вместе со стаей белокрылых крачек.

Белокрылая крачка *Ch. leucopterus.* Массовый пролет вдоль р. Солянки на север начался 4 мая, а 5 мая на всех старицах охотились уже сотенные стаи этих птиц. Регулярно отмечались они и по долине р. Б. Анкаты

Белощекая крачка *Ch. hybrida.* На старицах в устье р. Карабас 5 мая вместе с белокрылыми крачками охотились 3–4 птицы.

Чайконосая крачка *Gelochelidon nilotica.* В устье р. Карабас на обширных старицах с изолированными островами 5 мая наблюдались 2 и 3 птицы, гонявшиеся друг за другом в характерных токовых полетах. Одиночки и группки изредка отмечались 10 мая в долине р. Б. Анкаты. П. В. Дебело (2002) для Челкара этих птиц не приводит, хотя они издавна гнездятся в соседних районах — в бассейне р. Илек, на Камыш-Самарских озерах и др. (Сушкин, 1908; Зубакин, 1988; Шевченко и др., 1993; Белик, 2000).

Речная крачка *Sterna hirundo.* Пары регулярно отмечались по р. - Солянке и Б. Анкаты. Довольно много их было на старицах в устье р. Карабас, где 5 мая на косе найдено гнездо с кладкой. Колония обнаружена на рогозовой сплавине ниже плотины на р. Карабас, где 5 мая тоже были видны крачки, сидевшие на гнездах.

Малая крачка *S. albifrons.* Несколько птиц, в том числе 1 пара, готовившаяся к яйцекладке, держались 5 мая на старицах в устье р. Карабас. Пролетавшие крачки изредка отмечались также на р. Б. Анкаты.

Вяхирь *Columba palumbus.* Ворковавшие птицы отмечались 6–7 мая в галерейном лесу по р. Колдыбай. На р. Б. Анкаты 10 мая наблюдалась птица, мигрировавшая на восток.

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus.* 3 мая встречена первая в 1996 г. птица, 5 мая ночью отмечено первое кукование, а 7 мая с утра кукушки токовали уже активно и к вечеру стали довольно обычны. Изредка они отмечались также по долине р. Б. Анкаты.

Ушастая сова *Asio otus.* П. В. Дебело (2002) в бассейне Челкара этих птиц не встречал. 6 мая в галерейном лесу по р. Колдыбай вечером токовала 1 птица.

Черный стриж *Apus apus.* Утром 4 мая 2 птицы мигрировали над степью на север, а 11 мая утром 1 птица пролетела на восток.

Золотистая щурка *Merops apiaster.* 5 мая появились первые в 1996 г. птицы, а к вечеру они стали уже довольно обычны. 6–7 мая наблюдался пролет стаек численностью около 10 птиц в каждой на север и северо-восток. На р. Б. Анкаты 10 мая уже много птиц держалось вдоль высокого коренного берега долины с многочисленными оврагами.

Удод *Upupa epops.* Пары регулярно отмечались у жилых (чаще) и

брошенных (реже) чабанских летовок по степи. Они, возможно, гнездились также в лесах по Шаматсаю.

Пестрый дятел *Dendrocopos major.* В галерейном лесу по р. Колдыбай обнаружено, по-видимому, зимнее дупло дятла. Найти же самих птиц здесь не удалось. Они проникают сюда, скорее всего, во время осенне-зимних кочевок.

* * *

Всего в течение 3–11 мая мною было отмечено (без учета поймы р. Урал) 87 видов неворобьиных птиц, значительная часть которых характеризует летнюю фауну (57 гнездящихся или возможно гнездящихся видов). Довольно много пролетных птиц (24 вида) было лишь среди куликов и гусеобразных. Среди встреченных 3 вида (черноголовый хохотун, морской голубок и белощекая крачка) могут быть отнесены к залетным. Современный характер летнего пребывания еще 3 видов (степной лунь, кречетка и шилоклювка) требует специального выяснения. Кроме того, в степи найдены зимние остатки тетерева, а в лесу обнаружено дупло дятла, которые залетают к Челкару, вероятно, во время осенне-зимних кочевок.

Пользуясь возможностью, я еще раз искренне благодарю Союз охраны птиц России за приглашение в экспедицию по поиску тонкоклювого кроншнепа в Приуралье, а В. В. Морозова — за дружеское сотрудничество в ходе полевых исследований и за информацию о гнездовании некоторых видов птиц в районе оз. Челкар.

ЛИТЕРАТУРА

Ардамацкая Т. Б. Причина появления черноголовой чайки на гнездовании в Краснодарском, Ставропольском краях и на Каспии // Кавказ. орнитол. вестн. Вып. 2. Ставрополь, 1991. С. 3–9.

Белик В. П. К летней орнитофауне песков Аккумы и их окрестностей (Уральская область, Западный Казахстан) // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2000. С. 9–17.

Белик В. П. История и современное состояние восточноевропейских популяций стрепета // Орнитология. Вып. 29. М.: Изд-во МГУ «Логос», 2001. С. 212–222.

Белик В. П., Морозов В. В. Орел-могильник в Западном Казахстане // Королевский орел: Распространение, состояние популяций и перспективы охраны орла-могильника (*Aquila heliaca*) в России: Сборн. науч. тр. Сер.: Редкие виды птиц. Вып. 1. М.: Союз охраны птиц России, 1999. С. 92–94.

Дебело П. В. Материалы по орнитофауне озера Шалкар (неворобьиные) // Мат-лы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Зап. Сибири. Екатеринбург, 2002. С. 108–126.

Зубакин В. А. Чайконосая крачка // Птицы СССР: Чайковые. М.: Наука, 1988. С. 287–299.

Морозов В. В. Современный статус южного среднего кроншнепа *Numenius phaeopus alboaxillaris* Lowe, 1921 в России и Казахстане // Рус. орнитол. журнал: Экспресс-вып. 1998. № 34. С. 3–15.

Сушкин П. П. Птицы Средней Киргизской степи (Тургайская область и восточная часть Уральской) // Материалы к познанию фауны и флоры Росс. империи. Отд. зоол. 1908. Вып. 8. С. 1–803.

Чибилев А. А. Река Урал. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 167 с.

Шевченко В. Л., Дебело П. В., Гаврилов Э. И. и др. Об орнитофауне Волжско-Уральского междуречья // Фауна и биология птиц Казахстана. Алматы: Наука Каз. ССР, 1993. С. 7–103.

НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ПОЛЕВОГО СЕЗОНА 2004 Г. В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А. Ф. Белянкин

А/я 3048, г. Кемерово, 650033. E-mail: bios@kemsu.ru

В 2004 г. были продолжены исследования пространственного распределения летнего гнездящегося населения птиц на территории Кемеровской области и многолетних изменений фауны и населения птиц на территории г. Кемерова. Последние выполняются на двух постоянных маршрутах (многоэтажная каменная застройка и старая березовая роща на окраине города) практически непрерывно, с периодичностью один раз в две недели, на протяжении последних 25 лет (многолетний мониторинг). Экспедиционные исследования населения гнездящихся птиц проводились в третьей декаде июня в северо-западных предгорьях Кузнецкого Алатау в окрестностях пос. Барзас (в 40 км северо-восточнее г. Кемерова), а затем, в первой половине июля — в западной части Кузнецкой степи в окрестностях д. Калтышино Промышленновского р-на и в прилегающем участке Салаирского кряжа в окрестностях с. Ваганова этого же р-на.

* * *

Кудрявый пеликан *Pelecanus crispus.* По сведениям охотоведа Салаирского госзаказника Н. Т. Надежкина (личное сообщение), на оз. Атанаево у северо-восточного подножья Салаирского кряжа на границе с Новосибирской областью примерно с 1994 г. стали встречаться пеликаны. Всречались они не ежегодно и только в мае. Обычно прилетали на озеро отдельными парами и долго здесь не задерживались.

Большой баклан *Phalacrocorax carbo.* На вышеназванном озере

встречаются не ежегодно и только весной и осенью. Наблюдались обычно одиночные особи и пары птиц и, изредка, стайки до 3 особей (личное сообщение Н. Т. Надежкина).

Серая цапля *Ardea cinerea*. Впервые на территории области обнаружена гнездовая колония, в которой в настоящее время гнездится более 10 пар. Колония размещается в небольшом острове соснового бора, растущего на возвышенном участке у подножья Салаирского кряжа рядом с юго-восточной окраиной с. Ваганова. По сведениям местных жителей (личное сообщение А. М. Сафронова, О. В. Лебедева и др.), впервые цапли появились в этом районе в 1984–1985 гг., однако первый раз загнездились здесь в количестве 2–3 пар только в 1994 г. С тех пор их численность ежегодно возрастала. Гнезда размещаются высоко в кронах деревьев, в основном в разреженной и заболоченной центральной части бора, а также у западной опушки леса. Отсюда цапли поодиночке, парами и небольшими группами летают за кормом в основном в северо-западном направлении, сначала над селом, а затем вдоль подножья Салаирского кряжа к пойме р. Исток и еще дальше — к большому озеру-пруду Атанаево. Последнее находится в 10–15 км от колонии. Часть цапель улетает кормиться в Кузнецкую степь в северном и других направлениях. Так, весьма обычны они были на берегах и мелководьях на степном участке р. Исток и на пруду на этой же реке в окрестностях д. Калтышино в 18 км северо-северо-западнее колонии.

Отдельные пары цапель устраивают гнезда на сплавинах оз. Атанаева и на островках р. Исток. На сплавинах в 1991–1993 гг. видели 3 гнезда. При осмотре одного из них в конце апреля — начале мая было обнаружено одно яйцо (вероятно, начало кладки) (личное сообщение охотоведа Салаирского госзаказника Н. Т. Надежкина). Прилетают цапли на места гнездования в конце апреля, когда водоемы еще покрыты льдом. Завершается гнездование у большинства пар в августе, а в сентябре–октябре происходит их постепенный отлет к местам зимовки.

Черный аист *Ciconia nigra.* В середине 80-х годов прошлого века в смешанной тайге у подножья Салаира между селами Ваганово и Журавлево Промышленновского р-на найдено жилое гнездо аиста. Одиночный аист был встречен примерно в этом же районе в середине мая 2004 г. (личное сообщение А. П. Кивишева, А. М. Сафронова и др.).

Обыкновенный фламинго *Phoenicopterus roseus.* Изредка в отдельные годы встречается в конце сентября на вышеназванном оз. Атанаево и в 10 км севернее в Кузнецкой степи на небольших озерах в окрестностях д. Колтышино Промышленновского р-на. Встречали стаи численностью от 4 до 20 особей, летевшие в южном направле-

нии и делавшие остановки на мелководной юго-восточной части оз. Атанаево, прилегающей к подножью Салаирского кряжа (личное сообщение Н. Т. Надежкина).

Краснозобая казарка *Rufibrenta ruficollis.* С 1986 г. стала ежегодно останавливаться на оз. Атанаево на весеннем пролете в начале мая. В прошлом максимально встречалось до 20 пар, которые в течение двух недель постепенно покидали озеро. В первых числах мая 2004 г. на озере наблюдалась стая до 60 особей (личное сообщение Н. Т. Надежкина).

Серый гусь *Anser anser.* На оз. Атанаево этот вид стал активно гнездиться с 1986 г. Ежегодно в юго-западной части на сплавинах и на заболоченных, труднодоступных для людей, берегах озера гнездится от 6 до 10 пар.

Огарь *Tadorna ferruginea.* По сведениям жителей с. Ваганова (личное сообщение О. В. Лебедева, А. П. Кивишева и др.), огари впервые появились на гнездовании в окрестностях Салаирского кряжа в 1999 г. Первоначально ежегодно встречали по 1–2 пары, а в последние годы здесь гнездится до 4 пар. Дважды наблюдали, как взрослые утки вели свои выводки из леса к ближайшему пруду. В каждом из выводков было по 12–14 птенцов. Именно в такой ситуации в одном случае большая часть выводка была отловлена людьми, в другом — полностью уничтожена многочисленными в этом районе черными коршунами. Стайка из трех огарей была встречена 5 июля 2004 г. в Кузнецкой степи в окрестностях д. Калтышино примерно в 15 км севернее указанного района их гнездования.

Балобан *Falco cherrug.* По личному сообщению биолога Е.В. Осипова, пара этих соколов впервые за многие годы загнездилась на территории производственного объединения «Азот» на западной окраине г. Кемерова летом 2003 г. Недоступное для наблюдений гнездо размещалось в нише одной из железобетонных конструкций на высоте около 30 м. По соседству с этой парой, примерно в полукилометре от нее, на территории этого же предприятия гнездилась пара сапсанов, с которыми у балобанов наблюдались частые ссоры. Вероятно, из-за этих ссор семья балобанов вместе с молодыми покинула эту территорию сразу после завершения гнездования в начале третьей декады июля.

Сапсан *F. peregrinus*. Пара сапсанов в течение многих лет (по крайней мере, с 1991 г.) ежегодно гнездится на территории вышеназванного производственного объединения. Гнездо размещается в нише заброшенной и разбитой каменной постройки на высоте около 30 м. Здесь же 22 июля 2003 г. был найден на земле выпавший из гнезда, полнос-

тью оперенный, но еще короткохвостый не летающий птенец. В гнезде наблюдался и второй птенец. Семья сапсанов продолжала держаться на гнездовом участке до середины августа (личное сообщение Е. В. Осипова).

Турухтан *Philomachus pugnax.* При проведении учетов в степных местообитаниях в окрестностях д. Калтышино 5 июля на участке ковыльной степи рядом с небольшим водоемом была вспугнута самка турухтана. Взлетев, она присоединилась к небольшой смешанной стайке волнующихся в присутствии человека куликов (большой веретенник, чибис) и сизых чаек. В указанной стайке был обнаружен и самец турухтана с «воротником». По сведениям местного жителя, он несколько раз летом 2004 г. наблюдал возле этого же водоема «разноцветных куличков». После повторного посещения этого места 11 июля турухтаны здесь не были встречены, но при обследовании водоема рядом с ним из зарослей полыни слышались своеобразные звуки, напоминающие тихое низкое урчание продолжительностью 1–1,5 с. В литературе (Рябицев, 2001) описаны примерно такие же звуки, которые обычно издают самки турухтана при беспокойстве у выводка. Турухтанов наблюдали также примерно в 20 км южнее, у подножья Салаирского кряжа, жители с. Ваганова в мае 2004 г. Стайка, в которой среди самок было около 10 самцов, несколько дней держалась на лугу возле пруда в окрестностях села.

Вяхирь *Columba palumbus.* Два воркующих неподалеку друг от друга самца встречены в Салаирском кряже в 3–4 км к югу от с. Ваганова 8 июля 2004 г. Вяхири встречены в разреженном участке смешанной черневой тайги с обильным пихтовым подростом на вершине горы. При обследовании одного из предполагаемых гнездовых участков здесь взлетела пара птиц. Впервые гнездование вяхиря в Кемеровской области было доказано в 1972 г. (Белянкин, 1999).

Белокрылый жаворонок *Melanocorypha leucoptera.* В северо-западных окрестностях д. Калтышино над обширным остепненным лугом с деградированными посевами многолетних трав (кострец безостый) 5 июля были отмечены в полете три жаворонка с характерной окраской этого вида. При этом две птицы активно преследовали одну. Это могли быть самцы, преследующие самку, но могла быть и взрослая птица с летающими молодыми, которые таким образом выпрашивали у нее корм. Именно такие сценки приходилось изредка наблюдать в это же время у многочисленных здесь полевых жаворонков. В прошлом самец белокрылого жаворонка один раз уже отмечался примерно в этом же районе Кузнецкой степи (Хахлов, 1937), однако особенности его поведения позволили тогда автору считать его только

залетным на территории Кемеровской области. Описанный выше случай встречи белокрылых жаворонков может свидетельствовать в пользу гнездования вида в этом районе.

Тростниковая камышовка *Acrocephalus scirpaceus.* Во время учетов птиц в степной части поймы р. Исток севернее дер. Калтышино были встречены 2–3 пары необычных для нашей области камышовок. Они имели однотонный буроватый верх и разнообразную, в целом мелодичную, песню. Птицы держались в зарослях тростника, растущего отдельными островами, островками и узкими полосами на мелководных участках реки и на пруду в прибрежной зоне. Выбирая между сходными по многим признакам тростниковой и кустарниковой камышовками (оба вида отсутствуют в фаунистическом списке птиц Кемеровской обл.), автор в конечном итоге остановился на первом из них. Решающее значение при этом сыграли в меньшей степени особенности пения этих птиц (в начале июля пение было редким, негромким, и потому его детали выяснены недостаточно), а в большей — характер местообитания вида, вполне соответствующий описанному в литературе (например, Рябицев, 2001; и др.). Однако при этом сохранились некоторые сомнения в правильности определения вида, которые неизбежно бывают в тех случаях, когда незнакомых и трудных в определении птиц добыть не удается. В конце первой декады июля у двух пар этих камышовок появились слетки, а пение практически прекратилось. Многочисленными соседями этого вида по данному биотопу были индийская камышовка и камышовка-барсучок.

Черноголовая славка *Sylvia atricapilla*. В настоящее время ввиду недостатка фактического материала по гнездованию этого вида в Кемеровской области, ее территория не была включена в состав видового ареала (Рябицев, 2001). Сохраняется неясность с распространением вида на гнездовании и в соседней Томской области, находящейся севернее на одной долготе с Кемеровской, на что указывают также С. П. Миловидов и О. Г. Нехорошев (2002). Гнездование этого вида они отмечают только для окрестностей г. Томска. В Кемеровской области как редкий вид черноголовая славка встречалась только на равнинном севере в окрестностях г. Юрги, но гнездование здесь, похоже, не установлено (Гынгазов, Миловидов, 1977) и г. Анжеро-Судженска (Белянкин, 1999). В последнем районе ее встречали и добывали только в периоды весенних и осенних миграций. До настоящего времени не давали результата разнообразные и достаточно продолжительные исследования населения птиц, выполнявшихся во многих пунктах, преимущественно в восточной и центральной частях области. Не принесло результата и использование массовых отловов птиц паутинны-

ми сетями (как объективного метода контроля) в долине среднего течения р. Томи на границе лесостепи и тайги, хотя выявлено много скрытных малочисленных видов. Использование сетей частично снимало сомнения в возможном пропуске этого вида в ходе маршрутных учетов птиц по голосам, поскольку известно, что песня черноголовой славки изменчива в течение сезона и к тому же она может довольно точно подстраивать ее под песни некоторых своих соседей, прежде всего садовой славки (Симкин, 1990).

В ходе исследований 2004 г. были сделаны сразу две находки черноголовой славки, вероятно, позволяющие предполагать ее гнездование на территории Кемеровской области. Так, 25 мая была встречена пара птиц на участке старой березовой рощи с густым подлеском из кустарников на северо-западной окраине г. Кемерова. При первой встрече сразу же обратила на себя внимание очень мелодичная песня незнакомого вида птиц, после чего в кронах деревьев визуально были обнаружены самец и самка черноголовой славки.

Песня самца состояла из двух частей продолжительностью примерно по 2 сек каждая. Начиналась она тихим высоким говорком, который затем переходил в громкий говорок очень чистого флейтового звучания. Изредка отдельно от этой песни исполнялись чистые неторопливые звуки «фиу-фиу-ли» — вероятно, это и была знаменитая «флейта» этой славки. При повторном посещении рощи 8 июня и позднее здесь уже пело много самцов садовой славки, среди которых, вероятно, и затерялось пение черноголовой славки. У самца, встреченного 8 июля на горном плато Салаирского кряжа на разреженном участке смешанной черневой тайги в окрестностях с. Ваганова, пение было уже иным. Оно представляло собой сравнительно продолжительный и мелодичный, но немного скрипучий говорок, чем немного напоминало скрипучее пение серой славки, одна или две пары которых гнездились в ближайшем соседстве.

Корольковая пеночка *Phylloscopus proregulus*. В Кемеровской области проходит западная граница гнездового ареала этого вида, который спорадично распространен здесь в хвойных и смешанных лесах, в основном в восточной горной-таежной части области. Летом 2004 г. вид был обнаружен в смешанной черневой тайге в окрестностях пос. Барзас (предгорья Кузнецкого Алатау) и с. Ваганова (северная часть Салаирского кряжа). Это наиболее западные пункты находок вида на территории области. Вероятно, этой пеночке свойственно колониальное гнездование, в тайге она встречается обычно не поодиночке, а группами, как минимум по 2–3 поющих неподалеку друг от друга самца.

ЛИТЕРАТУРА

Белянкин А. Ф. Птицы равнинной части Кемеровской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1999. С. 14–43.

Гынгазов А. М., Миловидов С. П. Орнитофауна Западно-Сибирской равнины. Томск, 1977. 352 с.

Миловидов С. П., Нехорошев О. Г. Справочник-определитель птиц Томской области. Томск, 2002. 168 с.

Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. Екатеринбург, 2001. 608 с.

Симкин Г. Н. Певчие птицы: Справочное пособие. М., 1990. 399 с.

НОВЫЙ ЗАЛЕТ ЖЕЛТОЙ ЦАПЛИ В СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН

Н. Н. Березовиков, С. Н. Ерохов

Институт зоологии Центра биологических исследований Министерства образования и науки, просп. Аль-Фараби, 93, Алматы, Казахстан, 480060.
E-mail: instzoo@nursat.kz

Для севера Казахстана залет **желтой цапли** *Ardeola ralloides* впервые был зафиксирован на оз. Аксуат в Наурзумском заповеднике, где 29 мая 1980 г. был добыт самец (Гордиенко, 1991). Очередной случай залета этой редчайшей птицы зафиксирован в западной части Кустанайской области, где 17 августа 2000 г. одиночная взрослая желтая цапля отмечена на р. Камысты-аят между городами Рудный и Карталы (Челябинская обл.). Ближайшие места достоверного гнездования цапли в последнее десятилетие известны в казахстанской части дельты Волги. В дельте Урала с 1993 г. она практически перестала гнездиться (Березовиков, Гисцов, 1996/1997, 2000). Отсутствуют сведения и о колонии желтой цапли, найденной в 1975 г. в пойменных лесах нижнего течения Урала ниже пос. Махамбет (Левин, Губин, 1978).

ЛИТЕРАТУРА

Березовиков Н. Н., Гисцов А. П. Орнитокомплексы дельты реки Урал и их изменение в связи с очередной трансгрессией Каспийского моря // Selevinia, 1996/1997. С. 79–87.

Березовиков Н. Н., Гисцов А. П. Птицы дельты реки Урал // Рус. орнитол. журн., 2001. Экспресс-вып. № 153. С. 635–649.

Гордиенко Н.С. Краткое сообщение о желтой цапле // Редкие птицы и звери Казахстана. Алма-Ата, 1991. С. 40.

Левин А. С., Губин Б. М. Материалы по биологии голенастых птиц нижнего течения Урала // Биология птиц в Казахстане. Алма-Ата, 1978. С. 77–83.

ГНЕЗДОВАНИЕ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ В ВЕРХНЕМ ПРИОБЬЕ

Т. К. Блинова, В. Н. Блинов

Ул. Дальняя, 44, Дачный городок, г. Томск, 634511.

Поиск гнезд хищных птиц и сов проводился в мае-июле 1976–1980 гг. в долине Верхней Оби (в 100 км ниже г. Новосибирска). Обследовались пойменные луга, притеррасные сосновые боры, смешанные леса. Общая площадь ключевого участка составила более 400 км^2. За период исследований подтверждено гнездование 6 видов соколообразных и 2 видов сов.

Обыкновенный осоед *Pernis apivorus*. Гнездо найдено 23 мая 1977 г. на опушке соснового бора у края террасы; оно располагалось на сосне. В кладке находилось 2 теплых яйца. Оба родителя с криками кружили рядом.

Черный коршун *Milvus migrans.* Найдено и описано за пять лет работ 35 жилых гнезд. Коршун располагает гнезда в разных биотопах: сосновых борах, в луговой облесенной пойме, в смешанных сосново-березовых лесах. Чаще всего для гнезда выбирается сосна, реже — тополь, береза или ива. Сроки размножения очень растянуты. В первой декаде мая наблюдали и строительство гнезд, и кладки. В кладках, найденных в течение мая, находилось, как правило, 1–2 яйца. Птенцы в гнездах появлялись в первой декаде июня в числе одного–двух (только в одном гнезде отмечено 3 птенца). Вылет птенцов из гнезд наблюдали с 15 по 20 июля.

Перепелятник *Accipiter nisus.* Найдено 2 гнезда этого ястреба. В первом, обнаруженном 15 июля 1976 г. в смешанном лесу с преобладанием сосны, находилась шелуха от пеньков выросших и вылетевших птенцов, они подавали голосовые сигналы в 50 м от гнезда. Гнездо было устроено на тонкой сосне на высоте около 8 м. Второе гнездо найдено 23 мая 1978 г. в сосновом «острове» среди луговой поймы Оби. Оно располагалось на тонкой сосне на высоте около 6 м. В гнезде находилось 4 свежих яйца. При повторном посещении гнезда 15 июля обнаружены 3 или 4 птенца, которые сразу разлетелись. Самка налетала на залезшего на дерево наблюдателя, ударяя его по голове.

Канюк *Buteo buteo.* В разные годы обнаружено 3 гнезда, которые располагались в участках сосновых грив среди болота и луговой поймы. В гнезде, найденном 7 мая 1976 г. (на сосне, на высоте примерно 10 м), находилось 1 яйцо. В другом гнезде (15 июля 1978 г.) сидели 2 не полностью оперенных птенца, здесь же находилось одно неоплодотворенное яйцо. В гнезде лежали четыре погадки из шерсти и костей грызунов и перо славки *sp*. Третье гнездо обнаружено также

15 июля 1978 г. Оно располагалось на тонкой сосне, в нем были свежие погадки, но птенцы его уже покинули. Пара родителей беспокоилась рядом, у одной из птиц в клюве была полевка.

Большой подорлик *Aquila clanga.* В гнезде, обнаруженном 5 июля 1979 г. в смешанном березово-сосновом лесу надпойменной террасы, находился один птенец, покрытый пухом. Гнездо было очень массивное, до метра в диаметре, устроено на березе на высоте около 12 м. В гнезде лежал 3–4-дневный утенок свиязи и слеток овсянки sp.

Пустельга *Falco tinnunculus.* За период исследований найдено 11 жилых гнезд этого сокола (Блинов, Блинова, 1996). Пустельга в Верхнем Приобье устраивает гнезда преимущественно в старых (или разоренных новых) гнездах сорок, в основном на иве, реже на черемухе или сосне. Незавершенные кладки (1–2 яйца) находили с 15 по 23 мая, полные (5–6 яиц) — с 24 мая по 9 июня. В середине июня происходит вылупление птенцов, в середине июля — их вылет из гнезд.

Болотная сова *Asio flammeus.* Единственное гнездо найдено 31 мая 1977 г. в луговой заболоченной пойме Оби на земле под кустом. В гнезде находилось 7 теплых яиц, обе взрослые птицы беспокоились рядом.

Ушастая сова *A. otus.* Осмотрено 11 жилых гнезд этой совы. Она занимает преимущественно старые гнезда сорок, реже — серых ворон. Эти гнезда чаще всего располагались на ивах. С 25 апреля по 31 мая находили гнезда с полными кладками (чаще всего 6 яиц, реже — 5). Птенцы в гнездах начали появляться 25 мая; первые летные молодые зарегистрированы 17 июня.

ЛИТЕРАТУРА

Блинова Т. К., Блинов В. Н. Гнездование черного коршуна и пустельги в долине Верхней Оби // Орнитология. Вып. 27. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 280–281.

ДОПОЛНЕНИЕ К ФАУНЕ ПТИЦ НИЖНЕГО ПРИВАСЮГАНЬЯ (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Т. К. Блинова, И. В. Громышев

Кафедра экологии Томского гос. университета, пр. Кирова, 14, оф. 36, г. Томск, 634034. E-mail: btk@green.tsu.ru

Исследования проводились с 20 мая по 6 июля 2003 г. в нижнем течении р. Васюган, полученные данные опубликованы (Блинова и др., 2003). С 26 по 29 сентября 2003 г. и 26–27 марта 2004 г. совершены кратковременные поездки в этот же район. В сообщении приводятся данные по 7 видам, не отмеченным нами летом.

Скопа *Pandion haliaetus*. Две парящие птицы, возможно, пролетные, отмечены над р. Чебиткер 28 сентября.

Зимняк *Buteo lagopus.* За 30 минут наблюдений 29 сентября над р. Васюган в юго-западном направлении пролетело 7 птиц.

Чеглок *Falco subbuteo.* Охотящуюся птицу наблюдали 28 сентября над пойменными лугами в устье р. Чебиткер (приток Васюгана).

Белая куропатка *Lagopus lagopus.* Местные жители производят зимний отлов куропаток ловчими сетями. Таким способом добывается от 1 до 6 птиц в день на одного охотника.

Краснозобый конек *Anthus cervinus*. Одиночная птица перелетала по лугам вдоль р. Чебиткер 28 сентября.

Урагус *Uragus sibiricus.* На окраине пос. Наунак наблюдали кочующую стайку из 8 птиц 27 сентября.

Дубонос *Coccothraustes coccothraustes.* Три птицы отмечены сидящими на кустах в пос. Наунак 27 сентября.

Подорожник *Calcarius lapponicus.* В пос. Наунак 27 марта встречена одиночная птица. Крупные (до 200) и средние (по 30–50 особей) стаи отмечались 26 марта вдоль трассы Томск-Колпашево.

Следует отметить, что крупные стаи **подорожников** и **пуночек** *Plectrophenax nivalis* наблюдались вдоль автомагистрали только в южнотаежной подзоне (до широты г. Колпашево). Видимо в это время названные виды еще не подкочевывают в среднетаежную подзону. Зарегистрирована дата прилета **грача** *Corvus frugilegus* на широту Каргасока–Васюгана — 26 марта (стая из 30 птиц).

ЛИТЕРАТУРА

Блинова Т. К., Мухачева М. М., Мударисова Г. Р. Орнитологический очерк Нижнего Привасюганья (Томская область) // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2003. С. 37–48.

ПТИЦЫ СРЕДНЕТАЕЖНОГО ПРИВАСЮГАНЬЯ

Т. К. Блинова, И. В. Громышев, М. М. Самсонова, И. А. Лютаев, А. М. Хабибулина, И. Н. Мариничева

Кафедра экологии Томского гос. университета, пр. Кирова, 14, оф. 36, г. Томск, 634034. E-mail: btk@green.tsu.ru

Исследования проведены с 30 апреля по 12 июля 2004 г. в окрестностях п. Средний Васюган (280 км от устья р. Васюган; Каргасокский р-н, Томской области). Район работ лежит в подзоне средней тайги; географические координаты: 59° с. ш. 78° в. д.

Проводились утренние четырехчасовые учеты мигрирующих птиц с постоянного наблюдательного пункта (далее НП) на берегу р. Васюган в течение двух недель (4–17 мая), экскурсии и учеты на маршрутах. Последние осуществлялись с 16 мая по 12 июля в 11 ландшафтных урочищах (25-километровый отрезок русла р. Васюган, ее пойма, приречный поселок, междуречные и пойменные озера, сосновые боры, заболоченные березово-сосновые и смешанные темнохвойно-лиственные леса, сосново-сфагновые верховые и березовые переходные болота). Названные урочища за период работ посещались от 4 до 16 раз. Один раз в месяц проводились точечные ночные учеты: с неподвижного НП прослушивалась вокализация птиц с ночным типом активности. Такие учеты проведены на верховом сосново-сфагновом болоте (14 мая) и в экотонах: на берегу Васюгана, на опушке соснового леса (23 июня) и на границе закустаренной поймы и темнохвойной тайги (5 июля). Обнаружено 147 видов птиц (около 75 % от теоретически возможных на этой территории с любым статусом пребывания). Из них 96 видов определенно гнездятся, 25 гнездятся предположительно, еще 23 вида относятся к пролетным или имеют статус неясного пребывания. Гнездящимися считали виды, у которых найдены гнезда или слетки, а также многочисленные и широко распространенные, гнездование которых не вызывает сомнения.

Весну 2004 г. можно охарактеризовать как позднюю: снежный покров сохранялся всю первую декаду мая, Васюган вскрылся только 14 мая, что почти на 10 дней позже среднемноголетних сроков.

* * *

Краснозобая гагара *Gavia stellata*. Одиночная особь держалась на небольшом пойменном озере среди привасюганских лугов 14 мая.

Чернозобая гагара *G. arctica*. Редкая, предположительно гнездящаяся птица. Отмечены одиночные особи с НП 13 и 16 мая — они пролетели низко над рекой. Одна встреча зарегистрирована на междуречных открытых озерах в третьей декаде мая. Восемь птиц держалось на крупном междуречном озере 10 июля.

Красношейная поганка *Podiceps auritus*. На озерах среди пойменных лугов 14 мая наблюдали стаю около 300 особей; две птицы из этой стаи добыты местными охотниками и осмотрены нами.

Серый гусь *Anser anser*. Стая из 48 птиц пролетела клином утром 17 мая в северо-западном направлении.

Гуменник *A. fabalis*. Одиночная птица кружила 12 мая над Васюганом и пойменными лугами, присаживаясь на сухие гривки.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. Редкая, возможно, гнездящаяся

птица. По словам местных жителей, лебеди прилетели в середине апреля. За период наблюдений с НП отметили три пролетные группы: 8 мая 4 птицы пролетели на северо-восток, 12 мая — 2 на восток и 17 мая — 11 особей цепочкой на север. Одиночную птицу видели 30 июня на небольшом озере в пойме.

Кряква *Anas platyrhynchos*. Немногочисленная, видимо, гнездящаяся птица. Первая встреча — 2 мая. Пролет этой утки в пойме Васюгана практически не выражен: отмечались одиночки, пары и группы до 4 птиц; летели кряквы преимущественно вдоль русла Васюгана. В репродуктивный период в районе работ весьма немногочисленна, встречалась на озерках среди приречных мелколиственных лесов, на верховых сосново-сфагновых болотах, на пойменных привасюганских лугах (где наиболее обычна), а также на междуречных открытых озерах.

Шилохвость *A. acuta*. Немногочисленная, возможно, гнездящаяся утка. Первое появление шилохвости зафиксировано 5 мая, когда реки и озера были подо льдом. Весенний пролет в пойме Васюгана выражен более отчетливо, чем у предыдущего вида, но его также нельзя назвать интенсивным: за две недели наблюдений отмечено 7 транзитных стай с числом птиц от 3 до 56. Направление пролета преимущественно северное и северо-западное, т.е. не вдоль русла. Высокое обилие шилохвости зафиксировано на пойменных лугах во второй половине мая; встречалась она также в это время на ленточных пойменных озерах. Позднее не отмечалась.

Свиязь *A. penelope*. Обычная, по всей видимости, гнездящаяся утка. Весенний пролет не выражен (отмечено с НП всего две пары и одиночная особь). Была многочисленна только на междуречных открытых озерах во второй половине мая. Обычна на ленточных пойменных озерах, озерках и временных лужах среди приречных мелколиственных лесов, а также на обводненных мезотрофных березовых болотах.

Широконоска *A. clypeata*. Немногочисленная, возможно, гнездящаяся утка. Первое появление птиц зарегистрировано 13 мая. Явно транзитная группа из 4 птиц единственный раз отмечена с НП, т.е. можно говорить о полном отсутствии видимого утреннего пролета на данном отрезке Васюгана. Эта утка обычна только во второй половине мая на междуречных открытых озерах и на привасюганских пойменных лугах.

Чирок-свистунок *A. crecca*. Одна из самых немногочисленных речных уток, гнездование возможно. Характерно полное отсутствие видимого пролета. Отмечалась среди заболоченных березово-сосновых лесов, на пойменных лугах, пойменных и междуречных озерах, всюду в небольшом числе.

Чирок-трескунок *A. querquedula*. Обычная гнездящаяся утка. Появление первых птиц отмечено 4 мая. Как и у большинства других уток, утренний видимый пролет практически не выражен (отмечено всего 9 транзитных птиц). Во второй половине мая эта утка многочисленна на пойменных лугах и междуречных озерах, к июню обилие повсеместно снижается. Самку с большим выводком, включающим 15 утят размером с 1/5 ad, встретили на междуречном озере Лисье 3 июля; на ленточном пойменном озере 4 июля видели 3 выводка с числом утят 2, 10, 12, на междуречном открытом озере 10 июля — два выводка — 5 и 7 утят.

Красноголовая чернеть *Aythya ferina*. Очень редкая в районе исследований утка с неясным характером пребывания. Два самца осмотрены 14 мая в добыче местных охотников, одиночную самку видели на междуречном открытом озере 17 мая.

Хохлатая чернеть *A. fuligula*. Немногочисленная, возможно, гнездящаяся утка. Прилетела несколько позже речных уток — 13 мая. За период наблюдений с НП отмечено 34 транзитных птицы, при этом только одна стая насчитывала 20 особей, остальные птицы летели маленькими группами. Выражена слабая ориентация вдоль русла Васюгана. Концентрация пролетных птиц отмечалась в третьей декаде мая только на открытых междуречных озерах; иногда эта утка встречалась также на озерках и разливах среди пойменных лугов.

Гоголь *Bucephala clangula*. Обычная гнездящаяся птица. Как и у других уток, видимая весенняя миграция практически не выражена: за весь период наблюдений к явным мигрантам отнесено всего 10 особей в маленьких группах, все они четко придерживались русла реки. В летний период эта нырковая утка обычна только на озерах обоих типов и на привасюганских лугах.

Турпан *Melanitta fusca*. Стая из 19 птиц пролетала вдоль русла Васюгана в восточном направлении 14 мая и 15 мая 45 птиц пролетели на север.

Луток *Mergus albellus*. Самец и две самки пролетели вдоль русла Васюгана на северо-запад 14 мая.

Большой крохаль *M. merganser.* Семь птиц — пять самцов и две самки — держались 30 мая на небольшом междуречном озере.

Скопа *Pandion haliaetus*. Редкая, без сомнения, гнездящаяся птица. Отмечены две одиночные особи: одна из них сидела на вершине дерева среди сосново-сфагнового болота 11 мая, другая охотилась над Васюганом 14 мая (расстояние между местами встреч около 10 км). Летящую над Васюганом птицу видели также 9 июля.

Осоед *Pernis apivorus*. Одиночная особь отмечена 2 мая в полете над заболоченным березово-сосновым лесом.

Черный коршун *Milvus migrans*. Обычный гнездящийся хищник. Появился в Привасюганье весной до начала наших работ, возможно, в середине апреля. Обычен на р. Васюган, в поселке, на лугах; охотится он также над открытыми междуречными озерами и мезотрофными березовыми болотами.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. Немногочисленный, по всей видимости, гнездящийся хищник. Первая встреча датируется 2 мая. Хорошо выраженным пролет этого луня был 4 мая: за четыре часа наблюдений пролетело на северо-запад 12 одиночных птиц. Позднее изредка встречался только на привасюганских лугах.

Перепелятник *Accipiter nisus*. Отмечался только дважды — в сосновых рямах и заболоченных сосново-березовых лесах. Гнездование возможно.

Канюк *Buteo buteo*. Очень редок. Одиночная птица отмечена с НП 14 мая: она перемещалась в северном направлении.

Зимняк *B. lagopus*. Наблюдали хорошо выраженный пролет этого тундрового хищника 4 и 5 мая (возможно, зимняки летели и раньше, до начала наших наблюдений с НП). На север и северо-восток 4 мая пролетело 13 одиночных птиц за четыре часа утренних наблюдений; 5 мая отмечено 29 птиц, причем 8 и 5 из них перемещались группами, кружась спиральной каруселью, в северном направлении. На экскурсии 4 мая с 16 до 18 часов попутно зафиксировано около десятка мигрирующих зимняков.

Орлан-белохвост *Haliaetus albicilla*. Жилое гнездо найдено 13 мая на границе закустаренной поймы и гривы (в 8 км от пос. Средний Васюган); оно располагалось на сосне, в 16 м от земли. Гнездо явно надстроенное, многолетнее (известно местным охотникам ряд лет). Пара находилась около гнезда. При повторном осмотре 2 июля обнаружен один крупный птенец в гнезде; одна взрослая особь с беспокойными криками кружила рядом. Одиночную птицу, возможно, территориальную, несколько раз наблюдали в полете или на берегу открытого междуречного оз. Карасье.

Чеглок *Falco subbuteo*. Одиночная птица пролетела 4 мая в северном направлении; позднее нигде не встречали.

Дербник *F. columbarius*. Единственная встреча 13 мая на сосново-сфагновом болоте.

Кобчик *F. vespertinus*. Охотящуюся птицу наблюдали над закустаренной поймой 17 мая.

Пустельга *F. tinnunculus*. Встречена один раз в полете над сосново-сфагновым верховым болотом 13 мая.

Рябчик *Tetrastes bonasia*. Обычный гнездящийся вид, населяющий

ленточные сосновые боры-брусничники на террасах и смешанные лиственно-темнохвойные леса. Молодые птицы отмечены 4 июля в смешанном лиственно-темнохвойном лесу.

Тетерев *Lyrurus tetrix.* Обычный гнездящийся вид. В первых числах мая с березовых мезотрофных болот доносилось активное токование; в этом месте встречено 7 самцов, разлетающихся с тока.

Глухарь *Tetrao urogallus.* Обычен, гнездится. В заболоченном сосняке по кромке березового болота 2 мая видели трех самок и самца. Глухарей мы также часто встречали на гравийной трассе, проложенной от поселка к Северо-Васюганскому газовому месторождению: утром птицы вылетали сюда заглатывать гастролиты.

Белая куропатка *Lagopus lagopus.* Гнездящаяся птица со спорадичным распространением. Около десятка птиц в весеннем наряде видели в низкорослых сосновых рямах 2 мая с машины на 5-километровом отрезке проселочной дороги.

Серый журавль *Grus grus.* Пара птиц пролетела в северном направлении вечером 3 мая.

Коростель *Crex crex.* Сильно закустаренная пойма Среднего Васюгана неблагоприятна для обитания этого вида, он здесь не очень многочислен. Гнездится.

Погоныш *Porzana porzana.* Обычная, по всей видимости, гнездящаяся птица. Ночную вокализацию самцов слышали на заболоченных окраинах поселка, а также во время ночного учета (с точечного пункта) в луговой пойме Васюгана.

Малый зуек *Charadrius dubius.* Относительно редкий гнездящийся кулик. Первое появление зуйка отмечено 10 мая. На берегу искусственного пруда с песчаными берегами наблюдали 2 пары беспокоящихся птиц 23 июня.

Чибис *Vanellus vanellus.* Немногочисленный кулик, гнездование возможно. Группу из 14 птиц впервые видели 2 мая на льду Васюгана. Отмечена только одна относительно крупная стая из 19 особей, пролетевших 5 мая на северо-восток. В остальных случаях это были небольшие группы из 3–4 птиц. Во второй половине мая этот кулик был обычен на пойменных лугах, в других местообитаниях не отмечен.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus.* Зарегистрирована единственная встреча: 12 мая две птицы сидели на снегу возле пойменной речки, в 100 м — еще 3 птицы на том же берегу.

Черныш *Tringa ochropus.* Обычный гнездящийся кулик. Первое появление отмечено 4 мая. Пролет не выражен. В репродуктивный период этот кулик обычен в сосновых рямах, заболоченных березово-

сосновых лесах, на привасюганских пойменных лугах и березовых мезотрофных болотах.

Фифи *T. glareola.* Немногочисленная, предположительно гнездящаяся птица. Появление первых птиц зарегистрировано 12 мая. Видимая утренняя миграция не выражена. В районе работ предпочитает пойменные луга, где обычна; в других местообитаниях — на березовых болотах и приречных мелколиственных лесах — этот кулик редок.

Большой улит *T. nebularia*. Обычен на пролете, редок в гнездовое время, определенно гнездится. В районе работ птицы появились 10 мая. Это один из немногих куликов, видимая миграция которых хорошо выражена. Так, 12 мая пролетело 17 птиц, 13 мая — 43 птицы. В общей сложности за две недели наблюдений с НП отмечено 77 мигрантов. Только в одном случае среди них была стая в 24 особи, еще в трех случаях — группы из 6–10 птиц, остальные — преимущественно одиночки. В репродуктивный период большие улиты встречались на пойменных лугах и сосново-сфагновых верховых болотах; 2 июля наблюдали пару, проявлявшую сильное беспокойство, видимо, у выводка.

Перевозчик *Actitis hypoleucos.* Обычная гнездящаяся птица. Первые особи появились 12 мая. Пролет выражен слабо: кулики летели группами от 4 до 6 птиц низко над Васюганом. В репродуктивный период предпочитали ленточные пойменные озера–старицы и р. Васюган; на берегах междуречных открытых озер встречались реже.

Мородунка *Xenus cinereus.* Обычная гнездящаяся птица. Прилет зарегистрирован 16 мая. Видимых миграций в долине Васюгана не наблюдали. Во второй половине мая этот кулик обычен на пойменных лугах и берегах ленточных пойменных озер–стариц. Позднее токующих самцов отмечали по берегам Васюгана и на старицах.

Турухтан *Philomachus pugnax.* Транзитный вид. Отмечался в районе работ только в период весенних миграций. Пролет начался 13 мая. Во второй декаде этого месяца нередко встречались кормящиеся на привасюганских лугах стаи до 50 особей. Собственно транзитных стай с НП было отмечено две: 38 и 29 птиц перемещались в северном направлении. В третьей декаде мая и позднее этот кулик больше ни разу не отмечался.

Белохвостый песочник *Calidris temminckii.* Одиночная пролетная особь отмечена 28 мая среди разливов на пойменных лугах.

Бекас *Gallinago gallinago.* Обычный гнездящийся кулик. Первый ток зарегистрирован 8 мая. В репродуктивный период относительно эвритопен и обычен на всех типах болот, лугах и в лесах, где имеются поляны и заболоченные луговины.

Лесной дупель *G. megala.* Обычный гнездящийся кулик. Встре-

чался в меньшем спектре местообитаний, чем предыдущий вид: он обычен только в сосновых и мелколиственных приречных лесах.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola.* Тягу слышали 14 мая в сосновом лесу.

Большой кроншнеп *Numenius arquata.* Транзитный вид. Весенняя миграция в долине Васюгана хорошо выражена. Наблюдался с НП и направленный пролет мигрантов, и крупные стаи отдыхающих птиц. Первая встреча зарегистрирована 3 мая; 6 и 13 мая отмечены крупные стаи на лугах с числом особей соответственно 87 и 120. Летели кроншнепы преимущественно в восточном направлении, придерживаясь береговой линии, а также частично на север. Крупная пролетная стая из 65 особей отмечена лишь один раз, чаще это были небольшие группы из 4–10 птиц, иногда одиночки. Зарегистрировано с НП в общей сложности 95 мигрантов. Пролет проходил в сжатые сроки, в третьей декаде мая птицы отмечались исключительно редко.

Средний кроншнеп *N. phaeopus.* Отмечено только две встречи: 4 мая одиночная птица пролетела с криками над Васюганом в северо-восточном направлении и также одиночная особь отмечена на берегу открытого междуречного озера 14 мая.

Большой веретенник *Limosa limosa.* Редкий кулик, предположительно гнездится. Появление первых птиц зафиксировано 12 мая: стайка из 9 особей сидела на берегу пойменного озера. Видимый пролет выражен слабо: отмечено всего 24 транзитно летящих птицы, направление пролета преимущественно северное. Летели веретенники группами из 4–10 птиц или одиночками. В гнездовое время встречались изредка на пойменных лугах.

Сизая чайка *Larus canus.* Обычная, по всей видимости, гнездящаяся птица. Весенняя миграция хорошо выражена, это один из самых массовых пролетных видов. За период наблюдений отмечено 334 мигранта. При этом 75 % от этого числа птиц пролетело за один день 5 мая. Чайки четко придерживались русла как направляющей линии: 96 % птиц летело на северо-восток — восток. Чайки летели преимущественно крупными стаями от 20 до 50 особей (35 % пролетевших птиц) и группами (от 3 до 20 птиц — 47 %), реже — парами (11 %) и одиночками (7 %). Обилие сизых чаек неуклонно снижалось на озерах от мая к июлю.

Озерная чайка *L. ridibundus.* Эту чайку наблюдали лишь дважды: 3 мая одна особь держалась в стае сизых чаек на льду Васюгана и 16 мая 3 птицы сидели на оз. Лисьем, также вместе с сизыми чайками.

Речная крачка *Sterna hirundo.* Немногочисленная, возможно, гнездящаяся птица. Первые птицы появились на Среднем Васюгане 13 мая.

Миграция практически не отмечалась. В репродуктивный период довольно редка.

Клинтух *Columba oenas.* Воркование самца слышали в сосновом лесу 3 мая.

Большая горлица *Streptopelia orientalis.* Немногочисленная, возможно, гнездящаяся птица. Появилась в районе работ 14 мая. Придерживается лесов с доминированием в древостое сосны, где обычна.

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus.* Первое появление зарегистрировано 14 мая. Кукушка обычна во всех местообитаниях, за исключением водных.

Глухая кукушка *C. saturatus.* Прилетела в район Среднего Васюгана на три дня позже обыкновенной, 17 мая. Обычна во всех облесенных биотопах.

Белая сова *Nyctea scandiaca.* Зимует в районе исследований. На поляне среди соснового леса видели эту сову 3 мая.

Ушастая сова *Asio otus.* Редкая, возможно, гнездящаяся сова. Обнаружена во время ночного учета 14 мая по вокализации в сосновом лесу.

Болотная сова *A. flammeus.* Редкая, очевидно, гнездящаяся птица: территориальную пару постоянно встречали на мезотрофном березовом болоте.

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis.* Одиночную птицу, сидевшую на сосне среди сосново-сфагнового болота, видели 12 мая.

Козодой *Caprimulgus europaeus.* Обычная гнездящаяся птица сосновых и смешанных лиственно-темнохвойных лесов.

Черный стриж *Apus apus.* Редок, возможно, гнездится. Птиц видели в полете над сосновыми лесами.

Вертишейка *Jynx torquilla.* Зарегистрирована единственная встреча 17 мая в приречном мелколиственном лесу.

Желна *Dryocopus martius.* Скорее редкая, чем обычная, без сомнения гнездящаяся птица сосновых и смешанных темнохвойных лесов.

Седой дятел *Picus canus.* Немногочисленный, возможно, гнездящийся дятел. Пару птиц наблюдали 3 мая в заболоченном сосновом лесу.

Пестрый дятел *Dendrocopos major.* Обычная гнездящаяся птица всех типов леса. Найдено гнездо 23 июня в дупле старой осины, в нем кричали птенцы, родители беспокоились рядом.

Белоспинный дятел *D. leucotos.* Обычная гнездящаяся птица, предпочитающая осветленные мелколиственные леса.

Малый дятел *D. minor.* Обычная гнездящаяся птица, приуроченная в основном к мелколиственным лесам. В приречном осиново-березовом лесу 29 июня найдено два гнезда. Оба располагались в дуп-

лах в старых осинах (2 и 4 м от земли), в обоих кричали птенцы, пары беспокоились рядом.

Трехпалый дятел *Picoides tridactylus.* Редкий, возможно, гнездящийся вид. Две встречи зафиксированы за период исследований: в сосновом заболоченном лесу 2 июля и в смешанном лиственно-темнохвойном лесу 6 июля.

Береговая ласточка *Riparia riparia.* Многочисленная гнездящаяся птица береговых обрывов р. Васюган. Очень ранняя встреча первой ласточки зарегистрирована 3 мая. Миграция наблюдалась только 17 мая, за это утро 46 птиц пролетело в северо-западном направлении и 37 — в восточном; птицы четко придерживались русла реки. В репродуктивный период, помимо реки Васюган, где вид многочислен, отмечались охотящиеся особи над приречными поселками, пойменными лугами и озерами. Молодые ласточки появились в приречном поселке 1 июля.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica.* Многочисленная гнездящаяся птица поселков. Прилетели в Привасюганье 12 мая и сразу в массе появились в поселке. Видимый пролет не наблюдался. В летний период нигде кроме поселков не отмечалась.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis*. Поющий над заснеженной поймой Васюгана самец отмечен 2 мая; позднее нигде не встречался.

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris.* С 10 по 19 мая отмечались стаи и группы птиц от 7 до 100 особей на береговых луговинах и местном аэродроме.

Лесной конек *Anthus trivialis.* Обычная гнездящаяся птица. Населяет в Привасюганье преимущественно верховые сосново-сфагновые болота, реже отмечался в приречных мелколиственных лесах, на окраинах поселка.

Зеленый конек *A. hodgsoni.* Обычная гнездящаяся птица всех типов леса.

Степной конек *A. richardi.* Немногочисленная, видимо, гнездящаяся птица. Отмечена в приречных мелколиственных лесах с полянами, на опушках и в закустаренной пойме.

Желтая трясогузка *Motacilla flava.* Обычная гнездящаяся птица. Первые особи встречены на лугах 12 мая. Населяют в Привасюганье пойменные луга и более нигде не встречены.

Горная трясогузка *M. cinerea.* Немногочисленная, возможно, гнездящаяся птица. Первая встреча зарегистрирована 3 мая. Населяет берега малых речек — притоков Васюгана.

Белая трясогузка *M. alba.* Обычная, местами многочисленная гнездящаяся птица. Пролет этой рано появляющейся (в середине апреля)

трясогузки растянут: 5 мая пролетную стаю из 62 особей наблюдали сидящей на проводах в поселке. Стая из 50 мигрантов отмечена 6 мая с НП: птицы перемещались в северо-восточном направлении. В репродуктивный период населяет преимущественно приречный поселок, где многочисленна, изредка отмечается также и в удаленных от поселка биотопах (в лесах, на болотах). Пара строила гнездо в старой брошенной на берегу барже 4–10 мая. Молодые птицы появились в поселке 3 июля.

Обыкновенный жулан *Lanius collurio.* Редкая, возможно, гнездящаяся птица. Пара встречена на окраине поселка 3 июня.

Серый сорокопут *L. excubitor.* Единственная встреча зарегистрирована 2 мая на березовом мезотрофном болоте.

Иволга *Oriolus oriolus.* Относительно редка, по всей видимости, гнездится. Первую песню слышали 16 мая. Населяет участки леса среди привасюганских лугов и приречные мелколиственные леса.

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris.* Многочисленная гнездящаяся птица поселков. Скворцы еще встречались в поселке 22 июня, но к первым числам июля покинули его и переместились вместе с молодыми на пойменные луга.

Кукша *Perisoreus infaustus.* Немногочисленная, без сомнения, гнездящаяся птица. Встречается в Привасюганье в смешанных лиственно-темнохвойных и в заболоченных березово-сосновых лесах.

Сойка *Garrulus glandarius.* Единственная встреча одиночной птицы зарегистрирована в заболоченном березово-сосновом лесу 3 июня.

Сорока *Pica pica.* Обычная, в поселке многочисленная гнездящаяся птица. Начало откладки яиц пришлось на последнюю пятидневку апреля — начало мая. В это время осмотрено 4 гнезда, в которых находилось от двух до восьми яиц. Вылупление птенцов в одном из гнезд отмечено 3 июня.

Галка *Corvus monedula.* В Привасюганье относительно редка, возможно, гнездится. Изредка встречалась только в первой половине мая.

Грач *C. frugilegus.* В первой половине мая одиночки и небольшие группы птиц встречались в поселке, позднее не отмечены.

Серая ворона *C. cornix.* Обычная гнездящаяся птица. Придерживается в основном поселка и его ближайших окрестностей, но встречалась и в других биотопах, в том числе — в лесах с участием темнохвойных пород. Готовое, еще пустое гнездо осмотрено 1 мая; 28 мая в нем находилось 4 яйца; 22 июня в гнезде сидели два крупных птенца, один из которых слетел при осмотре.

Гибридная ворона *C. corone* x *C. cornix.* Со 2 по 5 мая в поселке встречены 5 гибридных ворон из группы «темных гибридов» (Блинов,

1998): общий тон окраски у них черный, брюхо и грудь в серых пестринах разной степени интенсивности. Позднее птицы исчезли и более не встречались.

Ворон *C. corax.* Эвритопная, обычная гнездящаяся птица, зарегистрированная в ряде местообитаний, в том числе — в поселке. Концентрацию этих птиц наблюдали на поселковой свалке: здесь можно было встретить до трех десятков особей. Здесь же отмечена пара с крупным молодым 1 июля.

Свиристель *Bombycilla garrulus.* Многочисленная на весенних кочевках и редкая в гнездовое время птица. В первой декаде мая по поселку кочевали стаи до сотни птиц, позднее здесь не отмечались. В репродуктивный период свиристелей изредка наблюдали только на верховых сосново-сфагновых болотах.

Певчий сверчок *Locustella certhiola.* Обычный, на лугах многочисленный гнездящийся вид.

Пятнистый сверчок *L. lanceolata.* Относительно редок, возможно, гнездится. Наблюдался только на мезотрофных березовых болотах.

Садовая камышовка *Acrocephalus dumetorum.* Обычная гнездящаяся птица. Первые поющие самцы отмечены 23 мая. Гнезда с кладками находили с 5 по 26 июня.

Садовая славка *Sylvia borin.* Обычная гнездящаяся птица. Найдено недостроенное гнездо 5 июня в кустарниковых зарослях под пологом приречного мелколиственного леса, пара беспокоилась рядом.

Серая славка *S. communis.* Обычная гнездящаяся птица. Появилась в Привасюганье 15 мая.

Славка-завирушка *S. curruca.* Обычная гнездящаяся птица. Первые поющие самцы появились 16 мая. Встречалась эта славка в поселках, заболоченных березово-сосновых лесах и сосновых борах, в приречных мелколесьях.

Весничка *Phylloscopus trochilus.* Обычная гнездящаяся птица. Первую песню услышали 3 мая. Населяет облесенные болота и заболоченные леса.

Теньковка *Ph. collybita.* Обычная гнездящаяся птица. Первая песня отмечена 3 мая, хотя, возможно, она появилась раньше. Населяет все лесные местообитания, встречается и в поселках.

Таловка *Ph. borealis.* Обычная гнездящаяся птица. Первые поющие самцы отмечены 15 мая. Приурочена к лесам с доминированием сосны.

Зеленая пеночка *Ph. trochiloides.* Немногочисленная гнездящаяся птица. Появилась в Привасюганье 16 мая. Не выявлено предпочтения какому-либо типу леса.

Мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca.* Скорее редкая, чем обычная, возможно, гнездящаяся птица. Отмечалась только в сосновых борах и приречных мелколиственных лесах.

Малая мухоловка *F. parva.* Редкая гнездящаяся птица. Встречена в первой декаде июня в заболоченных березово-сосновых лесах и в начале июля — в смешанных лиственно-темнохвойных лесах. Здесь добыт слеток.

Серая мухоловка *Muscicapa striata.* Пару мухоловок наблюдали в мелколиственном приречном лесу 18 мая.

Черноголовый чекан *Saxicola torquata.* Немногочисленная, по всей видимости, гнездящаяся птица. Приурочена в основном к луговинам и окраинам поселка.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe.* Обычная гнездящаяся птица поселков. Первую птицу встретили 5 мая, возможно, она прилетела раньше.

Горихвостка-лысушка *Phoenicurus phoenicurus.* Обычная гнездящаяся птица. Первые поющие самцы отмечены 4 мая, не исключено и более раннее ее появление. Эвритопный вид, встреченный во всех в той или иной мере облесенных местообитаниях и в поселках.

Зарянка *Erithacus rubecula.* Редкая, возможно, гнездящаяся птица. Первую песню слышали 3 мая. Тяготеет к сосновым борам и смешанным лиственно-темнохвойным лесам.

Синехвостка *Tarsiger cyanurus.* Обычная, без сомнения, гнездящаяся птица лесов с преобладанием в древостое сосны. Первые поющие самцы отмечены 8 мая.

Соловей-красношейка *Luscinia calliope.* Единственную песню слышали в участке леса среди пойменных лугов 30 июня.

Варакушка *L. svecica.* Редкая, возможно, гнездящаяся птица. Встречена только в поселке в первой половине мая.

Чернозобый дрозд *Turdus atrogularis.* Редкий гнездящийся дрозд. Пару наблюдали в поселке 13 мая. Еще одну пару, сильно беспокоившуюся, — в мелколиственном приречном лесу 30 июня.

Рябинник *T. pilaris.* Обычный гнездящийся вид. Хорошо выражена его весенняя миграция: с НП отмечено 349 явно пролетных птиц, которые перемещались вдоль русла Васюгана крупными стаями с числом птиц от 37 до 150 (5 стай) и группами по 3–9 особей. В мелколиственном приречном лесу 5 июня осмотрено гнездо с кладкой из 6 яиц, оно располагалось на старой березе в 7 м от земли.

Белобровик *T. iliacus.* Обычный гнездящийся вид. В мелколиственном лесу 5 июня найдено гнездо с двумя яйцами, устроенное на поваленном дереве в 20 см от земли. При повторном осмотре гнезда

22 июня в нем находилось 4 маленьких незрячих птенца; самка слетела только при приближении руки.

Певчий дрозд *T. philomelos.* Обычный гнездящийся дрозд. Населяет заболоченные березово-сосновые леса и сосновые боры.

Деряба *T. viscivorus.* Обычный гнездящийся вид. Встречается в тех же типах леса, что и певчий дрозд.

Длиннохвостая синица *Aegithalos caudatus.* Обычная, местами многочисленная, видимо, гнездящаяся птица. Весьма эвритопна: встречалась во всех типах леса, а также на облесенных болотах и лугах.

Пухляк *Parus montanus.* Обычная гнездящаяся птица. Гнездо найдено 14 мая на окраине березового болота; оно располагалось в дупле старой березы, на высоте около 1,5 м от земли. Глубокое дупло не удалось осмотреть, но оно было определенно жилое, так как родители постоянно вылетали и залетали в него.

Московка *P. ater.* Обычная гнездящаяся птица. Предпочитает леса с участием темнохвойных пород.

Большая синица *P. major.* Обычная гнездящаяся птица. Многочисленна в поселке, реже встречалась в сосновых борах и приречных мелколиственных лесах.

Поползень *Sitta europaea.* Обычная гнездящаяся птица. Предпочитает леса с участием темнохвойных пород.

Домовый воробей *Passer domesticus.* Многочисленная гнездящаяся птица поселков, в других биотопах не встречается. Кормление слетка родителями видели 2 июля.

Полевой воробей *P. montanus.* Обычная гнездящаяся птица. Нигде, кроме поселков, не наблюдался.

Зяблик *Fringilla coelebs.* Обычен, гнездится во всех типах леса. Миграция этой рано прилетающей птицы идет, по-видимому, еще и в мае: 8 мая отмечена стая из 25 особей, летящих на северо-восток.

Юрок *F. montifringilla.* Обычная гнездящаяся птица всех типов леса и облесенных болот.

Черноголовый щегол *Carduelis carduelis.* В районе исследований относительно редок, возможно, гнездится.

Коноплянка *Acanthis cannabina.* Единственная встреча: одиночный самец зарегистрирован в поселке 1 июля.

Чечетка *A. flammea.* Многочисленная весной и обычная в репродуктивный период птица; возможно, гнездится. В первой половине мая наблюдалась концентрация птиц в поселке, позднее они встречались только в лесах.

Чечевица *Carpodacus erythrinus.* Обычная гнездящаяся птица.

Населяет поселки, березово-сосновые и сосновые леса, облесенные болота и закустаренные луга.

Урагус *Uragus sibiricus.* Редок, возможно, гнездится. Отмечен только в приречных мелколиственных лесах во второй половине мая.

Клест-еловик *Loxia curvirostra.* Обычная гнездящаяся птица. Встречался и в сосновых, и в темнохвойных лесах.

Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula.* Обычная гнездящаяся птица. В первой половине мая часто встречался в поселках, позднее изредка регистрировался в светло- и темнохвойных лесах.

Дубонос *Coccothraustes coccothraustes.* Весной многочисленная в поселках, в репродуктивный период редкая, возможно, гнездящаяся птица. В первой декаде мая в поселке встречали стайки до 30 особей и более мелкие группы.

Обыкновенная овсянка *Emberiza citrinella.* Обычная гнездящаяся птица. Обитает на мезотрофных березовых болотах и закустаренных пойменных лугах.

Белошапочная овсянка *E. leucocephala.* Обычная гнездящаяся овсянка. Наблюдали концентрацию, возможно, пролетных птиц 15 мая на верховых сосново-сфагновых болотах. Слеток, около которого беспокоилась самка, найден 22 июня на опушке соснового леса.

Камышовая овсянка *E. schoeniclus.* Немногочисленная, видимо, гнездящаяся птица. Первый поющий самец отмечен 3 мая. Отмечалась на закустаренных пойменных лугах и мезотрофных березовых болотах.

Овсянка-ремез *E. rustica.* Обычная в период весенней миграции и позднее — редкая птица; возможно, гнездится.

Овсянка-крошка *E. pusilla.* Обычная, определенно гнездящаяся птица. Встречается на верховых сосново-сфагновых и переходных березовых болотах, а также на закустаренных пойменных лугах.

Дубровник *E. aureola.* Немногочисленная гнездящаяся птица заболоченных луговин среди поселков и пойменных лугов. Прилетает поздно, в последней пятидневке мая.

Пуночка *Plectrophenax nivalis.* Зимующая птица. В первой половине мая пуночек еще встречали в Привасюганье. С 5 по 7 мая отмечено с НП 3 стаи с числом птиц 18, 30 и 90, они перемещались на север–северо-восток.

ЛИТЕРАТУРА

Блинов В. Н. Врановые Западно-Сибирской равнины. М.: «КМК Scientific Press Ltd.», 1998. 284 с.

К ФАУНЕ ПТИЦ РЫБОРАЗВОДНЫХ ПРУДОВ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА БАШКОРТОСТАНА

В. А. Валуев

Научно-учебный музей Башкирского государственного университета, ул. Фрунзе, 32, г. Уфа, 450074. E-mail: ValuyevVA@bsu.bashedu.ru

Территория, на которой проходили наблюдения, находится в южной лесостепной подзоне, недалеко от подножия возвышенности Общий Сырт. Федоровский район находится на юго-западе Башкирии. Деревня Бала-Четырман, в окрестности которой сооружены рыборазводные пруды, расположена на его востоке (53°05' с. ш., 55°25' в. д.). Эти искусственные водоемы интересны тем, что представляют собой те немногие водные стации западной части республики, которые служат не только местами отдыха водоплавающих и околоводных птиц во время их перелетов, но и воспроизводственными участками. Кроме этих прудов на западе республики есть еще несколько, но такого видового разнообразия птиц и их обилия на них нет.

Местность занята преимущественно полями с лесозащитными полосами. Сами пруды представляют собой неглубокие котлованы разного размера, которые летом зарастают по берегам тростником и камышом.

Наши наблюдения проводились во второй декаде августа и 1 ноября 2002 г., в начале и конце мая 2003 г., в начале мая 2004 г. и первой декаде июля 2004 г.

* * *

Чомга *Podiceps cristatus*. 18 августа 2002 г. вместе с птенцами было 20 особей, 1 мая 2003 мы насчитали 8, а 31 мая того же года — только 2 птицы. 3 мая 2004 г. на прудах было 15 взрослых особей, а 8 июля — вместе с птенцами — 39.

Серощекая поганка *P. grisegena*. 2 молодые особи встретились нам 1 ноября 2002 г. и одна взрослая — 3 мая 2004 г.

Красношейная поганка *P. auritus*. Наблюдали пару этих птиц единственный раз — 3 мая 2004 г. Птицы плавали среди черношейных поганок.

Черношейная поганка *P. nigricollis*. Стайку из 50 особей наблюдали 3 мая 2004 г.

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. Все лето 2002 г. и до 14 октября на прудах жило 19 этих птиц. На следующий год прилетела только одна.

Серая цапля *Ardea cinerea*. 18 августа 2002 г. на прудах летала стая из 10 особей. 1 мая 2003 г. мы насчитали 11 птиц, а 31 мая того же года — только 2. Они нам не встретились 3 мая 2004 г., а 8 июля 2004 г. мы обнаружили 27 особей.

Лебедь-шипун *Cygnus olor*. В конце второй декады августа 2002 г. на прудах жила самка с 3 птенцами, самца нашли мертвым еще в июне. 1 мая 2003 г. там была одна птица, а 31 мая — две. В 2004 г., 3 мая на прудах нам встретилась одна особь, а за неделю до этого опускалась стая из 30 птиц. 8 июля мы видели трех лебедей.

Белолобый гусь *Anser albifrons*. 32 птицы держались на одном из прудов с 28 апреля по 3 мая 2004 г.

Огарь *Tadorna ferruginea*. 3 мая 2004 г. мы встретили одну особь, а 8 июля — выводок из 2 взрослых птиц и 8 утят.

Кряква *Anas platyrhynchos*. В конце второй декады августа 2002 г. мы видели 6 взрослых птиц и 14 молодых. 1 мая 2003 г. и 3 мая 2004 г. крякв не наблюдалось. 8 июля 2004 г. насчитали вместе с молодняком 32 птицы.

Шилохвость *A. acuta*. Встретили дважды: 12 особей 19 августа 2002 г. и две птицы — 1 мая 2003 г.

Свиязь *A. penelope*. Этих уток мы наблюдали лишь весной. 1 мая 2003 г. — 30 особей и 3 мая 2004 г. — 15. Одиночная особь плавала на пруду 31 мая 2003 г.

Серая утка *A. strepera*. 18 и 19 августа 2002 г. видели самку с 3 утятами. 31 мая 2003 г. встретили трех взрослых птиц, а 8 июля 2004 г. — 26 особей (вместе с молодыми).

Широконоска *A. clypeata*. Две птицы встретились 31 мая 2003 г. и 3 особи — 3 мая 2004 г.

Чирок-свистунок *A. crecca*. Мы наблюдали этот вид только один раз — 3 мая 2004 г. Шесть птиц держались в стае хохлатых чернетей.

Чирок-трескунок *A. querquedula*. Встречался постоянно в количестве от 5 до 10 особей.

Красноголовая чернеть *Aythya ferina*. 18 августа 2002 г. на прудах обитало 12 птиц. 1 мая 2003 г. на пруд села стая из 40 особей, а 3 мая 2004 г. — 10. 8 июля 2004 г. вместе с птенцами мы насчитали 29 птиц.

Хохлатая чернеть *A. fuligula*. В середине августа 2002 г. на прудах держалось около 30 этих птиц, а 1 ноября того же года — 6. 1 мая 2003 г. на озере плавали 30 особей, а в начале мая 2004 г. около 140 птиц держались вместе плотной стаей. 8 июля 2004 г. вместе с птенцами мы насчитали 45 уток.

Морская чернеть *A. marila*. Единственная встреча произошла 3 мая 2004 г. Самец был обнаружен нами среди хохлатых чернетей.

Гоголь *Bucephala clangula*. Встречался на прудах только весной: 7 птиц — 1 мая 2003 г. и стая из 50 особей — 3 мая 2004 г.

Турпан *Melanitta fusca*. Две птицы мы наблюдали 18 августа 2002 г. и 11 особей — на следующий день.

Синьга *M. nigra*. Стайка из 10 птиц держалась на прудах 18 и 19 августа 2002 г.

Луток *Mergus albellus*. 18 птиц перелетали с пруда на пруд 1 мая 2003 г.

Черный коршун *Milvus migrans*. Одну птицу мы наблюдали 8 июля 2004 г.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. Самец держался рядом с водоемом в начале мая 2003 г.

Степной лунь *C. macrourus*. Самец отмечен 1 мая 2003 г.

Болотный лунь *C. aeruginosus*. Постоянно держится одна пара. В начале июля 2004 г. выводок насчитывал 6 птиц.

Ястреб-тетеревятник *Accipiter gentilis*. Активно охотился на грачей и серых ворон в середине августа 2002 г.

Ястреб-перепелятник *A. nisus*. Безрезультатно нападал на сорок 19 августа 2002 г.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. 8 июля 2004 г. взрослая птица несколько раз появлялась над прудами.

Орлан-долгохвост *H. leucoryphus*. Взрослая птица вместе с молодой кружили в районе прудов 19 августа 2002 г.

Чеглок *Falco subbuteo*. 3 особи мы наблюдали в середине августа 2002 г.

Лысуха *Fulica atra*. 9 птиц, вместе с молодыми, обитали на прудах в августе 2002 г. и 10 птиц — в начале июля 2004 г.

Малый зуек *Charadrius dubius*. По 2 птицы встречены 31 мая 2003 г. в стайке с другими куликами и 3 мая 2004 г.

Галстучник *Ch. hiaticula*. Эту птицу мы наблюдали в смешанной стайке с другими куликами 31 мая 2003 г.

Чибис *Vanellus vanellus*. Три птицы кружили над прудами 31 мая 2003 г.

Черныш *Tringa ochropus*. Одну особь мы наблюдали 18 августа 2002 г. и 3 птицы — 1 мая 2003 г.

Фифи *T. glareola*. Около 10 птиц держалось на прудах в середине августа 2002 г. и 2 кулика — в конце мая 2003 г.

Поручейник *T. stagnatilis*. Одна особь встретилась нам 31 мая 2003 г. и стайка из 20 птиц — 8 июля 2004 г.

Травник *T. totanus*. Встретился единственный раз — 1 мая 2003 г.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. 18 августа 2002 г. нам встретился один кулик и 1 мая 2003 г. — три особи.

Мородунка *Xenus cinereus*. Одна особь находилась в смешанной стайке куликов, которые держались на прудах в конце мая 2003 г.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*. Один кулик встретился нам 31 мая 2003 г.

Турухтан *Philomachus pugnax*. Стайка из 15 особей находилась на прудах в середине августа 2002 г.

Чернозобик *Calidris alpina*. В конце мая 2003 г. на одном из прудов кормились 20 куликов.

Кулик-воробей *C. minuta*. 8 особей держались в смешанной стайке с другими куликами в конце мая 2003 г.

Белохвостый песочник *C. temminckii*. Встречены 6 особей в стайке с куликами-воробьями и другими куликами 31 мая 2003 г.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. Одну птицу мы наблюдали 30 мая 2003 г.

Большой веретенник *Limosa limosa*. 31 мая 2003 г. мы встретили одну птицу, а 2 мая 2004 г. — шесть.

Хохотунья *Larus cachinnans*. Постоянно обитает на прудах. В начале мая 2002 и 2004 гг. держалось несколько птиц, а в июле и августе — от 20 до 50.

Сизая чайка *L. canus*. Стая более 40 особей (взрослые с молодыми) обитала на прудах в середине августа 2002 г. и более 40 птиц — в начале мая 2003 г.

Озерная чайка *L. ridibundus*. В августе 2002 г. на прудах держалась стайка из 40 взрослых птиц вместе с молодыми. 1 мая 2003 г. мы видели только трех, а 31 мая 2003 г. — ни одной. В начале мая 2004 г. мы наблюдали стайку из 10 взрослых и 11 молодых птиц. К концу первой декады июля 2004 г. их насчитывалось около 200.

Малая чайка *L. minutus*. Шесть взрослых птиц кормили четырех молодых в августе 2002 г. 1 мая 2003 г. мы наблюдали 4 особи, а в начале июля 2004 г. там обитало около 30 чаек.

Морской голубок *Larus genei*. Одна птица стояла на мелководье в стайке озерных чаек 3 мая 2004 г. Птицы стояли «плечо к плечу», и разницу в размере, строении и оперении тела, и особенно в форме клюва, хорошо было видно.

Черная крачка *Chlidonias niger*. Одна птица встретилась нам 31 мая 2003 г. и 60 — 8 июля 2004 г.

Речная крачка *Sterna hirundo*. В конце мая 2003 г. нам встретилась одна птица. В начале июля 2004 г. мы наблюдали 10 особей.

Вяхирь *Columba palumbus*. 3 птицы перелетали над территорией прудового хозяйства в августе 2002 г.

Кукушка *Cuculus canorus*. Встретилась нам 18 августа 2002 г.

Удод *Upupa epops*. Эту птицу мы наблюдали 1 мая 2003 г.

Пестрый дятел *Dendrocopos major*. Встретился единственный раз — 19 августа 2002 г.

Береговая ласточка *Riparia riparia*. В начале мая 2003 и 2004 гг. этот вид отсутствовал на прудах. Но летом 2002–2004 гг. береговушек насчитывалось от 100 до 300.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Две особи присутствовали на изучаемой территории в середине августа 2002 г. и одна птица замечена 1 мая 2003 г.

Желтая трясогузка *Motacilla flava*. На прудах постоянно живут несколько пар. В июле 2004 г. вместе с молодняком мы насчитали около 30 птиц.

Желтоспинная трясогузка *M. lutea*. Три особи встречены в августе 2002 г. и 4 птицы — в конце мая 2003 г.

Желтоголовая трясогузка *M. citreola*. Одну особь мы наблюдали в начале мая 2003 г. и 10 птиц насчитывалось 8 июля 2004 г.

Белая трясогузка *M. alba*. Трудно объяснить ее отсутствие 31 мая 2003 г. и 3 мая 2004 г. В августе 2002 г. нам встретилось 4 особи, 1 мая 2003 г. — 2 птицы и 8 июля 2004 г. вместе с птенцами мы насчитали 50 трясогузок.

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris*. 8 особей мы наблюдали 1 мая 2003 г.

Сорока *Pica pica*. В августе 2002 г. на территории прудов присутствовали более 20 птиц. В остальное время — не более одного десятка.

Галка *Corvus monedula*. Стая более 100 птиц перелетала над прудами в середине августа 2002 г.

Грач *C. frugilegus*. Грачи постоянно держатся на территории рыбного хозяйства, являясь одним из его главных вредителей. Работники хозяйства в качестве отпугивающего средства подвешивают на шестах подранков грачей. В поле зрения всегда присутствуют около десятка этих птиц, но налетают стаи до 200 особей.

Серая ворона *C. cornix*. До десятка птиц всегда находятся на прудах. Иногда образуют стаи до 50 особей.

Ворон *C. corax*. Единственная птица встречена 19 августа 2002 г.

Камышовка-барсучок *Acrocephalus schoenobaenus*. Видимо прилетает поздно, в мае 2003 и 2004 гг. этот вид мы не встречали. Но в августе 2002 г. и начале июля 2004 г. мы этих птиц на территории хозяйства насчитывали около 20.

Болотная камышовка *A. palustris*. То, что мы сказали о барсучке, можно сказать и об этом виде, но болотных камышовок вдвое меньше.

Дроздовидная камышовка *A. arundinaceus*. Поющий самец встречен 8 июля 2004 г.

Варакушка *Luscinia svecica*. В зарослях ив по берегам каналов постоянно живут около 4 пар этих птиц.

Рябинник *Turdus pilaris*. 7 особей встречены 1 мая 2003 г.

Ремез *Remiz pendulinus*. В августе 2002 г. и июле 2004 г. мы наблюдали выводки, насчитывающие около десятка особей.

Полевой воробей *Passer montanus*. Около 20 птиц держатся в основном у кормушек.

Черноголовый щегол *Carduelis carduelis*. 5 особей держались на границе хозяйства в августе 2002 г.

Коноплянка *Acanthis cannabina*. Самца с самкой мы наблюдали на дороге между прудов 1 мая 2003 г.

Камышовая овсянка *Emberiza schoeniclus*. 7 особей мы наблюдали в августе 2002 г. и одну — 1 мая 2003 г.

ГНЕЗДОВАНИЕ КРАПИВНИКА В СРЕДНЕУРАЛЬСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ»

М. С. Галишева

Дворец творчества учащихся г. Екатеринбурга, ул. К. Либкнехта, 44, 620151.
E-mail: galishev@mail.ru

В окрестностях п. Бажуково (Свердловская область, около 15 км к югу от г. Нижние Серги), на правом берегу р. Серга, недалеко от скалы «Дыроватый камень», 19 июля 2002 г. обнаружена пара сильно тревожащихся **крапивников** *Troglodytes troglodytes*. Самец изредка громко пел. Там же 20 июля наблюдали выводок крапивника примерно из восьми слетков. Гнездовое местообитание — смешанный лес с преобладанием ели и пихты, с густой травянистой растительностью и валежником. Гнездящиеся крапивники отмечены нами здесь впервые за 15 лет наблюдений.

КУЛИК-СОРОКА НА РЕКЕ УФЕ НА ЮГО-ЗАПАДЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М. С. Галишева

Дворец творчества учащихся г. Екатеринбурга, ул. К. Либкнехта, 44, 620151.
E-mail: galishev@mail.ru

Пара сильно беспокоившихся **куликов-сорок** *Haematopus ostralegus* встречена 18 июля 2004 г. у с. Урмикеево, в 6 км ниже по

течению р. Уфы от г. Михайловска Свердловской области, на песчано-галечном пляже, частично заросшем травой и невысоким ивняком. Гнездо или птенцы обнаружены не были, однако поведение птиц позволяет предположить гнездование.

К ОРНИТОФАУНЕ ЮГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В. А. Гашек

Центр «Аркаим», ул. Молодогвардейцев, 57/1, Челябинск, 454021.
E-mail: center_arkaim@mail.ru: для В. А. Гашек

Исследования проводились с 13 по 20 сентября 2003 г. в Варненском районе Челябинской области. Были осмотрены горько-соленые озера Белое и Баканжул и засоленное болото Жабагы.

Оз. Баканжул (53°15' с. ш., 61°24' в. д.), представляет собой мелководный водоем площадью около 0,5 км^2, окруженный мощным тростниковым бордюром, с грязевыми отмелями, пересекающими в нескольких местах плес. Болото Жабагы (11 км к западу от оз. Баканжул) по площади примерно сопоставимо с Баканжулом, но, в отличие от него, представляет собой сплошные заросли тростника. Оз. Белое, напротив, имеет абсолютно голые берега, поверхность воды полностью покрыта галофильной растительностью. Все водоемы расположены среди полей и пастбищ, перемежающихся с многочисленными березовыми колками, многие из которых заболочены. Ниже приводятся данные о наиболее интересных встречах.

Савка *Oxyura leucocephala*. 4 особи, державшиеся парами, наблюдались на оз. Баканжул в течение всех 6 дней нашего пребывания. Птицы держались постоянно в юго-западной части озера в стае черношейных поганок и красноголовых чернетей.

Обыкновенный канюк *Buteo buteo*. В окрестностях оз. Баканжул 16 сентября наблюдался массовый пролет: за 1–2 минуты на высоте от 15 до 400–500 м в западном направлении пролетело более 300 канюков.

Серый журавль *Grus grus*. 13 сентября у болота Жабагы взлетела стая, насчитывавшая около 80 особей. С 14 по 19 сентября над оз. Баканжул ежедневно пролетали стаи от 6 до 80–100 птиц. Крики журавлей постоянно слышались из окрестных заболоченных колков. Над оз. Белое 20 сентября кружила стая приблизительно из 100 птиц.

Усатая синица *Panurus biarmicus*. Стайка из 4 синиц встречена в тростниках на бол. Жабагы. На оз. Баканжул на протяжении всего периода наблюдений регистрировались стайки из 8–12 особей.

ЗАМЕТКИ К АВИФАУНЕ СТЕПНЫХ РАЙОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В. А. Гашек

Центр «Аркаим», ул. Молодогвардейцев, 57/1, Челябинск, 454021.
E-mail: center_arkaim@mail.ru: Для В. А. Гашек

Наблюдения проводились с 6 июня по 1 августа 2004 г. в Троицком (окрестности пос. Нижняя Санарка: 54°08' с. ш., 61°13' в. д.) и Нагайбакском (окрестности пос. Арси: 53°46' с. ш., 59°54' в. д.) районах Челябинской области. Ниже приводятся сведения по редким видам, видам, которые отмечались на границах ареалов, а также тем, границы ареалов которых требуют уточнения.

Серый гусь *Anser anser*. Немногочисленный гнездящийся вид озер и прудов окрестностей пос. Арси.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. Пара птиц (негнездовая) держалась на оз. Карачура (Нагайбакский р-н) во время двух посещений: 16 и 17 июня.

Лебедь-шипун *Cygnus olor*. На оз. Ачакуль возле пос. Арси в течение нескольких дней наблюдали 5 взрослых птиц без выводков.

Пеганка *Tadorna tadorna*. Немногочисленный гнездящийся вид окрестностей пос. Арси.

Степной лунь *Circus macrourus*. Гнездовая пара обнаружена на оз. Карачура 17 июня.

Перепелятник *Accipiter nisus*. Немногочисленная гнездящаяся птица в районах наблюдений.

Могильник *Aquila heliaca*. Парящая птица наблюдалась 18 июня над Шелудивыми горами (53°51' с. ш., 59°57' в. д.) в окрестностях пос. Сухтелинский (Верхнеуральский р-н).

Тетерев *Lyrurus tetrix*. В окрестностях пос. Н. Санарка 7 июня отмечены 3 самца, перелетевшие с залежи в лесополосу.

Серый журавль *Grus grus*. Обычный, очевидно, гнездящийся вид окрестностей пос. Арси. В окрестностях пос. Н. Санарка только однажды наблюдалась пролетавшая пара.

Камышница *Gallinula chloropus*. Пара с выводком (удалось рассмотреть одного птенца) наблюдалась 27 июня на р. Санарка.

Степная тиркушка *Glareola nordmanni*. Пара птиц, проявлявшая беспокойство, наблюдалась на протяжении нескольких дней на одном и том же участке пашни со свежими всходами зерновых в 2 км от пруда в окрестностях пос. Арси.

Черноголовый хохотун *Larus ichthyaetus*. Одиночная птица наблюдалась 16 июня над оз. Ачакуль (возле пос. Арси).

Обыкновенная горлица *Streptopelia turtur*. В районах исследований встречена единственная птица: токующий на опушке смешанного леса в окрестностях пос. Арси самец наблюдался в течение нескольких дней в одном и том же месте.

Большая горлица *S. orientalis*. Обычный гнездящийся вид в обследованных районах.

Кольчатая горлица *S. decaocto*. Одна птица отмечена 30 июня на железнодорожном вокзале в г. Троицке.

Желна *Dryocopus martius*. Во дворе одного из домов пос. Н. Санарка 7 июня наблюдалась одиночная птица.

Белоспинный дятел *Dendrocopos leucotos*. Взрослые птицы неоднократно наблюдались в приречных уремах на р. Санарка.

Малый дятел *D. minor*. В окрестностях пос. Арси, в небольшом березовом колке, 19 июня найдено жилое гнездо. В окрестностях пос. Н. Санарка, в уремах, неоднократно отмечались одиночные птицы и пары.

Вертишейка *Jynx torquilla*. Дважды отмечались одиночные птицы в окрестностях пос. Н. Санарка: на прибрежных деревьях у р. Санарка и в полезащитной лесополосе (птица вылетела из сорочьего гнезда).

Желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola*. Немногочисленный, очевидно, гнездящийся вид в районах исследований.

Желтоспинная трясогузка *M. lutea*. Беспокоящаяся птица с кормом встречена 17 июня на заболоченном берегу пруда в окрестностях пос. Арси.

Широкохвостка *Cettia cetti*. Обычный гнездящийся вид урем по р. Санарка.

Ремез *Remiz pendulinus*. Беспокоящаяся пара наблюдалась 10 июня в уреме на р. Санарка.

Коноплянка *Acanthis cannabina*. Поющие самцы и парочки неоднократно отмечались на окраинах поселков в районах исследования.

Овсянка-ремез *Emberiza rustica*. Одиночный самец встречен 28 июня в полезащитной лесополосе в окрестностях пос. Н. Санарка.

К ОРНИТОФАУНЕ ГЫДАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА И ПОЛУОСТРОВА ЯВАЙ

П. М. Глазов[1], А. Е. Дмитриев[2]

Институт Географии РАН, Старомонетный пер., 29, Москва, 109017.
[1] E-mail: glazpech@mtu-net.ru
[2] E-mail: abrisd@textbook.ru

В данной статье представлены материалы полевых исследований Гыданской тундры в 2002 г. В течение экспедиции проводили маршрут-

ные, лодочные и аэровизуальные учеты птиц в различных типах местообитаний Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Собирали коллекционный материал по птицам. Производили сбор опросных данных по встречам животных. Работы выполнены в рамках проекта «Кадастр животного мира Тазовского р-на ЯНАО» Научного центра «Охрана биоразнообразия» РАЕН.

За период работ с 18 июня по 17 августа (общее время), были проведены наблюдения и учеты, в результате которых было обработано 9 основных точек, вокруг которых и закладывались маршрутные учеты птиц. Учеты производили и обрабатывали по методике Е. С. Равкина и Н. Г. Челинцева (1990). Пройдено около 400 км учетов.

Точка № 1 (70°45' с. ш., 76°58' в. д.) — на острове в развилке Восточного и Западного Юрибея — с 28 июня по 1 июля.

Точка № 2 (70°55' с. ш., 77°01' в. д.) — в 41,5 км ниже по течению восточного Юрибея, в районе высоты 26 м — с 3 по 8 июля.

Точка № 3 (71°02' с. ш., 76°57' в. д.) — окрестности фактории Юрибей — 11 июля.

Точка № 4 (71°08' с. ш., 77°00' в. д.) — остров Гусиный в устье р. Юрибей, разбивающий русло на два рукава — 10 июля.

Точка № 5 (71°08' с. ш. 79°15' в. д.) — оз. Ямбуто, западный берег, 7 км севернее истока р. Ямбутояхи — 17–18 июля.

Точка № 6 (71°09' с. ш., 79°33' в. д.) — оз. Ямбуто, восточный берег в 19 км по берегу севернее истока р. Ямбутояхи, где плакор подходит к берегу озера — 20–21 июля.

Точка № 7 (71°02' с. ш., 79°18' в. д.) — фактория Развилка, место слияния рек Гыды, Нейяхи и Ямбутояхи — с 22 по 24 августа.

Точка № 8 (71°23' с. ш., 78°48' в. д.) — фактория Периптавето на западном склоне холма, в 500 м севернее от места, где р. Есяяха вытекает из оз. Периптавето (северо–восточная часть) — с 27 по 29 июля.

Точка № 9 (72°00' с. ш. 75°22' в. д.) — фактория Монгаталянга на северном берегу в 1 км от устья р. Монгаталянгъяха (п-ов Явай) — с 1 по 9 августа.

Весна 2002 г. на Гыдане была поздней и холодной. К моменту нашего приезда в Гыду лед два дня как отошел от берега и при северном ветре температура падала до 3–4 °С. Хотя места работы на полуострове были сильно разбросаны, погодные условия были крайне неблагоприятны везде. Несколько часов солнечной погоды неизбежно сменялись моросью или ливнем. Безветренная погода наблюдалась всего два дня, без дождей во время маршрута — шесть дней (за два месяца!). Временами дождь не прекращался по двое суток, а сила ветра достигала критических отметок, на которые не рассчитана палатка. Чис-

ленность леммингов была очень низкой, хотя встречались отдельные особи по долинам рек, заросшим ивняком, и приозерным котловинам.

* * *

Краснозобая гагара *Gavia stellata*. Гнездящийся вид всей территории. Обычна, но не многочисленна. Нами отмечалось гнездование в районе о. Гусиный (устьевая часть р. Юрибей) и фактории Монгаталянга, а также встречалась на оз. Периптавето. На о. Гусиный численность вида доходила до 3,86 ос/кмI (сред. 1,77). В целом менее распространена, чем следующий вид. Выводки отмечены 3 августа у фактории Монгаталянга.

Чернозобая гагара *G. arctica*. Гнездится на всей территории, многочисленна. Нами отмечалась на всех точках работы, гнездование установлено в среднем и нижнем течении р. Юрибей и в окрестностях фактории Монгаталянга.

Белоклювая гагара *G. adamsii*. Очень редкий пролетный вид в основном северных частей района (Чувашов, 1997). По сообщениям оленеводов западной части Гыданского п-ова, редкие пары этого вида гнездятся в бассейне р. Юрибей, где иногда попадаются в рыболовные сети на рыбных озерах (Калякин и др., 2002). Мы получали информацию о встречах этого вида в районе фактории Развилка. Нами не встречена.

Белощекая казарка *Branta leucopsis*. Имеются опросные данные о весенних залетах вида в средней части п-ова Явай, пролете по берегам Юрацкой губы (Линьков, 1983), что косвенно подтверждается существенным весенним пролетом этого вида через Пуровский р-н (Кривенко и др., 1999). Однако прекрасно знающий район Г. И. Чувашов (1997, 2002) этот вид даже не упоминает.

Черная казарка *B. bernicla*. Обычный гнездящийся вид арктической части района, особенно островов (Олений). В 2002 г. нашим отрядом не встречена. На фактории Манготалянга, по свидетельству местных жителей, весной встречаются на пролете.

Краснозобая казарка *Rufibrenta ruficollis*. Обычный гнездящийся вид района. Нашим отрядом отмечена на гнездовании в 2002 г., в окрестностях озера Ямбуто и окрестностях озера Периптавето, а также встречена в низовьях Юрибея. Гнездование этого вида носило классический характер, колонии из 4–6 пар располагались на обрывистых берегах вблизи гнезд хищников (сапсан, зимняк). Первые выводки были встречены 18 июля на оз. Ямбуто.

Белолобый гусь *Anser albifrons*. Обычный гнездящийся вид тундр района. Нами на всем протяжении работ отмечались стаи по 3–50 осо-

бей. По-видимому, большая часть не загнездилась, что связано с весенними похолоданиями. По словам местных жителей, когда прилетела основная масса гусей, произошло резкое похолодание с выпадением снега, гуси все откочевали южнее и с потеплением прошли на север и северо–восток, не загнездившись. Гнездование доподлинно установлено для окрестностей фактории Монгаталянга. При перелете от мыса Мамонта к фактории Монгаталянга на акватории Гыданской губы 1 августа мы отметили 11 скоплений линяющих групп от 20 до 400 особей с небольшими выводками.

Гуменник *A. fabalis*. Гнездящийся вид всей территории района, но на самом севере и юге района редок. Перелетающие и пролетные стаи, одиночные особи встречались повсеместно. Неблагоприятные погодные условия также сказались на размножении этого вида. В среднем течении р. Юрибей 30 июня нашли гнездо с 5 яйцами на начальной стадии насиживания. У фактории Монгаталянга в первых числах августа встречены группы линяющих и молодых. На оз. Периптавето отмечалось большое скопление линяющих (около 180 особей). По опросным данным, на оз. Ямбуто, преимущественно в северной части, в предыдущие годы также отмечались крупные скопления линных гусей (до 1000 особей).

Малый лебедь *Cygnus bewickii*. Обычный гнездящийся вид тундр района. Нами отмечался в среднем течении р. Юрибей (10 кормящихся на реке особей), в пос. Гыда и на озерах Ямбуто и Периптавето. По словам местных жителей, в последнее время наблюдается тенденция роста численности и продвижения вида на север.

Чирок-свистунок *Anas crecca*. Немногочисленная утка, заселяет весь район, кроме арктических тундр. Северная граница недостаточно изучена. Оленеводы утверждают, что на п-ове Явай в незначительном количестве чирки гнездятся на 20–30 км южнее 72° с. ш., а Г. И. Чувашов (2002) считает свистунка гнездящимся видом Гыданского заповедника. Нашей группой отмечались только для среднего и нижнего течения р. Юрибей.

Шилохвость *A. acuta*. Обычная речная утка района среднего и нижнего течения р. Юрибей. В арктической тундре редка на гнездовании, выводки отмечены под 72° с. ш. (Калякин и др., 2002). Нами отмечалась на всех точках, кроме фактории Монгаталянга.

Морская чернеть *Aythya marila*. Обычный гнездящийся вид района. В кустарниковых и типичных тундрах обычна, кроме окрестностей оз. Периптавето. Почти не гнездится в арктических тундрах, не встречена ни в 2001 г. (Калякин и др., 2002), ни нашим отрядом на п-ове Явай в 2002 г.

Морянка *Clangula hyemalis*. Самая многочисленная гнездящаяся утка района. Встречалась повсеместно. Гнездование отмечалось на р. Юрибей в среднем и нижнем течении и у фактории Монгаталянга. На Гыданской губе 1 и 6 августа отмечались крупные скопления до 10000 линяющих птиц в группах по 400–1500 особей, в то время как на Обской губе под 72° с. ш. в августе 2001 г. были линные стайки по 5–20 особей (Калякин и др., 2002).

Обыкновенная гага *Somateria mollissima*. Г. И. Чувашов (2002) отмечал этот вид на п-ове Мамонта. Есть вероятность ее нахождения в тампах у фактории Монгаталянга. Нами не встречена.

Гага-гребенушка *S. spectabilis*. Обычная гнездящаяся птица побережий, предпочитает маршевые ландшафты. В море у берегов встречаются неразмножающиеся линяющие особи. Нами гнездящиеся птицы и выводки встречены в нижнем течении р. Юрибей (11 июля гнездо с 8 яйцами) и в тампах у фактории Монгаталянга (4 августа выводки по 5–6 птенцов).

Синьга *Melanitta nigra*. Периодически встречается на кочевках на северо-восточном Гыдане (Линьков, 1984). Нами отмечена одна особь в устье р. М. Воркута (п-ов Явай) в начале августа.

Длинноносый крохаль *Mergus serrator*. Немногочисленная утка рек обследованного района, отмечалась в нижнем течении р. Юрибей. Регулярно встречается на кочевках и линьке в типичных и арктических тундрах (Наумов, 1931; Линьков, 1984), есть отдельные случаи гнездования (Калякин, 2002).

Зимняк *Buteo lagopus*. Многочисленный гнездящийся вид. Распространение и численность вида сильно меняются по годам в зависимости от обилия мышевидных грызунов. Отмечен по всем обследованным точкам, за исключением фактории Монгаталянга. Гнездование наблюдалось в нижнем течении р. Юрибей и на озерах Ямбуто и Периптавето, где плотность достигала 1 пары на км^2. Гнезда с кладками находили до 11 июля (устье р. Юрибей).

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. В 2002 г. нашим отрядом встречен лишь в среднем течении р. Юрибей. Вообще же залеты орлана на север полуострова — довольно обычное явление (Чувашов, 2002; Калякин 2002).

Сапсан *Falco peregrinus*. Гнездящийся по всему району вид, по Г. И. Чувашову (1997) — всюду обычен, то же утверждали и опрошенные нами местные жители. Нами встречался на гнездовании в нижнем течении р. Юрибей (2 июля — 4 яйца), в окрестностях оз. Ямбуто (18 июля — 3 птенца, 1 яйцо). Пролетающая особь отмечена на р. Монгаталянгъяха.

Дербник *F. columbarius*. Редкий для северной части Гыдана вид, нами отмечался для среднего течения р. Юрибей.

Белая куропатка *Lagopus lagopus*. Обычная гнездящаяся птица всей территории района, за исключением арктических тундр, где ее по численности заменяет тундряная куропатка. Численность вида сильно колеблется по годам. Нами отмечалось гнездование белых куропаток везде, кроме р. Монгаталянгъяха.

Тундряная куропатка *L. mutus*. Обычная гнездящаяся птица арктических тундр Гыдана. Отмечена в нижнем течении р. Юрибей, в окрестностях озер Ямбуто и Периптавето, а также на р. Монгаталянга. Гнездование установлено на озерах и на р. Монгаталянгъяха. Зимует в южных тундрах и в северной лесотундре района.

Тулес *Pluvialis squatarola*. Обычный всюду в арктических, типичных и кустарниковых тундрах вид. Гнездование отмечалось на всех точках работы. Встречаемость вида колебалась от 1,59 до 10,71 особей/км^2. Предпочитает возвышенные пушицево-моховые кочкарные тундры с кустарником, либо дренированные лишайниково–моховые тундры.

Бурокрылая ржанка *P. fulva*. Заселяет типичные и арктические тундры Гыдана. Многочисленный вид. Нами встречалась повсюду, кроме р. Монгаталянгъяха. Установлено гнездование в среднем течении р. Юрибей и на озерах Ямбуто и Периптавето, а также в окрестностях пос. Гыда. Тоже предпочитает гнездится на возвышенных дренированных участках лишайниково-моховых и пушицево-моховых кочкарных тундр.

Золотистая ржанка *P. apricaria*. Птица лесотундры и южной тундры района, местами проникает и севернее. На Гыдане встречена нами в среднем течении р. Юрибей и на озерах Ямбуто и Периптавето. Немногочисленный вид. Тяжело поддается полевому определению и в связи с этим часто может ошибочно приниматься за предыдущий вид.

Галстучник *Charadrius hiaticula*. Обычная гнездящаяся птица рек Явая и крупных озер Гыдана. По-видимому, в центральных частях Гыданского полуострова более редок. Регистрировался нами в окрестностях пос. Гыда, окрестностях оз. Ямбуто и на п-ове Явай. Встречался преимущественно по песчано-глинистым берегам рек, озер, морских пляжей, раздувам на возвышенных участках тундры.

Камнешарка *Arenaria interpres*. Немногочисленный гнездящийся вид арктических тундр Гыданского п-ова (Жуков, 1998; Чувашов, 2002). Нами в устьевой части р. Монгаталянгъяха регистрировалась одна беспокоящаяся особь.

Фифи *Tringa glareola*. Редкий гнездящийся вид. Единственный раз зарегистрирована с гнездовым поведением в окрестностях пос. Гыда.

Щеголь *T. erythropus*. Редкий кочующий вид (Калякин и др., 2002; Черничко и др., 1994). В первой декаде августа в устье р. Монгаталянгъяха на отмелях наблюдали стайки по 12–15 особей.

Плосконосый плавунчик *Phalaropus fulicarius*. Нам в 2002 г. не встречался, но по Г. И. Чувашову (1997, 2002) — гнездящаяся птица арктических тундр Гыдана, встречался на пролете на западе Явая (Калякин и др., 2002).

Круглоносый плавунчик *Ph. lobatus*. Многочисленный гнездящийся вид тундр Гыдана. Отмечен на всех точках. Гнездование наблюдалось в среднем и нижнем течении р. Юрибей на комплексных болотах, по берегам небольших озерков. Встречаемость по долине р. Юрибей составила в среднем 1,9 особи/км, в районе «больших» озер и на п-ове Явай — 1,5 особи/км.

Турухтан *Philomachus pugnax*. Один из самых многочисленных куликов, заселяющих весь район, повсюду многочислен или обычен. В 2002 г. размножение отмечено на всех точках. Тока турухтанов также наблюдались повсеместно и даже непосредственно в пос. Тазовский.

Кулик-воробей *Calidris minuta*. Многочисленный кулик всех тундр района, численность растет с юга на север. На п-ове Явай самый многочисленный гнездящийся кулик (Калякин и др., 2002). Нами гнездование отмечалось повсеместно. Встречаемость по долине р. Юрибей составила 1,6 особи/км, в районе «больших» озер — 1,2 особи/км, а на п-ове Явай — 2,5 особи/км.

Белохвостый песочник *C. temminckii*. Гнездится и довольно обычен повсюду в тундре Гыдана на север до Явая, где в 2001 г. был обычен по песчаным грядам высокой поймы южного берега Нгарка-Тетнведа-яхи. Нами в 2002 г. гнездование отмечено в среднем и нижнем течении р. Юрибей, в окрестностях оз. Периптавето и р. Монгаталянгъяха.

Краснозобик *C. ferruginea*. Немногочисленный гнездящийся вид арктических и части типичных тундр Гыдана. Гнездование отмечено в среднем течении р. Юрибей и в окрестностях оз. Периптавето.

Чернозобик *C. alpina*. Обычная, а местами многочисленная птица, заселяет все тундры района работ. Гнездование отмечалось во всех точках исследований. В среднем по всем точкам его плотность составила 6 особей/км^2.

Дутыш *C. melanotos*. Встречен в среднем течении Юрибея, в окрестностях оз. Ямбуто, на п-ове Явай. Вероятно, гнездится.

Гаршнеп *Lymnocryptes minimus*. Широко, но спорадично заселяет

большую часть территории юга района работ, низовья Юрибея и окрестностей оз. Ямбуто. Всюду в районе редок. Наибольшая плотность отмечалась в среднем течении р. Юрибей. Распространение вида требует серьезных уточнений.

Бекас *Gallinago gallinago*. Встречается в южной и типичной тундрах района. На Гыдане сильно уступает в численности азиатскому бекасу. Несколько токовавших самцов наблюдались в долине р. Юрибей.

Азиатский бекас *G. stenura*. Встречается в южной и типичной тундрах района. В южной полосе тундр многочислен. Нами регистрировались токующие особи, среди которых, вероятно, могли попадаться и *Gallinago gallinago*. Отмечены повсеместно, кроме оз. Периптавето и п-ова Явай. В окрестностях фактории Юрибей обнаружено гнездовое поведение этого вида.

Малый веретенник *Limosa lapponica*. Редкий гнездящийся вид. Пары, предположительно с выводками, держались 20 июля в окрестностях оз. Ямбуто и 22 июля — в окрестностях фактории Развилка.

Средний поморник *Stercorarius pomarinus*. Гнездящаяся птица Гыдана. Численность и распределение на гнездовании очень меняются в связи с численностью грызунов. В 2001 г. на Явае в условиях депрессии численности леммингов этот вид в августе отсутствовал. В 2002 г. нашим отрядом встречен на всех обследованных точках и маршрутах с довольно большой плотностью. При этом не было найдено ни одного гнезда.

Короткохвостый поморник *S. parasiticus*. Наиболее многочисленный в северной части тундр Гыдана вид поморников. Не встречен в окрестностях оз. Периптавето. Гнездование не отмечено.

Длиннохвостый поморник *S. longicaudus*. Обычный гнездящийся вид, встречен по всему району. Гнезда, несмотря на длительные неоднократные поиски, обнаружены не были.

Халей *Larus heuglini*. Многочисленная гнездящаяся птица всего района. Жилые гнезда обнаружены в нижнем течении р. Юрибей и в окрестностях фактории Монгаталянга. Встречались повсеместно.

Бургомистр *L. hyperboreus*. Обычная гнездящаяся птица п-овов Явай и Мамонта и прилежащих островов. По данным В.С. Жукова, редок у Тадебяяхи и Антипаюты. В 2002 г. нигде кроме Явая (фактория Монгаталянга) не встречен.

Моевка *Rissa tridactyla*. Стая из 38 явно кочующих птиц отмечена 5 августа 2002 г. у фактории Монгаталянга.

Полярная крачка *Sterna paradisaea*. Многочисленная гнездящаяся птица всего района, встречена на всех точках и маршрутах, привязана к долинам рек, озер и морских побережий.

Белая сова *Nyctea scandiaca*. В 2002 г. белая сова была немногочисленна, но широко распространена по тундрам района. Нашим отрядом не найдена только в окрестностях Гыды. Гнездование отмечено для окрестностей озер Ямбуто и Периптавето, а также у фактории Монгаталянга.

Болотная сова *Asio flammeus*. Обычная сова юга Гыдана. Отмечена по среднему и нижнему течению р. Юрибей.

Ласточка-береговушка *Riparia riparia*. Отмечалась только для пос. Гыда. Вероятно, гнездится.

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris*. Встречен нашим отрядом на всех точках и маршрутах в качестве обычной гнездящейся птицы сухих участков арктических и типичных тундр.

Краснозобый конек *Anthus cervinus*. Самый многочисленный гнездящийся вид всех тундр района. Гнезда не были найдены только в окрестностях фактории Монгаталянга, в связи с поздним пребыванием на данной точке. Средняя плотность по долине р. Юрибей составила 26 ос./км^2, в районе «больших» озер — 44 особей/км^2, на п-ове Явай — 42,8 ос./км^2.

Желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola*. Обычный гнездящейся вид южных тундр, обычна в типичных. Нами установлено гнездование для оз. Ямбуто и Периптавето, нижнего течения р. Юрибей и пос. Гыда.

Белая трясогузка *M. alba*. Обычный гнездящийся вид. Заселяет весь район, придерживаясь в основном обрывов рек и озер, а также антропогенных участков. Гнездование установлено для озер Ямбуто и Периптавето, для фактории Монгаталянга, для пос. Гыда.

Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus*. Обычный гнездящийся вид. В тундру проникает до севера подзоны кустарниковых тундр и далее — в пределах распространения более-менее высокой кустарниковой растительности. Не отмечена в 2002 г. только в окрестностях озера Периптавето и на Явае. Всюду обычна, в тундре тяготеет к пойменным местообитаниям.

Пеночка-теньковка *Ph. collybita*. Распространена примерно так же, как и предыдущий вид. Встречена на оз. Периптавето, но отсутствовала в среднем течении р. Юрибей, что можно расценить как недоучет. Численность заметно ниже, чем у веснички.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Заселяет весь район. Наибольшей численности достигает в солюфлюкционном ландшафте п-ова Явай (Калякин и др., 2002). В других местах предпочитает антропогенный ландшафт, обрывы и песчаные раздувы. Нами не встречена только в среднем течении р. Юрибей, что может быть вызвано

недостатком соответствующих местообитаний. Гнездование установлено для окрестностей озер Ямбуто и Периптавето.

Варакушка *Luscinia svecica*. Многочисленный гнездящийся вид, заселяющий большую часть района. В 2002 г. не отмечена лишь у фактории Монгаталянга, факт гнездования не установлен только для нижнего течения р. Юрибей. Предпочитает гнездиться в местообитаниях с хорошо развитым высоким кустарником, в основном по долинам рек и озер, в кустарниковых зарослях на плакорах и по обрывистым берегам.

Дрозд-рябинник *Turdus pilaris*. Обычный, спорадически гнездящийся вид района, встречен в окрестностях пос. Гыда, фактории Развилка и озер Ямбуто и Периптавето. Гнездование установлено для озер Ямбуто и Периптавето. Гнездится в пойменных зарослях ивы, по обрывистым берегам озер и рек. Излюбленными местами являются малопосещаемые постройки человека.

Дрозд-белобровик *T. iliacus*. Редкий гнездящийся вид района, с численностью ниже, чем у рябинника. Нашей группой был встречен в нижнем течении р. Юрибей (на точке № 2), в пос. Гыда, а также на оз. Ямбуто. Единственное гнездо найдено на западном берегу озера.

Домовый воробей *Passer domesticus*. Довольно редкий гнездящийся вид. Отмечен в пос. Гыда и одна особь — в пос. Тадебяяха.

Тундряная чечетка *Acanthis hornemanni*. Обычная гнездящаяся птица района, встречается почти повсюду в тундре и всюду оценивается как обычная. Заселяет практически любые местообитания по долинам рек, озер и балкам с кустарниками. В 2002 г. в июле нередко наблюдались стайки до 20 особей, по-видимому, значительная часть птиц утратила гнезда или не размножалась в данном году. Не встречена только в пос. Гыда. Обнаружены гнезда в среднем течении р. Юрибей и на озерах Ямбуто и Периптавето. Стайки чечеток часто встречались на снежниках, где кормились семенами ивы.

Овсянка-крошка *Emberiza pusilla*. Обычный гнездящийся вид. Встречена всюду, кроме Явая. Гнезда и выводки найдены в окрестностях озер Ямбуто и Периптавето, в нижнем течении р. Юрибей. Заселяет практически любые кустарниковые местообитания.

Подорожник *Calcarius lapponicus*. Одна из самых многочисленных птиц тундры, гнездится от ее южной границы до островов включительно (Чувашов, 2002). В некоторых местообитаниях по численности превышает численность краснозобого конька, хотя в среднем его численность ниже. По долине р. Юрибей численность составила 25,8 ос./км^2, в районе «больших» озер — 25,4, на п-ове Явай значительно меньше — 6,2 ос./км^2. Гнездование отмечено для всех точек обследования, кроме района на п-ове Явай.

Пуночка *Plectrophenax nivalis*. Обычная птица приморских тундр. Тяготеет к солюфлюкционным и антропогенным ландшафтам. Нами встречалась в пос. Гыда и стайки с выводками — по Явайской тундре, где местами были многочисленными. Найдены гнезда на факториях Юрибей и Монгаталянга.

* * *

В заключение необходимо отметить возросшее в последние годы поголовье домашнего оленя, которое, по разным оценкам, составляет порядка 500 тыс. голов на Гыданские тундры, тогда как тундры Гыдана в среднем рассчитаны на поголовье в 100 тыс. голов (довольно грубые оценки). Имеет место сильный перевыпас. Нами отмечены процессы деградации лишайниковых тундр, сильная потравленность пастбищ и начало эрозионных процессов.

В связи с большим ростом численности домашнего оленя, увеличивается численность бурого медведя и волка, которые далеко заходят на север. У оленя в последние годы увеличивается заболеваемость и усиливается падеж.

По нашему мнению, необходимо проведение расчетов и регулирование численности домашнего оленя.

В заключение мы выражаем огромную благодарность за помощь при проведении работ: Г. И. Чувашову, С. М. Ширшову, А. З. Санькову, А. А. Горчаковскому, М. М. Докаеву, И. П. Яру, администрации пос. Гыда, особую благодарность — В. Н. Савченко и Б. М. Докаеву, а также пилотам вертолетов МИ–8 авиакомпании «Ямал» и «Тюменьавиатранс» и всем, кто помогал в проведении экспедиции.

ЛИТЕРАТУРА

Жуков В. С. К фауне и распространению птиц на северо-востоке Западной Сибири // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1998. С. 67–77.

Калякин В. Н., Виноградов В. Г., Покровская И. В. Авифаунистические результаты биогеографического обследования южной части полуострова Явай (Гыданский заповедник) // Там же. 2002. С. 132–143.

Кривенко В. Г., Преображенская И. Б., Куприянов А. Г., Авданин В. О., Куприянова И. Ф., Беседин М. А., Быков А. Н. Весенний пролет водоплавающих в бассейне реки Пур (Ямало–Ненецкий автономный округ) // Казарка № 5. М., 1999. С. 297–312.

Линьков А. Б. Некоторые особенности экологии и распределения гусей и казарок на северо–востоке Гыданского полуострова // Экология и рациональное использование охотничьих птиц в РСФСР. Сб. науч. тр. ЦНИЛ Главохоты РСФСР. М, 1983. С. 62–70.

Линьков А. Б. К распространению и экологии уток Северо-востока Гыдана // Современное состояние ресурсов водоплавающих птиц: Тез. всесоюз. семинара 20–23 октября 1984 г., М, 1984. С. 151–152.

Наумов С. П. Млекопитающие и птицы Гыданского полуострова // Тр. Полярной комиссии АН СССР. 1931. Вып. 4. С. 5–106.

Равкин Е. С., Челинцев Н. Г. Методические рекомендации по комплексному маршрутному учету птиц. М., 1990. 33 с.

Черничко И. И., Сыроечковский. Е. Е. мл., Черничко Р. Н., Волох А. М., Андрющенко Ю. А. Материалы по фауне и населению птиц северо–восточного Гыдана // Арктические тундры Таймыра и островов Карского моря. Т. 1. М., 1994. С.223–268.

Чувашов Г. И. Гыданско-Тазовская природная зона. СПб., 1997. 179 с.

Чувашов Г. И. Заповедник «Гыданский» и Гыданский полуостров. СПб., Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2002. 264 с.

ПТИЦЫ ВОДОЕМОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ПРЕДГОРИЙ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ (НЕВОРОБЬИНЫЕ)

Н. М. Головина

Ул. Металлистов, д. 17, кв. 28, г. Кемерово, 650052

Наблюдения проводили в летний период 1985–1987 и 2002 гг. в Тисульском районе Кемеровской области (55°35'– 55°45' с. ш., 88–90° в. д.).

Район работ находился в полого–увалистой лесостепи с березово-осиновым лесом, пашней и лугами, на границе с горно-лесным поясом Кузнецкого Алатау. Системы рек Дудет и Урюп (притоки р. Чулым) образуют сырые и заболоченные пространства. После снеготаяния образуется много мелких водоемов (полоев), не пересыхающих до конца июня. Имеются искусственно созданные пруды для нужд сельского хозяйства. Много материковых озер карстового или смешанного происхождения с площадью 1,0–18,0 км^2. Наиболее известные из них: Пустое, Линево, Змеиное, Третьяково, Малый Берчикуль и Большой Берчикуль. Для озер характерны колебания уровня с циклом около 40 лет. Они могут полностью пересыхать, а затем восстанавливаться (Зыков, 1964). Мы застали озера в стадии падения уровня и зарастания берегов.

Б. Берчикуль — самый большой естественный водоемом области. Площадь зеркала — 18,0 км^2, глубина — 1,8–7,0 м; дно илистое. Озеро окружено невысокими сопками, покрытыми лесом. Только его северо–западный берег, где расположен одноименный поселок, остается открытым, остальные представляют собой труднопроходимую осоко-

во-кустарниковую топь, которая в юго-восточной части, сливаясь с поймой р. Дудет, образует обширное заболоченное пространство. Большинство озер рыбные, мелководные, заросшие тростником и рогозом. Все это создает благоприятные условия для обитания многих видов птиц.

* * *

Чомга *Podiceps cristatus*. Обычный гнездящийся вид. Две пары отмечены на оз. Б. Берчикуль 11 июня 1985 г., 3 пары — на оз. Третьяково — 7 июля 1985 г. Две пары гнездились на пруду у с. Тамбар в июне 1987 г.

Красношейная поганка *P. auritus*. Обычна на подходящих водоемах. Предпочитает сообщества чайковых. На оз. Третьяково в 1987 г. 3 гнезда были построены по краю зарослей рядом с гнездами речной крачки.

Черношейная поганка *P. nigricollis*. Одиночных птиц наблюдали на озерах Третьяково и Линево в июле 1985 г.

Большая выпь *Botaurus stellaris*. Крики слышали на оз. Согласие 7 июля 1985 г. и на заболоченном берегу р. Дудет — до конца июня 1987 г.

Серая цапля *Ardea cinerea*. Одиночных цапель наблюдали на пруду у с. Тамбар 14 и 23 июня 1987 г.

Серый гусь *Anser anser*. Возможно, гнездится. Одиночную особь видели на оз. Б. Берчикуль 4 июля 2002 г.

Пискулька *A. erythropus*. Пролетный вид. Стаю из 13 птиц наблюдали на полойном водоеме у с. Большепичугино 7 июня 1987 г.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. Четырех перекликающихся лебедей, летящих на север на большой высоте, наблюдали у с. Б. Барандат 13 июня 1985 г.

Кряква *Anas platyrhynchos*. Самая многочисленная из уток. Встречается на всех водоемах предгорий. Самки с 4 и 7 пуховичками отмечены на оз. Б. Берчикуль 11 июня 1985 г. и на пруду у с. Тамбар 9 июня 1987 г.

Шилохвость *A. acuta*. Многочисленна. Гнездо с 6 яйцами, 3 из которых были проклюнуты, найдено на небольшом водоеме у с. Большепичугино 7 июня 1987 г. Подросших птенцов видели на оз. Третьяково 7 июля 1985 г.

Свиязь *A. penelope*. Самцов в брачном наряде в стаях с другими утками наблюдали на водоемах у п. Тисуль 19 мая 1985 г. Самку с двухнедельными птенцами наблюдали на оз. М. Берчикуль 4 июля 2002 г.

Серая утка *A. strepera.* Немногочисленна на озерах. Пары наблю-

дали у п. Тисуль 19 мая 1985 г. Самку с 6 почти оперившимися молодыми видели у с. Серебряково 8 июля 1987 г.

Широконоска *A. clypeata*. Обычна. Самка с выводком из 5 пуховичков встречена на оз. Линево 7 июля 1985 г. и из 4 почти оперившихся — 4 июля 2002 г. на М. Берчикуле.

Чирок-свистунок *A. crecca*. Встречен на водоемах всех типов. Гнездо под кустом ивы у небольшого водоема найдено у п. Тисуль 19 мая 1985 г., в кладке было насиженных 5 яиц.

Чирок-трескунок *A. querquedula*. Обычен, как и свистунок. Самка с 6 пуховичками встречена у с. Большепичугино 7 июня 1987 г.

Красноголовая чернеть *Aythya ferina*. Группы из 4 и 6 особей встречены на водоемах у п. Тисуль 19 мая 1985 г.

Хохлатая чернеть *A. fuligula*. Немногочисленна. Самку с выводком из 6 молодых наблюдали 10 августа 2002 г. на М. Берчикуле.

Гоголь *Bucephala clangula*. Пары с брачным поведением наблюдали на Б. Берчикуле 19 мая 1985 г.

Луток *Mergus albellus*. Трех самцов наблюдали на пруду у с. Тамбар 28 июня 1987 г.

Большой крохаль *M. merganser*. Шесть самцов видели на р. Урюп ниже п. Ивановка 26 июня 1987 г. Одиночный самец отмечен на пруду у с. Тамбар 17 июня 1987 г. В северной лесостепи этот вид гнездится. Самку с 4 уже подросшими птенцами видели на лесном озере у с. Б. Антибес (Мариинский р-н) 24 июля 1991 г.

Черный коршун *Milvus migrans*. Гнездится в лесах предгорий. Над водоемами обычно кружили 2–6 птиц. Летных молодых над оз. Б. Берчикуль наблюдали 30 июля 1986 г.

Болотный лунь *Circus aeruginosus*. Обычен для района, но не многочислен. Всего за период работ учтено 8 пар. Летных молодых видели на оз. Третьяково 2 августа 1985 г.

Пустельга *Falco tinnunculus.* Обычна на полях у водоемов. Кладка из 4 насиженных яиц найдена в гнезде сороки у с. Большепичугино 8 июня 1987 г. Гнездо было построено на черемухе в колке среди пашни на высоте 2,5 м.

Перепел *Coturnix coturnix*. Голоса перепелов на лугах у с. Тамбар слышали до конца июня 1987 г. Выводок из 6 поршков поднят 8 июля 1987 г. на лугу у с. Большепичугино.

Серый журавль *Grus grus.* Перекличку журавлей в заболоченной пойме р. Дудет слышали 11 июня 1987 г. Двух птиц, пролетающих над полем у с. Тамбар, наблюдали 20 июня 1987 г.

Коростель *Crex crex*. Голос слышали до конца июня 1987 г. на заболоченном берегу р. Дудет и на оз. Согласие 7 июля 1985 г.

Пастушок *Rallus aquaticus*. Найдены останки (голова и крыло) у заболоченного берега р. Дудет 16 июня 1987 г.

Погоныш *Porzana porzana*. Крики погоныша слышали до конца июня 1987 г. на заболоченном берегу р. Дудет и на оз. Линево 12 июня 1985 г.

Камышница *Gallinula chloropus*. Возможно, гнездится. Кормящихся птиц видели на оз. Линево 6 июля 1985 г. и на оз. Третьяково — 7 июля 1985 г. Молодая особь добыта у с. Шестаково (Чебулинский р-н) 26 августа 1989 г.

Лысуха *Fulica atra*. Встречается на многих водоемах. Группу лысух с молодыми — 11 птиц — наблюдали на оз. Третьяково 2 августа 1985 г.

Тулес *Pluvialis squatarola*. Небольшие группы и одиночных птиц, высоко летящих, наблюдали 19 мая 1985 г. и 30 июля 1986 г.

Золотистая ржанка *P. apricaria* или **бурокрылая ржанка** *P. fulva*. Весной небольшие стаи ржанок, летящих высоко, видели 19 мая 1985 г. Кочующих птиц с остатками летнего наряда встретили 10 августа 2002 г. на выпасе у п. Тисуль.

Хрустан *Eudromias morinellus*. Двух птиц в летнем наряде видели в стае с песочниками на выпасе у с. Тисуль 10 августа 2002 г.

Малый зуек *Charadrius dubius*. Гнездится по открытым участкам песчаного берега р. Дудет и р. Урюп. Здесь 30 июня 1987 г. найдено гнездо с 3 насиженными яйцами; 3 кладки зуйка найдены на сплавинах в колонии речной крачки на пруду у с. Тамбар 28 июня 1985 г.

Галстучник *Ch. hiaticula*. Видели трех птиц в стае с мелкими песочниками на пруду 10 и 11 июня 1987 г.

Чибис *Vanellus vanellus*. Обычен. Нередко селится колониями из 3–7 пар. Взрослых с пуховичками в возрасте 5 суток отметили 4 июля 1985 г. на выпасе у п. Тисуль. Свежие кладки из 4 яиц найдены на поле у пруда п. Тамбар и на сыром лугу у с. Большепичугино 7 и 8 июня 1987 г.

Камнешарка *Arenaria interpres*. Одну особь наблюдали вместе с ржанками на выпасе у с. Тисуль 10 августа 2002 г.

Черныш *Tringa ochropus*. Гнездится по берегам рек. Взрослую птицу с 3 птенцами в возрасте около 10 дней видели на берегу протоки р. Урюп у с. Серебряково 10 августа 1987 г. Одиночные черныши часто встречаются по берегам различных водоемов.

Фифи *Tringa glareola*. Обычен, гнездится на заболоченных участках с другими куликами. Гнездо с 4 насиженными яйцами найдено на узкой гриве с кустами ивы среди заболоченной поймы 8 июня 1987 г. Птицы волновались, присаживались на кусты. Здесь еще были гнезда чибиса, травника и мородунки.

Большой улит *T. nebularia*. Два улита кормились на мелководье у оз. Третьяково 2 августа 1985 г. Одиночных птиц видели на пруду у

с. Тамбар 16 и 23 июня 1987 г. Возможно, гнездится: указан А. А. Васильченко (1999) как редкий гнездящийся вид на западных и восточных склонах Кузнецкого Алатау.

Травник *T. totanus*. Несмотря на обилие сырых участков, встречается не часто. Две насиженных кладки по 4 яйца найдены в колонии куликов у с. Большепичугино 8 июня 1987 г. Летных молодых наблюдали на оз. Б. Берчикуль 30 июля 1986 г.

Щеголь *T. erythropus*. Одиночных птиц в черном оперении наблюдали у п. Тисуль 19 мая 1985 г., и на открытом берегу р. Дудет — 6 июня 1987 г.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. Гнездится у открытой воды по берегам рек и крупных озер. Взрослые с 4 пуховичками (до 3 суток) встречены на краю леса у берега р. Урюп 30 июня 1987 г. Летных молодых на Б. Берчикуле видели 30 июля 1986 г.

Мородунка *Xenus cinereus*. Малочисленна. Найдено гнездо на узкой гриве под кустом ивы 8 июня 1987 г. В кладке было 4 насиженных яйца. Взрослые с 3 подлетывающими птенцами встречены на р. Урюп 10 июля 1987 г.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*, **плосконосый плавунчик** *Ph. fulicarius*. Небольшие стаи встречаются на водоемах с середины июля. У с. Серебряково 11 июля 1987 г. кормились 5 круглоносых плавунчиков с остатками летнего наряда. Среди них было 2 плосконосых в ярко-рыжем оперении.

Турухтан *Philomachus pugnax*. Данных в пользу гнездования нет, но самцы и самки в брачном наряде встречались до середины июня на многих водоемах. Перелинявшие турухтаны кочуют небольшими группами, наиболее активно — с начала августа. На оз. Б. Берчикуль 8 турухтанов видели 30 июля 1986 г.; на оз. Третьяково — 2 августа 1985 г. — 12 птиц.

Чернозобик *Calidris alpina*. Пять особей в стае с другими песочниками наблюдали 19 мая 1985 г.

Кулик-воробей *C. minuta*. Из мелких песочников наиболее многочислен. Обычно держится в стаях с другими песочниками на открытых мелких водоемах. На весеннем пролете наиболее часто встречаются в северной лесостепи со второй половины мая до середины июня. Группы до 10 особей, состоявшие в большинстве из куликов-воробьев и белохвостых песочников, наблюдали до середины июля. К концу июля мелких песочников становилось больше — видимо, за счет прилетевших с севера. Перелинявших куликов–воробьев и белохвостых песочников в смешанной стае наблюдали 10 августа 2002 г. на оз. Б. Берчикуль.

Песочник-красношейка *C. ruficollis*. Мелких песочников, похожих на песочника-красношейку, наблюдали в стаях с куликами-воробьями и белохвостыми песочниками дважды: 8 особей 19 мая у п. Тисуль и 3 особи — 7 июня 1987 г. у с. Тамбар. Птицы имели рыжее оперение головы и шеи, чем заметно отличались от других, держались вместе.

Белохвостый песочник *C. temminckii*. Многочислен на пролете. Встречается в смешанных стаях и в те же сроки, что и кулик-воробей.

Бекас *Gallinago gallinago*. Токующих птиц встречали по всей территории: у заросших тростником озер, в сырых низинах, на заболоченном берегу р. Дудет. Токовали по 1–2 самца, больших скоплений не наблюдали. Гнездо бекаса с 4 яйцами найдено 8 июня 1987 г.

Лесной дупель *G. megala*. Токующих птиц наблюдали до конца июня по краю смешанного леса у с. Тамбар. Здесь 12 июня 1987 г. на площади около 1 км^2 было учтено 14 токующих самцов.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*. На краю леса у с. Тамбар «тягу» наблюдали до конца июня. За 2 часа вечерних сумерек учтено 9 июня 11 вальдшнепов, 22 июня — 4.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. Встречены 3 гнездящиеся пары. Две из них обнаружены 7 июня 1987 г. у с. Большепичугино — на поле с многолетними травами и на лугу, расстояние между парами было 2–3 км. Птицы волновались, кружась над головой. Найдено гнездо с 3 насиженными яйцами. На пашне у с. Б. Барандат 2–3 июля наблюдали кормящегося кроншнепа, который вел себя спокойно. Примерно в 1 км от него на поле со всходами ячменя сильно беспокоился другой кроншнеп с птенцом в пуху, хорошо бегающим.

Большой веретенник *Limosa limosa*. Токующих веретенников наблюдали 7 июня 1987 г. у с. Большепичугино и 10 июня 1987 г. — на заболоченном берегу р. Дудет у с. Тамбар.

Западносибирская чайка *Larus heuglini (sp?)*. «Серебристых чаек» с темной мантией наблюдали на р. Урюп у с. Серебряково 30 июня 1987 г. и на оз. Б. Берчикуль 10 августа 2002 г.

Сизая чайка *L. canus*. Гнездится на некоторых озерах и заболоченном берегу р. Дудет, образуя колонии с другими видами. В 1985 г. на оз. Б. Берчикуль гнездились 16 пар, на оз. Третьяково — 4 пары. В 1987 г. на этих озерах гнездились соответственно 20 и 6 пар, на пруду у с. Тамбар — 1 пара.

Озерная чайка *L. ridibundus*. Гнездится не ежегодно. В 1985 г. на оз. Б. Берчикуль гнездилось 12 пар, в 1987 г. на озерах не отмечена.

Малая чайка *L. minutus*. На оз. Б. Берчикуль в 1985 г. учтено 12 пар, в 1987 г. — 23 пары, на оз. Третьяково в те же годы — 7 и 15 пар соответственно.

Черная крачка *Chlidonias niger*. Гнездится как на озерах, в смешанных поселениях, так и группами 1–3 пары на мелких водоемах совместно с куликами. В общей сложности в 1985 и 1987 гг. было учтено 11 гнездящихся пар.

Белокрылая крачка *Ch. leucopterus*. Три пары отмечены на оз. Третьяково в 1985 г., в 1987 г. не наблюдалась.

Речная крачка *Sterna hirundo*. Предпочитает гнездиться в колониях. В летний период 1985 г. было учтено на оз. Б. Берчикуль 20 пар, на оз. Третьяково — 10, на оз. Согласие — 5, на пруду у с. Тамбар — 20 гнездящихся пар. В результате повышения уровня р. Дудет в мае–июне 1987 г. мелкие острова и прибрежная растительность на пруду были затоплены, крачки гнездились на 2 сплавинах площадью 150 м^2, к 28 июня из 20 гнезд только 9 имели полные кладки и птицы приступили к насиживанию. Появление первых птенцов установлено 30 июня 1985 г. на Цимлянском пруду в п. Тисуль, где гнездилось 8 пар.

ЛИТЕРАТУРА

Васильченко А. А. Фауна заповедника «Кузнецкий Алатау». Птицы // Заповедник «Кузнецкий Алатау». Альманах. Вып. 1. Кемерово: Изд. дом «Азия», 1999. С. 145–155.

Зыков И. В. Что происходит с Третьяковым озером? // Известия ВГО. Т.96, вып. 1. М., 1964. С. 57–60.

К ОРНИТОФАУНЕ ПОЛЯРНОГО УРАЛА: БАССЕЙН РЕКИ ЛОНГОТЪЕГАН

М. Г. Головатин[1], С. П. Пасхальный[2]

[1] Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144. E-mail: golovatin@ipae.uran.ru

[2] Экологический стационар Института экологии растений и животных УрО РАН, ул. Зеленая горка, 21, г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого авт. округа, 629400. E-mail: spas@lbt.ru

Желание как можно полнее обследовать Полярный Урал в процессе многолетнего изучения его орнитофауны (Головатин, Пасхальный, 2000, 2001, 2002, 2002а, 2003, 2003а, 2004) побудило нас посетить в сезон 2004 г. верховья р. Лонготъеган. Ранее, в 2002 г., во время работ на севере Полярного Урала, мы лишь пересекли долину Лонготъегана, и этот интересный район остался необследованным. Выехали на вездеходе из пос. Полярный (110 км ж/д Сейда — Лабытнанги) 26 июня 2004 г. В устье р. Немур (левый приток Лонготъегана) была сделана остановка. Затем совершили сплав до места, где река, оги-

бая хребет Харчерузь, прежде чем выйти из гор, образует широкую долину. Здесь, вблизи вершины Васькеу (1141,4 м н.у.м.), проводили стационарные исследования с 27 июня по 6 июля. Координаты базового лагеря — 67°18' с. ш., 66°43' в. д. После сплавились вниз по реке до ж/д моста трассы Обская — Бованенково, который хотя и находится за пределами горной части, но на небольшом удалении (по прямой около 7 км до выхода реки из гор).

В настоящей публикации мы акцентируем внимание лишь на некоторых птицах, которые либо встречены впервые на Полярном Урале, либо имеют недостаточно выясненное распространение, либо редки. Обычные и многочисленные виды приведены общим списком.

* * *

Чернозобая гагара *Gavia arctica.* На участке постоянно держались две пары птиц. Их наблюдали на одних и тех же пойменных озерах, но обнаружить гнезда не удалось.

Гуменник *Anser fabalis*. Стаю из 6 птиц, летящую вниз по долине реки, наблюдали 3 июля.

Белолобый гусь *A. albifrons.* Пара птиц была вспугнута 27 июня на берегу реки вблизи впадения ручья Харчерузь. Птицы подпустили довольно близко, проявляли беспокойство и, вполне возможно, гнездились неподалеку.

Пискулька *A. erythropus.* 6 июля во время сплава пара птиц была вспугнута на берегу реки у ж/д моста.

Чирок-свистунок *Anas crecca*. Отдельных самок видели в разных частях поймы. Одна из самок, встреченная 29 июня на протоке в районе лагеря, беспокоилась и активно отводила — по всей видимости, от птенцов, затаившихся в траве. В заболоченном ивняке в пойме 4 июля вспугнули стайку из 17 самцов и самку. Еще два одиночных самца держались на небольших озерах открытой поймы.

Свиязь *A. penelope.* 27 июня наблюдали 3 самцов и самку, кормящихся на берегу крупного озера в пойме реки. На крутом облесенном береговом склоне этого озера 28 июня обнаружено гнездо. В устье ручья, вытекающего из озера, 4 июля встречена самка с выводком. Еще одна самка взлетела с маленького озерка в пойме ниже по реке.

Шилохвость *A. acuta.* На большом пойменном озере 27 июня слышали крик самца и наблюдали самку, которая скрытно продвигалась вдоль берега. Позднее, 4 июня, на одной из проток вспугнули самку (возможно, ту же самую), которая полетела в сторону этого большого озера. Данные наблюдения позволяют предполагать гнездование.

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula.* 3 особи держались на крупных

озерах в пойме реки. На небольшом озере 1 июля встретили самку, которая вспугнутая лишь перелетела на другой конец озера. Вполне возможно, что она гнездилась поблизости.

Морская чернеть *A. marila.* Около 30 птиц разрозненными группами по 2–10 особей несколько дней держались на большом пойменном озере (отметка 185,0 м н.у.м.).

Морянка *Clangula hyemalis.* Была довольно обычна в пойме реки: встречались стайки самцов и самок, пары, одиночные птицы. Судя по встрече отдельных самок на одних и тех же озерах, можно предположить их гнездование.

Обыкновенный гоголь *Bucephala clangula.* Стайка из 7 самцов несколько дней держалась на крупном озере в пойме реки.

Синьга *Melanitta nigra.* На пойменных озерах постоянно отмечали несколько пар. Недалеко от устья ручья Харчерузь 27 июня вспугнули одиночную самку. Вполне возможно гнездование.

Обыкновенный турпан *M. fusca.* Четыре пары держались на участке в пойме реки, чаще всего на крупном озере с отметкой 185,0 м н. у. м. Одиночную самку несколько раз наблюдали на небольшом озерке. При приближении человека она не улетала, но беспокойно плавала из одного конца в другой. По всей вероятности, у нее поблизости было гнездо.

Большой крохаль *Mergus merganser.* Летящего над рекой самца наблюдали 27 июня недалеко от устья ручья Харчерузь.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. У подножия вершины 391,8 м н. у. м. вблизи г. Васькеу 30 июня встретили птицу неопределенной окраски (пестро окрашенный самец или самка со светлыми пятнами). Позднее несколько дней ее наблюдали в пойме напротив лагеря. Она все время занималась охотой, перелетая с места на место и, по всей видимости, не гнездилась. В кустарнике у подножия вершины 391,8 м н. у. м. 3 июля встретили самку, которая проявляла активное беспокойство.

Зимняк *Buteo lagopus.* В небольшом числе гнездился в долине реки и на прилегающих склонах (найдены гнезда, встречены беспокоящиеся пары).

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla.* Пара птиц встречена 27 июня напротив устья ручья Каньонный. Птицы находились рядом с гнездом, которое было расположено на 10-метровой лиственнице на берегу реки. При осмотре оказалось, что постройка многолетняя, и птицы здесь ранее гнездились. Разбросанные погадки, линные перья, пятна помета говорят о том, что и в этом году орланы долгое время держались возле гнезда. Однако они либо не приступили к яйцекладке, либо гнездование оказалось неудачным. Рядом обитала пара ворон, кото-

рые вполне могли разорить гнездо, как это мы наблюдали раньше на р. Войкар. Позднее, во время сплава 6 июля, по-видимому, эту же пару птиц мы встретили ниже по реке за пределами участка.

Дербник *Falco columbarius*. Две пары гнездились на участке в районе базового лагеря. В найденных гнездах (29 и 30 июня) были яйца. Одно гнездо было устроено на лиственнице на склоне массива Харчерузь, другое — на земле в кустарниковых зарослях на противоположной стороне реки.

Белая куропатка *Lagopus lagopus*. В разных местах в зарослях кустарников по ручьям и в лиственничнике вспугивали одиночных самцов. Самок не наблюдали — они в это время, по всей видимости, насиживали кладки.

Тундряная куропатка *L. mutus.* Была немногочисленна, но довольно обычна. Пары и отдельных птиц (самцов и самок) встречали как в открытых местах (курумники и горные тундры), так и на облесенных склонах.

Галстучник *Charadrius hiaticula.* Встречены две беспокоящиеся птицы: одна во время сплава 27 июня в 5 км выше по реке от базового лагеря, другая неоднократно наблюдалась на участке в 1 км ниже лагеря. Птицы держались на галечных косах реки.

Хрустан *Eudromias morinellus*. Встречен дважды. Одна птица — 30 июня на плоскогорье вершины 391,8 м н. у. м., у подножия г. Васькеу. Она затаивалась и молча перебегала с места на место. Другая встречена 5 июля на выровненном склоне с лишайниковой тундрой, сильно выбитой оленями, на высоте 300 м н. у. м. Притворяясь раненой, птица молча отводила от гнезда с 3 яйцами.

Перевозчик *Actitis hypoleucos.* Единственная встреченная птица токовала и беспокоилась в устье р. Немур.

Мородунка *Xenus cinereus*. На берегу реки возле лагеря 28 июня слышали позывку. В этот же день на берегу большого озера в пойме также слышали позывку.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*. На озерах в разных местах поймы 4 июля наблюдали одиночных птиц, пары и стайку из 5 особей. Признаков беспокойства птицы не проявляли.

Турухтан *Philomachus pugnax*. В разное время в открытой пойме встречены несколько беспокоящихся самок.

Белохвостый песочник *Calidris temminckii.* В верховьях Лонготъегана, у перехода дороги через реку, в том же месте, что и в 2002 г., 26 июня наблюдали токующую птицу. В 2 км ниже базового лагеря, в устье ручья, 4 июля встретили пару птиц.

Гаршнеп *Lymnocryptes minima*. 28 июня и в последующие несколь-

ко дней в окрестностях лагеря слышали токование. На одном из сырых участков 2 июля вспугнули гаршнепа.

Бекас *Gallinago gallinago*. В ближайших окрестностях базового лагеря постоянно слышали наземное токование, по всей видимости, одной и той же птицы. В пойменной тундре в устье ручья Каньонный 1 июля обнаружили гнездо бекаса.

Азиатский бекас *G. stenura*. В устье р. Немур 26 июня слышали токование наземное и в воздухе. Здесь же, в пойме, вспугнули одну птицу. В ернике на берегу небольшого ручья у подножия г. Васькеу 1 июля вспугнули одиночного бекаса.

Средний кроншнеп *Numenius phaeopus*. В тундре, прилегающей к реке, ниже устья р. Немур 26 июня слышали токование. Другая пара токовала и активно беспокоилась 6 июля недалеко от выхода реки из гор.

Короткохвостый поморник *Stercorarius parasiticus*. Одиночную птицу наблюдали у ж/д моста через Лонготъеган.

Длиннохвостый поморник *S. longicaudus.* Был относительно обычен. Беспокоящаяся пара встречена в долине реки у устья Немура, несколько пар гнездились на плоскогорьях в районе базового лагеря, найдены гнезда.

Восточная клуша *Larus heuglini.* Была довольно обычна. В районе базового лагеря несколько пар гнездились в пойме реки (найдены гнезда, отмечены беспокоящиеся птицы).

Сизая чайка *L. canus.* В пойме реки была обычна, гнездилась (найдено гнездо).

Полярная крачка *Sterna paradisaea.* В пойме Лонготъегана от устья Немура до выхода реки из гор, судя по активному беспокойству, гнездились 3 пары. Встречались также неразмножающиеся птицы.

Береговая ласточка *Riparia riparia*. Трех летящих над рекой птиц наблюдали 6 июля у выхода реки из гор.

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris*. Беспокоящуюся птицу встретили 30 июня на плоскогорье вершины 391,8 у подножия г. Васькеу. На противоположной стороне долины ручьев на пологом склоне (высота около 380 м н.у.м.) 3 июля обнаружено поселение из 3 пар.

Серая ворона *Corvus cornix.* Летящая птица отмечена в самых верховьях Лонготъегана, при переходе дороги через реку. В районе базового лагеря, судя по активному беспокойству, гнездились 2 пары. Встречались также неразмножающиеся птицы.

Ворон *C. corax*. 27 июня наблюдали одиночную птицу, летящую над поймой.

Свиристель *Bombycilla garrulus*. В лиственничнике на склоне массива Харчерузь отмечали свиристелей 29 июня.

Сибирская завирушка *Prunella montanella*. Немногочисленна. Несколько птиц пели и беспокоились в разных местах на облесенных склонах и в кустарниковых зарослях по ручьям.

Камышевка-барсучок *Acrocephalus schoenobaenus*. Был немногочислен. Отдельных поющих самцов отмечали по берегам реки и в зарослях кустарников по ручьям.

Пеночка-теньковка *Phylloscopus collybita*. Малочисленна. Отдельных поющих самцов отмечали в пойме реки и в лиственничниках на склонах, вплоть до верхней границы леса.

Зеленая пеночка *Ph. trochiloides*. В разреженном лиственничнике на склоне массива Харчерузь напротив лагеря существовало поселение из 2 самцов. Другое поселение из двух птиц находилось в лиственничнике, расположенном выше по реке. Все птицы активно пели.

Пеночка-зарничка *Ph. inornatus*. Была немногочисленна, но довольно обычна в лиственничниках на склоне массива Харчерузь и по берегам ручья Каньонный. Отмечали как поющих, так и беспокоящихся птиц.

Черноголовый чекан *Saxicola torquata*. На берегу реки в 2 км выше лагеря 29 июня встретили беспокоящуюся пару.

Синехвостка *Tarsiger cyanurus*. Несколько поющих самцов встречено в лиственничниках на склонах массива Харчерузь.

Белокрылый клест *Loxia leucoptera*. Наблюдали кочующих отдельных птиц и небольшие стайки.

Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula*. Неоднократно отмечали отдельных птиц в массивах древостоев на склонах гор и в кустарниках по берегам реки. Некоторые птицы проявляли беспокойство.

Тростниковая овсянка *Emberiza schoeniclus*. Беспокоящуюся пару встретили 30 июня в зарослях ивняка вдоль ручья на высоте около 200 м н. у. м. Самца, поющего в зарослях ивняка в пойме реки, отмечали 2 июля.

Полярная овсянка *E. pallasi*. Активно беспокоившуюся самку встретили 3 июля на склоне безымянного ручья на высоте 300 м н. у. м. Птица держалась в характерном биотопе — в зарослях ивняка и ерника высотой 0,5–1 м.

Подорожник *Calcarius lapponicus*. В горной части нами нигде не обнаружен, хотя на равнине сразу после выхода реки из гор наблюдали поющих и беспокоящихся птиц. Однако и здесь подорожник был немногочислен. В пределы горной части по широкой долине Лонготъегана отдельные пары проникают, видимо, в годы высокой численности птиц в предгорьях.

В числе видов, обнаружение которых в горах не вызывает удивле-

ния и не требует особых оговорок, следует указать встреченных нами **длинноносого крохаля** *Mergus serrator*, **золотистую ржанку** *Pluvialis apricaria,* **фифи** *Tringa glareola*, **лугового конька** *Anthus pratensis*, **краснозобого конька** *A. cervinus*, **белую трясогузку** *Motacilla alba*, **пеночку-весничку** *Phylloscopus trochilus*, **пеночку-таловку** *Ph. borealis*, **обыкновенную каменку** *Oenanthe oenanthe*, **варакушку** *Luscinia svecica*, **рябинника** *Turdus pilaris*, **белобровика** *T. iliacus*, **вьюрка** *Fringilla montifringilla*, **чечетку** *Acanthis flammea*, **овсянку-крошку** *Emberiza pusilla*.

ЛИТЕРАТУРА

Головатин М. Г., Пасхальный С. П. Заметки об орнитофауне Полярного Урала (окрестности массива Пайер) // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2000. С. 60–63.

Головатин М. Г., Пасхальный С. П. Заметки об орнитофауне юга Полярного Урала // Там же. 2001. С. 64–69.

Головатин М. Г., Пасхальный С. П. Орнитофауна окрестностей горного массива Пайер и прилегающих районов Полярного Урала // Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып. 2002. Т. XI, № 174. С. 75–97.

Головатин М. Г., Пасхальный С. П. Орнитофауна южной оконечности Полярного Урала // Там же. Экспресс-вып. 2002а. Т. XI, № 200. С. 911–937.

Головатин М. Г., Пасхальный С. П. Орнитофауна северной половины Полярного Урала. Ч. 1 // Там же. Экспресс-вып. 2003. Т. XII, № 222. С. 507–531.

Головатин М. Г., Пасхальный С. П. Орнитофауна северной половины Полярного Урала. Ч. 2 // Там же. Экспресс-вып. 2003а. Т. XII, № 223. С. 543–565.

Головатин М. Г., Пасхальный С. П. Птицы южной половины Полярного Урала (верховья р. Войкар) // Науч. вестн. Вып. 3 (29): Материалы по флоре и фауне Ямало-Ненецкого автоном. округа. Салехард, 2004. С. 68–100.

ЗАМЕТКИ О ФАУНЕ ПТИЦ ДВУОБЬЯ

М. Г. Головатин[1], С. П. Пасхальный[2], Д. О. Замятин[3]

[1] Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144. E-mail: golovatin@ipae.uran.ru

[2] Экологический стационар Института экологии растений и животных УрО РАН, ул. Зеленая горка, 21, г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого авт. округа, 629400. E-mail: spas@lbt.ru

[3] Департамент ИСПИ ЯНАО, ул. Ямальская, 14, г. Салехард Ямало-Ненецкого АО, 629000. E-mail: nauka89@mail.ru

Данная работа является уточнением к имеющемуся обзору орнитофауны поймы Нижней Оби (Головатин, Пасхальный, 2000) и касает-

ся птиц наиболее широкой части обской поймы — Двуобья. Речь в ней идет о видах, впервые отмеченных для района, редких, малочисленных и тех, распространение которых требует уточнения. Обычные и многочисленные виды приведены общим списком.

Сообщение основано на сведениях, собранных в период 12–17 июня, 16–20 июля и 8–13 августа 2004 г. во время стационарных наблюдений в центральной и наименее изученной части поймы (окрестности пос. Анжигорт, урочище Васыпугор — 65°26' с. ш., 64°56' в. д.) и во время переездов по протокам Малая и Горная Обь вниз до пос. Шурышкары, по протоке Ильюшкина Обь и более мелким протокам до р. Большая Обь близ пос. Хашгорт.

* * *

Краснозобая гагара *Gavia stellata.* Отмечена только в Войкарском сору. Это лишний раз подтверждает тезис о том, что в Двуобье вид встречается только на кормежке в приустьевых сорах притоков Оби (Головатин, Пасхальный, 2000).

Чернозобая гагара *G. arctica*. На сору вблизи Васыпугора отмечали пару и ежедневно слышали токование. В гнездовой сезон это было единственное место, где наблюдали птиц. На маршруте по р. Ильюшкина Обь до пос. Хашгорт на р. Большая Обь на 30 км участке поймы 8–9 августа насчитали 23 гагары, кормившихся на крупных протоках.

Красношейная поганка *Podiceps auritus.* Была довольно обычна. Птиц встречали и находили гнезда на заросших травой мелководьях. На заливном лугу в смешанной колонии **озерной** *Larus ridibundus* и **малой** *L. minutus* **чаек** 16 июня найдены несколько гнезд поганок.

Гуменник *Anser fabalis.* Отдельных пролетающих птиц наблюдали в центральной части поймы в окрестностях Васыпугора.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus.* Был обычен и даже многочислен для такой крупной и относительно редкой птицы. Во время поездки по Горной Оби 17 июня на 35 км мы насчитали 90 птиц. В одном скоплении была 51 особь. В окрестностях Васыпугора отмечены 4 гнездящиеся пары, найдены два гнезда, то и дело встречались небольшие группы. Одна пара лебедей гнездилась на небольшом соровом озере, 18 июля здесь держалась пара с 1 птенцом.

Красноголовая чернеть *Aythya ferina.* В одном из соров возле Васыпугора 15 июня наблюдали 2 пары птиц, державшихся вместе.

Обыкновенный турпан *Melanitta fusca.* Одиночный самец 12–16 июня держался рядом с парой синьг на одном из соров в окрестностях Васыпугора. На протоке и на другом соровом озере 17 июня кор-

мились 2 пары турпанов. В этот же день стаю из 5 особей наблюдали в Войкарском сору.

Луток *Mergus albellus.* Отдельные пары и самки встречались регулярно.

Полевой лунь *Circus cyaneus.* Охотящуюся самку несколько раз наблюдали вблизи Васыпугора.

Тетеревятник *Accipiter gentilis.* Одну птицу вспугнули 15 июня на берегу протоки близ урочища Кунопугор.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla.* На Васыпугоре обнаружено гнездо. В нем при дистанционном осмотре в бинокль 15–19 июня и 17 июля был виден один птенец. Взрослые птицы держались рядом, но явного беспокойства не выражали. Во время поездки по Горной Оби 17 июня на 35 км мы насчитали 16 птиц. Это были преимущественно неполовозрелые особи. В одном месте в непосредственной близости друг от друга держались сразу 7 птиц. Скопление орланов на этой протоке было вызвано выносом снулой рыбы из реки Войкар, где зимой случился замор. На протоке Мужипугорпосл 8–9 августа на 50-км участке поймы насчитали 16 орланов. Птицы держались по 2–3 особи по берегам крупных проток.

Белая куропатка *Lagopus lagopus.* Одного самца встретили 14 июня при обследовании Васыпугора. Он токовал, перелетал с места на место и явно держался своей территории. Самку не обнаружили, она в это время, скорее всего, сидела на гнезде.

Глухарь *Tetrao urogallus*. Перья взрослого самца найдены в древостое на Васыпугоре. Возможно, птица была добыта каким-то хищником еще по снегу.

Чибис *Vanellus vanellus.* Одиночную летящую птицу видели 16 июня в центральной части поймы возле Васыпугора.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus.* Повсеместно был обычен по берегам крупных проток с зарослями ивы древовидной.

Большой улит *Tringa nebularia*. Во время июньского обследования поймы встречена только одна пара птиц — в окрестностях Васыпугора.

Перевозчик *Actitis hypoleucos.* В глубине поймы беспокоящуюся птицу отмечали 12–17 июня на одной из проток на Васыпугоре.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus.* В июне и июле одиночных кормящихся птиц отмечали в окрестностях Васыпугора.

Турухтан *Philomachus pugnax*. На открытом берегу одной из проток 14 июня встретили сидящего самца.

Гаршнеп *Lymnocryptes minima*. Токующего самца 12–17 июня периодически слышали в сырой пойме между Васыпугором и Кунопугором. Птица явно была местной и, вполне вероятно, гнездилась здесь.

Дупель *Gallinago media*. В окрестностях Васыпугора 15 июня дважды вспугивали одиночных птиц. Птицы придерживались береговых валов, занятых относительно сухими лугами с купами ив.

Большой веретенник *Limosa limosa.* Двух птиц наблюдали 16 июня на Анжигортской протоке: одна летела вдоль протоки, другая кормилась на берегу. В окрестностях пос. Шурышкары 17 июня встретили стайку из трех птиц, летящих вниз по реке. Около 20 птиц, кормившихся на берегу протоки близ урочища Васыпугор, наблюдали 16–19 июля. На прилегающей территории большой веретенник гнездится на тундроподобных болотах вдоль притоков Оби (Головатин, 1999). В последние годы численность его растет, можно ожидать новых, более северных находок в Приобье.

Глухая кукушка *Cuculus saturatus*. В течение почти всего времени наблюдений (июнь–июль) один самец держался и токовал на Васыпугоре в кедрово–лиственничном редколесье и на прилегающих березово–ивовых гривах. Другой самец токовал в соседнем урочище Кунопугор.

Ястребиная сова *Surnia ulula.* Одиночная птица охотилась 11 августа на березово–ивовой гриве.

Вертишейка *Jynx torquilla.* На березово–ивовой гриве 13 августа наблюдали кормящуюся птицу.

Трехпалый дятел *Picoides tridactylus*. Кормящихся и пролетающих самцов несколько раз отмечали в зарослях древовидных ив. Самки, видимо, в это время были заняты насиживанием. Здесь же, в так называемых талах, находили старые дупла дятлов. Мы предполагаем, что это были гнезда трехпалых дятлов, т. к. они были устроены в старых, гнилых (рассыпающихся) стволах ив, на небольшой высоте (до 2–2,5 м), летки был разбиты и выглядели не такими аккуратными, как у пестрого дятла. Кроме того, пестрых дятлов мы за все время работы (включая предыдущие годы) летом в пойме не встречали. Маловероятно, что такое, сравнительно большое, количество дупел могло быть сделано пестрыми дятлами.

Желтая трясогузка *Motacilla flava*. На берегу Васыпугора 14 июня наблюдали беспокоившуюся пару.

Кедровка *Nucifraga caryocatactes*. Одна–две пары птиц постоянно держались на Васыпугоре и, возможно, гнездились.

Ворон *Corvus corax*. На окраине Васыпугора 16 июня слышали пролетавшую птицу, а 17 июля видели двух (пару?) воронов**.**

Сибирская завирушка *Prunella montanella*. На Лиственничном мысу Войкарского сора 17 июня слышали поющего самца, что лишний раз подтверждает наше наблюдение, что этот вид встречается только по облесенной периферии обской поймы, не проникая в глубь ее.

Славка-завирушка *Sylvia curruca.* В глубине поймы двух поющих самцов отмечали на Васыпугоре. Птицы пели, держались на одном месте, и, вероятно, гнездились.

Мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca*. Возле лагеря на Васыпугоре 15 июня наблюдали самца. Птица несколько раз пропела и исчезла.

Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus.* В центральной части поймы пара птиц держалась возле лагеря на Васыпугоре. В с. Мужи была обычна.

Чернозобый дрозд *Turdus atrogularis.* Пение слышали 17 июня на Лиственничном мысу Войкарского сора.

Буроголовая гаичка *Parus montanus*. Пара держалась на Васыпугоре. Самец активно пел и, по всей вероятности, птицы гнездились здесь.

Белокрылый клест *Loxia leucoptera*. Во время остановки на Лиственничном мысу Войкарского сора 17 июня наблюдали «пролет» стаек по 15–20 особей. Птицы перемещались в южном направлении, останавливались для кормежки. Утром в течение часа можно было увидеть 3–4 таких стайки.

Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula.* Поющую птицу встретили 17 июня на Лиственничном мысу Войкарского сора.

В числе видов, обнаружение которых в пойме Оби не требует особых комментариев, следует указать встреченных нами обычных или многочисленных **чирка-свистунка** *Anas crecca*, **свиязь** *A. penelope*, **шилохвость** *A. acuta*, **чирка-трескунка** *A. querquedula*, **широконоску** *A. clypeata*, **хохлатую чернеть** *A. fuligula*, **синьгу** *M. nigra*, **фифи** *Tringa glareola*, **мородунку** *Xenus cinereus*, **малую чайку** *Larus minutus*, **озерную чайку** *L. ridibundus*, **восточную клушу** *L. heuglini,* **сизую чайку** *L. canus,* **речную крачку** *Sterna hirundo*, **обыкновенную кукушку** *Cuculus canorus*, **болотную сову** *Asio flammeus,* **белую трясогузку** *Motacilla alba*, **сороку** *Pica pica,* **серую ворону** *Corvus cornix,* **камышевку-барсучка** *Acrocephalus schoenobaenus*, **пеночку-весничку** *Phylloscopus trochilus*, **пеночку-теньковку** *Ph. collybita*, **пеночку-таловку** *Ph. borealis*, **варакушку** *Luscinia svecica*, **рябинника** *Turdus pilaris*, **белобровика** *T. iliacus*, **вьюрка** *Fringilla montifringilla*, **обыкновенную чечетку** *Acanthis flammea,* **тростниковую овсянку** *Emberiza schoeniclus* и **овсянку-крошку** *E. pusilla*.

ЛИТЕРАТУРА

Головатин М. Г., Пасхальный С. П. Орнитофауна поймы Нижней Оби // Науч. вестн. Вып. 4: Материалы к познанию фауны и флоры Ямало–Ненецкого автономного округа (ч. 1). Салехард, 2000. С. 18–37.

Головатин М.Г. Птицы бассейна реки Войкар // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1999. С. 75–82.

СВЕДЕНИЯ О ФАУНЕ ПТИЦ РЕКИ ЮРИБЕЙ (ЯМАЛ)

М. Г. Головатин[1], С. П. Пасхальный[2], В. А. Соколов[1]

[1] Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, Екатеринбург, 620144. E-mail: golovatin@ipae.uran.ru; sokol@ipae.uran.ru
[2] Экологический стационар Института экологии растений и животных УрО РАН, ул. Зеленая Горка, 21, г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого авт. округа, 629400. E-mail: spas@lbt.ru

Несмотря на то, что полуостров Ямал — один из наиболее изученных в орнитологическом плане северных регионов, здесь есть целый ряд видов, сведения о которых представляют значительный интерес. К числу интереснейших для орнитолога мест можно отнести одну из главных водных артерий Ямала — р. Юрибей. Она практически пересекает полуостров с востока на запад и здесь проходит граница между Южным и Средним Ямалом (Данилов и др., 1984). На страницах этой публикации мы представляем некоторые результаты исследования орнитофауны бассейна Юрибея в сезон 2004 г. С 12 по 29 июля мы обследовали нижнюю половину реки протяженностью 250 км, от фактории Усть-Юрибей (68°54' с. ш., 89°28' в. д.) вверх несколько выше устья р. Меретаяха (68°38' с. ш., 71°57' в. д.). Наблюдения проводили как при передвижении по реке, так и во время пеших экскурсий на площадках. Приводятся также некоторые сведения о птицах, встреченных на р. Хэяха, впадающей в Байдарацкую губу немного южнее устья Юрибея (68° 49' с. ш., 69° 14' в. д.).

В работе мы акцентируем внимание на птицах, распространение которых нуждалось в уточнениях. В их число попали и некоторые обычные для района виды. Остальные птицы, многочисленные или обычнейшие, встречи которых не вызывают особого интереса или удивления, приведены общим списком.

* * *

Краснозобая гагара *Gavia stellata.* Кормящиеся и беспокоящиеся особи встречались на всем протяжении реки, но особенно часто — в ее низовьях, ниже устья протоки Яратасе (около 30 км вверх от фактории Усть-Юрибей).

Краснозобая казарка *Rufibrenta ruficollis.* Встречалась выше устья р. Нянзотаяха (около 100 км вверх от фактории Усть-Юрибей), прак-

тически во всех подходящих местах: у крупных протяженных обрывов, причем не только там, где гнездились сапсаны, но и где были гнезда мохноногих канюков. Обычно видели по 2–3 пары казарок с выводками, встречались группы линных птиц. Самая крупная колония (5 пар) обнаружена в устье р. Хутыяха. Еще одно поселение обнаружено на протоке Хулыюн, впадающей в р. Лата-Маретаяха близ оз. Сявтото. В 1980–86 гг. в двух последних местах казарок не находили (Пасхальный и др., 1995). По сравнению с указанным периодом, в обследованной нами части реки увеличилось и общее число взрослых птиц, и выводков.

Пискулька *Anser erythropus.* На Юрибее встречена только одна пара с выводком вблизи урочища Нероюн (около 120 км вверх от фактории Усть-Юрибей). Еще одна пара встречена на р. Хеяха.

Гуменник *A. fabalis.* Был относительно малочислен (учтено менее 10 пар). Пары с выводками встречались на всем протяжении реки.

Малый лебедь *Cygnus bewickii.* Достаточно обычен, группы птиц и пары с птенцами встречались на всем протяжении реки. Ненцы также отмечают увеличение численности вида.

Чирок-свистунок *Anas crecca.* Малочислен. Встречены лишь единичные птицы, в том числе беспокоящиеся самки. На пойменном озере близ устья р. Меретаяха 21 июля наблюдали выводок из 10 пуховичков.

Свиязь *A. penelope.* Самка с пуховыми птенцами встречена 21 июля на пойменном озере в районе Меретаяхи. Еще одна самка беспокоилась 25 июля в пойме близ устья Хутыяхи.

Шилохвость *A. acuta.* Малочисленна. Встречались небольшие группы линных птиц и особей, закончивших линьку. На пойменном озере 21 июля встречена самка с пуховыми птенцами.

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula.* 18 июля одиночный самец встречен на реке у протоки Хулыюн (160 км вверх от фактории Усть-Юрибей).

Гоголь *Bucephala clangula.* На реке регулярно встречались отдельные особи и небольшие стайки (до 7 птиц).

Гага-гребенушка *Somateria spectabilis.* На Юрибее одна самка встречена 20 июля на небольшом озерке в пойме в окрестностях оз. - Сявтато. При приближении человека она улетела в западном направлении. Самку с 5 птенцами наблюдали 26 июля в среднем течении р. Хэхэдэяха (окрестности фактории Усть-Юрибей). Две небольшие стайки (из 3 и 5 птиц) встречены в нижнем течении р. Хэяха недалеко от Юрибея.

Синьга *Melanitta nigra.* Была немногочисленна, но мелкие стайки и

отдельные птицы обоих полов регулярно встречались на реке и пойменных озерах. Встречены также выводки.

Турпан *M. fusca.* На реке и пойменных озерах эта утка встречалась регулярно, но в меньшем числе, чем синьга. Наблюдали выводки — в частности, 25 июля на пойменном озере напротив устья Хутыяхи встретили самку с 8 пуховичками.

Луток *Mergus albellus.* На Юрибее лишь редкие встречи: одиночная самка в стае других уток на пойменном озере в самой верхней обследованной точке и три самки — в пойме урочища Ламдонадо. Южнее, на р. Хэяха, 12 июля мы наблюдали отдельных самок и небольшие их стайки (до 6 особей) неоднократно.

Длинноносый крохаль *M. serrator.* Встречены единичные самки и небольшие стайки (2–3 особи). Один из ненцев сообщил о находке весной гнезда в устье Сохонтосе. Судя по описанию, речь шла о длинноносом крохале.

Полевой лунь *Circus cyaneus L.* Был крайне малочислен, встречен всего несколько раз в разных местах.

Степной лунь *C. macrourus.* 21 июля в пойме урочища Ламдонадо (68°47' с. ш., 71°22' в. д.) наблюдали охотящегося самца. После нескольких безуспешных попыток птице удалось поймать добычу, которую она унесла, скрывшись из виду. Позднее ее видели парящей в воздухе над этим местом.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla.* На всем протяжении обследованного участка реки был обычен, отдельные особи и пары попадались регулярно. Встречались как старые, так и неполовозрелые птицы.

Сапсан *Falco peregrinus.* Обычен. Беспокоящиеся пары и гнезда были встречены на большинстве береговых обрывов, иногда на обрывах у озер вдали от реки.

Дербник *F. columbarius.* Встречен дважды: 20 июля — у обрыва в районе оз. Сявтато, 22 июля — в районе протоки Нгобигоюн (птица несла добычу и ее преследовали мелкие воробьиные).

Хрустан *Eudromias morinellus.* Активно беспокоящаяся птица встречена 15 июля в районе оз. Нюдя-Мярато (15 км вверх по реке от фактории Усть-Юрибей).

Гаршнеп *Lymnocryptes minima.* Хотя гаршнеп в небольшом числе гнездится на Юрибее (Головатин, 1998; Пасхальный, 1993), в 2004 г. он нами нигде не обнаружен, несмотря на огромную площадь обследованной территории. Можно только предположить, что к моменту работ токование птиц уже полностью завершилось (по нашим наблюдениям в 1982–90 гг. на этой широте оно прекращалось к 15 июля), либо численность птиц из-за поздней весны оказалась ниже обычной.

Бекас *Gallinago gallinago.* Был немногочислен: отмечали наземное токование, в разных местах вспугивали одиночных птиц.

Азиатский бекас *G. stenura.* В пойме Юрибея в районе Меретаяхи 22 июля несколько раз был вспугнут, судя по особенностям полета и крику, азиатский бекас. По всей видимости, это была одна и та же птица, перелетавшая с места на место.

Бургомистр *Larus hyperboreus.* Отдельные особи и пары встречались на реке вверх до устья Хутыяхи и несколько выше (84 км от фактории Усть-Юрибей). Птицы держались недалеко от рыболовных сетей неподалеку от поселений людей (чумы, фактории).

Болотная сова *Asio flammeus.* Встречены всего несколько птиц, охотящихся в пойме в разных частях реки.

Береговая ласточка *Riparia riparia.* Колонии самой разной величины встречались выше Хутыяхи. Самая большая из них, около 200 норок, обнаружена на большом обрыве в 11 км выше Сявтатосе (175 км от фактории Усть-Юрибей). Птицы селились как в крупных, так и небольших береговых обрывах. То, что береговушка была обычной, особенно удивительно, если учесть, что раньше колонии этого заметного вида здесь не наблюдали: в 1982–86 гг. мелкие поселения регистрировали гораздо выше по реке, а в среднем течении ласточек видели всего два раза (Пасхальный, 1989).

Сибирский конек *Anthus gustavi.* Был относительно немногочислен, но довольно обычен. Встречался преимущественно отдельными парами, в урочище Пинсаля (50 км выше устья Хутыяхи) обнаружили плотное поселение из 5 пар. Птицы придерживались исключительно заливной поймы, сырого разреженного ивняка, т. е. тех же местообитаний, что и на стационаре «Еркута», где сибирский конек регулярно отмечается с 2001 г. (Соколов и др., 2001; Соколов, 2003). Встреченные птицы проявляли активное беспокойство. Крик беспокойства очень характерный: напоминает таковой у веснички, но чуть грубее и более размеренный, заметно отличается от звуков, издаваемых луговым и краснозобым коньками (спутать невозможно!). Молодые летающие птицы, встреченные в последней декаде июля, издавали такие же звуки, с той лишь разницей, что они не были столь частыми, как при беспокойстве, а скорее отдельными.

Луговой конек *A. pratensis.* Встречался повсеместно и был довольно многочислен, сравним по численности с краснозобым коньком.

Желтая трясогузка *Motacilla flava.* Компактное поселение из трех пар встречено у заброшенной буровой в окрестностях Меретаяхи. Птицы с кормом для птенцов активно беспокоились.

Серая ворона *Corvus cornix.* В устье р. Паютакояха мельком наблюдали птицу, чрезвычайно похожую на ворону.

Ворон *C. corax.* На Юрибее встречен не был. Ближайшая точка, где отмечали ворона, — 20 км севернее р. Еркута. Здесь у ж/д моста держалась пара с 4 молодыми птицами.

Сибирская завирушка *Prunella montanella.* Встречена только в самой восточной части обследованной территории — в окрестностях Меретаяхи. В разных частях поймы, в ивняках, 22 июля активно беспокоились 3 птицы.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe.* Каменка, обычно немногочисленная и спорадически распространенная в тундрах Ямала, была на обследованной территории на удивление обыкновенна и встречалась повсеместно.

Рябинник *Turdus pilaris.* Единственная пара, выкармливающая птенцов, встречена на брошенной буровой в окрестностях Меретаяхи.

Полярная овсянка *Emberiza pallasi.* Беспокоящиеся птицы в небольшом числе встречались в пойме в самых разных частях реки. В окрестностях оз. Нюдя-Мярато (15 км выше фактории Усть-Юрибей) 16 июля найдено гнездо с 2 пяти–шестидневными птенцами.

Пуночка *Plectrophenax nivalis.* Единственное поселение из 3–4 пар обнаружено на фактории Усть-Юрибей. Здесь 14 июля видели хорошо летающих слетков.

В качестве обычных и многочисленных видов повсеместно встречались: **чернозобая гагара** *Gavia arctica*, **белолобый гусь** *Anser albifrons*, **морская чернеть** *Aythya marila*, **морянка** *Clangula hyemalis*, **зимняк** *Buteo lagopus*, **белая куропатка** *Lagopus lagopus*, **тулес** *Pluvialis squatarola* (был малочислен), **золотистая ржанка** *P. apricaria*, **галстучник** *Charadrius hiaticula*, **фифи** *Tringa glareola*, **круглоносый плавунчик** *Phalaropus lobatus*, **турухтан** *Philomachus pugnax*, **кулик-воробей** *Calidris minuta*, **белохвостый песочник** *C. temminckii*, **чернозобик** *C. alpina*, **короткохвостый поморник** *Stercorarius parasiticus*, **длиннохвостый поморник** *S. longicaudus*, **восточная клуша** *Larus heuglini*, **полярная крачка** *Sterna paradisaea* (была относительно малочисленна), **рогатый жаворонок** *Eremophila alpestris*, **краснозобый конек** *Anthus cervinus*, **желтоголовая трясогузка** *Motacilla citreola*, **белая трясогузка** *M. alba*, **камышевка-барсучок** *Acrocephalus schoenobaenus*, **пеночка-весничка** *Phylloscopus trochilus*, **пеночка-теньковка** *Ph. collybita*, **варакушка** *Luscinia svecica*, **белобровик** *Turdus iliacus*, **чечетка** *Acanthis flammea*, **тростниковая овсянка** *Emberiza schoeniclus*, **овсянка-крошка** *Emberiza pusilla*, **подорожник** *Calcarius lapponicus.*

ЛИТЕРАТУРА

Головатин М. Г. Материалы к орнитофауне верховьев Юрибея // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1998. С. 38–40.

Данилов Н. Н., Рыжановский В. Н., Рябицев В. К. Птицы Ямала. М.: Наука, 1984. 332 с.

Пасхальный С. П. К орнитофауне Среднего и Южного Ямала // Наземные позвоночные естественных и антропогенных ландшафтов Северного Приобья. Свердловск, 1989. С. 40–47.

Пасхальный С. П. Распространение гаршнепа на Урале и в Западной Сибири. Разные районы Ямало-Ненецкого округа // Информация РГК. Екатеринбург: Наука, 1993. С. 14.

Пасхальный С. П., Сосин В. Ф., Штро В. Г. Краснозобая казарка *(Rufibrenta ruficollis)* на Ямале: распространение, численность, воспроизводство популяции // Бюл. РГГ Вост. Европы и Сев. Азии. № 1. М., 1995. С. 103–109.

Соколов В. А., Соколов А. А., Фишер С. В., Огарков А. Э. Новые данные о распространении птиц на юго-западе Ямала // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2001. С. 144–147.

Соколов В. А. К орнитофауне юго-западного Ямала // Там же. 2003. С. 167–169.

К ОРНИТОФАУНЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА «САМАРОВСКИЙ ЧУГАС»

А. А. Емцев

Биологический факультет Сургутского гос. университета, ул. Энергетиков, 14, г. Сургут Ханты-Мансийского авт. округа, 628400. E-mail: imdia@surguttel.ru

Территориально-природный парк «Самаровский чугас» находится в г. Ханты-Мансийске и его ближайших окрестностях. Основные площади покрытых лесом земель занимают кедровники — 44,2 %, ель и пихта — 22,8 %. На долю мелколиственных лесов приходится 33 %. На территории парка располагаются 3 урочища: «Острова», «Городские леса» и «Шапшинское».

Исследования проводились на островной части парка в районе д. Нов. Тренька (61°13' с. ш., 69°03' в. д.) с 4 по 21 июля 2004 г.

* * *

Красношейная поганка *Podiceps auritus*. Самка с выводком встречена 21 июля на р. Иртыш приблизительно в 8 км от Ханты-Мансийска.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. Несколько пролетавших птиц слышали 9 июля.

Кряква *Anas platyrhynchos*. На одной из стариц найдены перья линной птицы.

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*. Пролетающую над лесом самку видели 11 и 13 июля.

Гоголь *Bucephala clangula*. Немногочисленная утка, гнездящаяся в дуплянках.

Черный коршун *Milvus migrans*. Парящих над пойменными лугами черных коршунов отмечали 4 и 21 июля.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Пары и одиночных птиц регулярно наблюдали как на территории парка, так и за его пределами. На высоком кедре на краю откоса 11 июля обнаружили гнездо, самец и самка летали неподалеку, временами кричали. По данным А. С. Яскова (личное сообщение), в результате проведенных здесь поисковых мероприятий было обнаружено 4 гнездовья.

Чеглок *Falco subbuteo*. Встречали неоднократно. Пролетающую пару видели 14 июля, одиночных особей — 11 и 18 июля. По-видимому, это были одни и те же птицы.

Рябчик *Tetrastes bonasia*. Выводки из подросших птенцов попадались нам 8, 12 и 15 июля. Все встречи отмечены в высокоствольном березово–кедровом лесу на разных участках острова.

Перепел *Coturnix coturnix*. «Бой» самца слышали на одной из полян 14–16 и 18 июля.

Коростель *Crex crex*. «Пение» коростеля слышали на пойменном лугу 17 июля.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*. Пролетавших в разных частях парка одиночных птиц отмечали 9 и 14 июля.

Черныш *Tringa ochropus*. Сильно беспокоившуюся на пойменном лугу птицу наблюдали 8 июля.

Большой улит *T. nebularia*. Беспокойство большого улита слышали с поймы 5 июля, в последующем эта довольно заметная в гнездовой период птица нам не попадалась.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. Пролетавшего высоко над лесом большого кроншнепа наблюдали 17 июля.

Большой веретенник *Limosa limosa*. Пролетавшего над поймой самца видели 8 июля.

Речная крачка *Sterna hirundo*. Пару кормящихся речных крачек наблюдали 13 июля.

Большая горлица *Streptopelia orientalis*. Воркование одного самца слышали на протяжении всего периода исследований. Часто наблюдали кормящуюся птицу у нашего лагеря.

Глухая кукушка *Cuculus saturatus*. Малочисленна. Пение отмечали в высокоствольном кедрово–еловом лесу в начале июля.

Болотная сова *Asio flammeus*. Регулярно охотилась на поляне у

нашего лагеря, временами кричала. Попытки отыскать гнездо результатов не дали.

Черный стриж *Apus apus*. 2 черных стрижа отмечены 6 июля.

Вертишейка *Jynx torquilla*. Пение вертишейки слышали в высокоствольном смешанном лесу 11–12 июля.

Желна *Dryocopus martius*. Дробь желны слышали 8 июля.

Трехпалый дятел *Picoides tridactylus*. Барабанящих дятлов отмечали 15 и 18 июля в кедрово–еловом высокоствольном лесу.

Лесной конек *Anthus trivialis*. Встречен лишь однажды, 10 июля, на краю березово-кедрового леса.

Белая трясогузка *Motacilla alba*. Немногочисленна. Изредка встречали пролетавших и кормившихся птиц.

Свиристель *Bombycilla garrulus*. В начале июля попадались пары и одиночные птицы.

Певчий сверчок *Locustella certhiola*. Певчего сверчка слышали 20 июля на пойменном лугу.

Садовая славка *Sylvia borin*. В смешанном высокоствольном лесу 8 июля в кустах малины найдено гнездо с 5 насиженными яйцами. Вылупление птенцов происходило 10 июля.

Серая мухоловка *Muscicapa striata*. Кормящихся в елово-кедровом лесу птиц видели 18 июля.

Зарянка *Erithacus rubecula*. Пение слышали в высокоствольном березово-кедровом лесу 16 июля.

Соловей-красношейка *Luscinia calliope*. Пение слышали в пойменных ивовых зарослях 10 июля.

Певчий дрозд *Turdus philomelos*. Пение отмечали в кедрово-еловом лесу.

Деряба *T. viscivorus*. Несколько раз пел у редколесья.

Сероголовая гаичка *Parus cinctus*. Несколько кормящихся птиц встретили на краю березово–кедрового леса 13 июля.

Домовый воробей *Passer domesticus*. У жилых домов 12 июля кормилась самка.

Обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus.* На лугу с зарослями малины и крапивы неоднократно отмечали поющего самца.

* * *

Помимо перечисленных выше видов, обычными или многочисленными гнездящимися (найдены гнезда или слетки) были: **пестрый дятел** *Dendrocopos major*, **береговая ласточка** *Riparia riparia*, **пятнистый конек** *Anthus hodgsoni*, **желтая трясогузка** *Motacilla flava*, **серая ворона** *Corvus cornix*, **луговой чекан** *Saxicola rubetra*, **черного-**

ловый чекан *S. torquata*, **рябинник** *Turdus pilaris* и **юрок** *Fringilla montifringilla*.

Скорее всего, также к категории гнездящихся относится еще ряд обычных или многочисленных видов, для которых прямых доказательств гнездования не получено. Это **чирок-свистунок** *Anas crecca*, **погоныш** *Porzana porzana*, **бекас** *Gallinago gallinago*, **сизая чайка** *Larus canus*, **обыкновенная кукушка** *Cuculus canorus*, **кедровка** *Nucifraga caryocatactes*, **сорока** *Pica pica*, **ворон** *Corvus corax*, **пятнистый сверчок** *Locustella lanceolata*, **камышовка-барсучок** *Acrocephalus schoenobaenus*, **садовая камышовка** *A. dumetorum*, **славка-завирушка** *Sylvia curruca*, **пеночка-весничка** *Phylloscopus trochilus*, **пеночка-теньковка** *Ph. collybita*, **пеночка-зарничка** *Ph. inornatus*, **буроголовая гаичка** *Parus montanus*, **поползень** *Sitta europaea*, **зяблик** *Fringilla coelebs*, **чечетка** *Acanthis flammea*, **клест-еловик** *Loxia curvirostra* и **обыкновенный снегирь** *Pyrrhula pyrrhula*.

К ФАУНЕ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

И. Н. Еременко

А/я 9931, г. Челябинск, 454014. E-mail: ilereil@mail.ru

В данном сообщении представлены дополнения к ранее опубликованным данным по орнитофауне г. Челябинска и Челябинской области (Еременко, 2001, 2002, 2003; Еременко, Поляков, 2003).

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. Одна и та же особь наблюдалась на р. Миасс в г. Челябинске со второй половины ноября 2003 г. по конец февраля 2004 г. на пруду Коммунар, а со 2 по 20 марта 2004 г. — в центре города (ниже моста по ул. Кирова).

Кряква *Anas platyrhynchos*. Один самец плавал 25 декабря 2003 г. в полынье у левого берега Южноуральского водохранилища (г. Южноуральск, р. Увелька), напротив Южноуральской ГРЭС.

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*. Три чернети (один самец и две самки) держались в полынье Южноуральского водохранилища 25 декабря 2003 г. Один самец отмечался в г. Челябинске на р. Миасс (пруд Коммунар) с конца ноября 2003 г. по конец марта 2004 г.

Гоголь *Bucephala clangula*. Зимой 2003–2004 гг. (с декабря по март) в г. Челябинске на р. Миасс (пруд Коммунар) наблюдалась пара гоголей (самец и самка).

Лысуха *Fulica atra.* Одна птица плавала 25 декабря 2003 г. в полынье Южноуральского водохранилища совместно с кряквой и хохлатыми чернетями.

Грач *Corvus frugilegus*. В г. Челябинске, на городской свалке мусора, мы с В.Е. Поляковым 18 января 2004 г. наблюдали несколько групп грачей численностью по 4–7 особей. Судя по всему, на городской свалке в зимний период, совместно с другими врановыми, держатся не менее 100 грачей.

ЛИТЕРАТУРА

Еременко И. Н. Интересные встречи птиц в Челябинске // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2001. С. 69–70.

Еременко И. Н. О некоторых встречах птиц в Челябинской и Оренбургской областях // Там же. 2002. С. 127–128.

Еременко И. Н. Материалы к распространению птиц на юге Челябинской области // Там же. 2003. С. 87–88.

Еременко И. Н., Поляков В. Е. Зимняя орнитофауна Челябинска // Там же. 2003. С. 88–92.

ОРНИТОФАУНА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»

А. К. Жуков

Орнитолог национального парка «Припышминские боры» Анатолий Кузьмич Жуков готовил обзорную статью для нашего сборника 2003 г., но закончить работу не успел — погиб в дорожной катастрофе. Рукопись подготовил к печати В. А. Коровин, полностью сохранив авторские сведения по распределению и статусу видов, но в тексте есть его (***В. К.***) примечания. Кроме того, в нашем сборнике есть статья В. А. Коровина, в которой он обсуждает некоторые данные, приведенные А. К. Жуковым. Описание территории НП дано А. А. Жуковым. — ***Ред.***

В национальном парке «Припышминские боры» в течение 1995–2003 гг. проведены полевые наблюдения за птицами с целью выяснения видового состава, выявления редких видов. Наблюдения проводились на территории парка и в пределах проектируемой охранной зоны. По результатам проведенных работ ниже приводится аннотированный список птиц национального парка (НП) с указанием их статуса.

Территория НП представлена двумя участками: Талицкая дача (26644 га) и Тугулымская дача (22527 га), расположенными, соответственно, в Талицком и Тугулымском районах на востоке Свердловской области.

Современный рельеф пышминских надпойменных террас в целом равнинный, полого-увалистый. Увалы, вытянутые с запада на восток, разделены широкими и плоскодонными древними ложбинами стока, а

в поперечном направлении расчленены узкими врезанными долинами речек и ручьев современной гидрографической сети — притоков р. Пышмы. На поверхности увалов обычны многочисленные мелкие западины, террасы и ложбины, а замкнутые котловины заняты верховыми болотами, реже — озерами. На территории НП находятся Ургинский пруд и оз. Гурино. Оба эти водоема являются гидрологическими памятниками природы областного значения.

Особенности состава растительности Припышминского лесного массива и окружающих территорий определяются его положением в подзоне предлесостепных (подтаежных) сосново–березовых лесов.

Несмотря на широко распространенные на сплошных вырубках процессы смены сосны березой и осиной, в формационном составе растительности Припышминских боров преобладают сосновые леса (43 % покрытой лесом площади). На долю ельников, произрастающих здесь вблизи южной границы своего ареала и сохранившихся преимущественно в наиболее пониженных и увлажненных местообитаниях, приходится всего 2–4 % площади.

* * *

Красношейная поганка *Podiceps auritus.* Редкий гнездящийся вид. В квартале 32 (пруд-карпятник) 17 июля 2002 г. встречен выводок.

Черношейная поганка *P. nigricollis.* Отмечена на весеннем пролете.

Большая поганка *P. cristatus.* Встречается весной на пролете.

Большая выпь *Botaurus stellaris.* Редкая гнездящаяся птица. В пойме Пышмы летом встречены выводки.

Серая цапля *Ardea cinerea.* Редкий, возможно, гнездящийся вид.

Большая белая цапля *Egretta alba.* Весной 1998 г. встречены 3 птицы в пойме Пышмы.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus.* Очень редок, отмечен на весеннем пролете.

Серый гусь *Anser anser.* Регистрируется на весеннем и осеннем пролете.

Белолобый гусь *A. albifrons.* Встречается в периоды весенних и осенних миграций.

Кряква *Anas platyrhynchos.* Обычный гнездящийся вид.

Чирок-свистунок *A. crecca.* Обычен на гнездовании.

Серая утка *A. strepera.* Редкий гнездящийся вид. Летом отмечены выводки на старицах Пышмы.

Свиязь *A. penelope.* Редкая, вероятно, гнездящаяся утка. Летом встречаются отдельные особи.

Шилохвость *A. acuta.* Редка. В пойме Пышмы найдены 2 гнезда.

Чирок-трескунок *A. querquedula.* Обычный гнездящийся вид.

Широконоска *A. clypeata.* Обычна на гнездовании.

Красноголовая чернеть *Aythya ferina.* Очень редка, возможно, гнездится. В конце лета одиночные птицы встречены в пойме Пышмы.

Хохлатая чернеть *A. fuligula.* Редкий гнездящийся вид.

Обыкновенный гоголь *Bucephala clangula.* Регистрируется на весеннем и осеннем пролете.

Луток *Mergus albellus.* Встречается на пролете весной и осенью.

Скопа *Pandion haliaetus.* Весной встречена одна птица на рыборазводном пруду у д. Грозина.

Черный коршун *Milvus migrans.* Обычен на гнездовании.

Полевой лунь *Circus cyaneus.* Редкий, вероятно, гнездящийся вид.

Луговой лунь *C. pygargus.* Редок, возможно, гнездится.

Болотный лунь *C. aeruginosus.* Редкий, возможно, гнездящийся вид. Встречается в пойме Пышмы.

Тетеревятник *Accipiter gentilis.* Обычный гнездящийся вид.

Перепелятник *A. nisus.* Обычный гнездящийся вид.

Зимняк *Buteo lagopus.* Встречается в периоды весенних и осенних миграций.

Обыкновенный канюк *B. buteo.* Обычный гнездящийся вид.

Степной орел *Aquila rapax.* Осенью встречена одна птица на территории Талицкой дачи.

Беркут *A. chrysaetos.* Очень редок: встречена одна птица в осенний период.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla.* Очень редок, зарегистрирован на осеннем пролете.

Кречет *Falco rusticolus.* Осенью одна птица встречена у д. Ретина.

Сапсан *F. peregrinus.* Очень редок, зарегистрирован на весеннем пролете. Одна птица неоднократно отмечалась 15–17 июля 2002 г. в черте г. Талица.

Чеглок *F. subbuteo.* Редкий гнездящийся вид. Одно гнездо найдено на территории Талицкой дачи.

Кобчик *F. vespertinus.* Очень редок, гнездится. Один гнездовой участок обнаружен в пределах Талицкой дачи.

Обыкновенная пустельга *F. tinnunculus.* Редка. Одно гнездо найдено в пойме р. Пышмы.

Белая куропатка *Lagopus lagopus.* Редка. Зарегистрирована зимой в пределах Талицкой и Тугулымской дач, на Талицкой даче одиночная птица отмечена в августе.

Тетерев *Lyrurus tetrix.* Немногочисленный гнездящийся вид. Обнаружено 5 токов.

Глухарь *Tetrao urogallus.* Обычен на гнездовании. Автору известны 24 тока.

Рябчик *Tetrastes bonasia.* Обычный гнездящийся вид.

Серая куропатка *Perdix perdix.* Редкий гнездящийся вид. Летом встречены выводки.

Перепел *Coturnix coturnix.* Обычен на гнездовании (Талицкая дача).

Серый журавль *Grus grus.* Редкий гнездящийся вид.

Погоныш *Porzana porzana.* Редок. Возможно, гнездится в пойме Пышмы.

Коростель *Crex crex.* Обычный гнездящийся вид.

Лысуха *Fulica atra.* Редка. Возможно, гнездится.

Бурокрылая ржанка *Pluvialis fulva.* Редка, отмечена весной (пролетающая стая у д. Ретина).

Малый зуек *Charadrius dubius.* Обычный гнездящийся вид.

Чибис *Vanellus vanellus.* Обычен на гнездовании.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus.* Одна птица зарегистрирована весной у с. Уецкое.

Черныш *Tringa ochropus.* Обычный гнездящийся вид.

Фифи *T. glareola.* Обычен. Возможно, гнездится.

Травник *T. totanus.* Редкий, вероятно, гнездящийся вид.

Перевозчик *Actitis hypoleucos.* Обычный гнездящийся вид.

Мородунка *Xenus cinereus.* Редкий гнездящийся вид.

Турухтан *Philomachus pugnax.* Весной в массовом количестве отмечается на пролете, летом одна птица встречена в пойме Пышмы. Возможно, гнездится.

Бекас *Gallinago gallinago.* Обычен на гнездовании.

Дупель *G. media.* Редок. Отдельные птицы встречены осенью на территории Талицкой дачи.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola.* Обычный гнездящийся вид.

Большой кроншнеп *Numenius arquata.* Редок, гнездится. Выводки зарегистрированы в районе д. Мохирево.

Большой веретенник *Limosa limosa.* Редок. Весной пара птиц отмечена у д. Одиной (Талицкая дача).

Озерная чайка *L. ridibundus.* Отмечалась на весеннем и осеннем пролете.

Сизая чайка *Larus canus.* Редкий гнездящийся вид. На протяжении лета 4–5 птиц держатся на оз. Маян.

Серебристая чайка *L. argentatus.* Зарегистрирована на пролете весной и осенью. (Очевидно, автор принимал вид «в широком смысле» — sensu lato. — ***Ред.***)

Черная крачка *Chlidonias nigra.* Весной одна птица отмечена у д. Ретина на старице Пышмы.

Белокрылая крачка *Ch. leucopterus.* Редкий гнездящийся вид. Колония обнаружена у д. Тарасова.

Вяхирь *Columba palumbus.* На гнездовании редок. Два гнезда обнаружены на территории Талицкой дачи.

Клинтух *C. oenas.* Редок, гнездится.

Сизый голубь *C. livia.* Многочислен в населенных пунктах.

Обыкновенная горлица *Streptopelia turtur.* Обычный гнездящийся вид. Два гнезда обнаружены в пределах Талицкой дачи. (См. комментарии в статье В. А. Коровина. — ***Ред.***)

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus.* Обычна на гнездовании.

Глухая кукушка *C. saturatus.* Редка. Токование самцов отмечали в Талицкой даче.

Белая сова *Nyctea scandiaca.* Зарегистрирована в зимний период.

Филин *Bubo bubo.* Очень редкий гнездящийся вид.

Ушастая сова *Asio otus.* Обычный гнездящийся вид.

Болотная сова *A. flammeus.* Редкий гнездящийся вид.

Мохноногий сыч *Aegolius funereus.* Редок, вероятно, гнездится.

Воробьиный сыч *Glaucidium passerinum*. Очень редок. Отмечен в гнездовое время на территории Талицкой дачи.

Серая неясыть *Strix aluco.* Редкий гнездящийся вид.

Длиннохвостая неясыть *S. uralensis.* Обычный гнездящийся вид.

Бородатая неясыть *S. nebulosa.* Очень редкий гнездящийся вид.

Обыкновенный козодой *Caprimulgus europaeus.* Обычный гнездящийся вид.

Черный стриж *Apus apus.* Обычен на гнездовании. Колония обнаружена в 19-м квартале Мохиревского лесничества.

Вертишейка *Jynx torquilla.* Обычный гнездящийся вид.

Седой дятел *Picus canus.* Обычен, возможно, гнездится.

Желна *Dryocopus martius.* Редкий гнездящийся вид.

Пестрый дятел *Dendrocopos major.* Обычный гнездящийся вид.

Белоспинный дятел *D. leucotos.* Редок.

Малый дятел *D. minor.* Обычный гнездящийся вид.

Трехпалый дятел *Picoides tridactylus.* Редок. Встречены самцы в октябре 1996 и ноябре 2002 гг. на территории Талицкой дачи.

Береговая ласточка *Riparia riparia.* Обычна. Постоянные колонии обнаружены по р. Пышме.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica.* Обычна на гнездовании в населенных пунктах.

Воронок *Delichon urbica.* Обычен. В 1996 г. впервые отмечен на гнездовании в г. Талица.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis.* Обычный гнездящийся вид.

Лесной конек *Anthus trivialis.* Обычный гнездящийся вид.

Пятнистый конек *A. hodgsoni.* Взрослая птица поймана в давилку при отлове грызунов 12 июня 2002 г. в Мохиревском лесничестве.

Луговой конек *A. pratensis.* Редкий гнездящийся вид. (Очевидно, сведения ошибочны. — ***В. К.***)

Желтая трясогузка *Motacilla flava.* Обычный гнездящийся вид.

Желтоголовая трясогузка *M. citreola.* Редка на гнездовании в пойме Пышмы.

Белая трясогузка *M. alba.* Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенный жулан *Lanius collurio.* Обычен, гнездится.

Серый сорокопут *L. excubitor.* Редкий гнездящийся вид. Слетки встречены в июле 1995 г., один слеток — 17 июля 2002 г.

Обыкновенная иволга *Oriolus oriolus.* Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris.* Обычен на гнездовании по населенным пунктам, в естественных местообитаниях редок.

Кукша *Perisoreus infaustus.* Редкий гнездящийся вид.

Сойка *Garrulus glandarius.* Обычный гнездящийся вид.

Сорока *Pica pica.* Обычный гнездящийся вид.

Кедровка *Nucifraga caryocatactes.* Редка, гнездится. В Тугулымской даче наблюдается круглый год.

Галка *Corvus monedula.* Обычный гнездящийся вид населенных пунктов.

Грач *C. frugilegus.* Обычный гнездящийся вид.

Серая ворона *C. cornix.* Обычный гнездящийся вид.

Ворон *C. corax.* Обычен, гнездится.

Свиристель *Bombycilla garrulus.* Обычен в период зимних кочевок.

Оляпка *Cinclus cinclus.* В зимний период встречена 1 птица на р. Урга.

Речной сверчок *Locustella fluviatilis.* Редкий, вероятно, гнездящийся вид. Регистрируется в пойме Пышмы.

Обыкновенный сверчок *L. naevia.* Редок. Вероятно, гнездится.

Камышевка-барсучок *Acrocephalus schoenobaenus.* Редкий гнездящийся вид.

Садовая камышевка *A. dumetorum.* Редкий гнездящийся вид.

Зеленая пересмешка *Hippolais icterina.* Редка. По-видимому, гнездится.

Северная бормотушка *H. caligata.* Редка, вероятно, гнездится. Поющий самец встречен 15 июля 2002 г.

Ястребиная славка *Sylvia nisoria.* Очень редкий, вероятно, гнездящийся вид.

Черноголовая славка *S. atricapilla.* Редкий гнездящийся вид.

Садовая славка *S. borin.* Обычна на гнездовании.

Серая славка *S. communis.* Обычный гнездящийся вид.

Славка-завирушка *S. curruca.* Редка. Вероятно, гнездится.

Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus.* Обычный гнездящийся вид.

Пеночка-теньковка *Ph. collybita.* Обычна, гнездится.

Пеночка-трещотка *Ph. sibilatrix.* Редкий гнездящийся вид.

Желтоголовый королек *Regulus regulus.* Обычен на гнездовании.

Мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca.* Редкий гнездящийся вид.

Малая мухоловка *F. parva.* Очень редка, возможно, гнездится.

Серая мухоловка *Muscicapa striata.* Обычна, гнездится.

Луговой чекан *Saxicola rubetra.* Обычный гнездящийся вид.

Черноголовый чекан *S. torquata.* Обычен на гнездовании.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe.* Обычна, гнездится.

Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus.* Обычный гнездящийся вид.

Зарянка *Erithacus rubecula.* Редка, гнездится. В 1998 г. найдены слетки.

Обыкновенный соловей *Luscinia luscinia.* Обычный гнездящийся вид.

Варакушка *L. svecica.* Обычна на гнездовании.

Рябинник *Turdus pilaris.* Обычный гнездящийся вид.

Белобровик *T. iliacus.* Обычный гнездящийся вид.

Певчий дрозд *T. philomelos.* Обычен, гнездится.

Деряба *T. viscivorus.* Редок, вероятно, гнездится.

Длиннохвостая синица *Aegithalos caudatus.* Обычна на гнездовании.

Обыкновенный ремез *Remiz pendulinus.* Очень редкий гнездящийся вид. В пойме Пышмы найдены 2 гнезда.

Буроголовая гаичка *Parus montanus.* Обычный гнездящийся вид.

Московка *P. ater.* Редка, вероятно, гнездится.

Обыкновенная лазоревка *P. caeruleus.* Редка, гнездится.

Большая синица *P. major.* Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенный поползень *Sitta europaea.* Обычен на гнездовании.

Обыкновенная пищуха *Certhia familiaris.* Обычна, гнездится.

Домовый воробей *Passer domesticus.* В большом количестве гнездится по населенным пунктам.

Полевой воробей *P. montanus.* Многочисленный гнездящийся вид населенных пунктов.

Зяблик *Fringilla coelebs.* Обычный гнездящийся вид.

Вьюрок *F. montifringilla.* Редкий гнездящийся вид.

Обыкновенная зеленушка *Chloris chloris.* На гнездовании редка. Отмечены поющие самцы.

Чиж *Spinus spinus.* Редок. Вероятно, гнездится.

Черноголовый щегол *Carduelis carduelis.* Обычный гнездящийся вид.

Коноплянка *Acanthis cannabina.* Очень редка. Возможно, гнездится.

Обыкновенная чечетка *A. flammea.* Регистрируется на осенне-зимних кочевках.

Обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus.* Обычный гнездящийся вид.

Длиннохвостая чечевица *Uragus sibiricus.* Редкий гнездящийся вид. Отмечено строительство гнезда в пойме Пышмы.

Щур *Pinicola enucleator.* Очень редко регистрируется в зимнее время.

Обыкновенный клест *Loxia curvirostra.* Обычен. По-видимому, гнездится.

Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula.* Редок на гнездовании (найдены 2 гнезда), зимой многочислен.

Обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes.* Редкий гнездящийся вид. В августе встречали стайки из старых и молодых птиц.

Обыкновенная овсянка *Emberiza citrinella.* Обычный гнездящийся вид.

Тростниковая овсянка *E. schoeniclus.* Обычна, гнездится.

Дубровник *E. aureola.* Обычен на гнездовании.

Садовая овсянка *E. hortulana.* Обычный гнездящийся вид. (Сведения вызывают сомнения. — ***В. К.***)

Пуночка *Plectrophenax nivalis.* Встречается в зимнее время.

К РАСПОСТРАНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПТИЦ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В. Д. Захаров

Ильменский государственный заповедник, г. Миасс Челябинской области, 456317 E-mail: zakharov@ilmeny.ac.ru

В результате наблюдений, проводившихся в течение полевого сезона 2004 г., были получены сведения, уточняющие границы рас-

пространения некоторых видов птиц на территории Челябинской области.

Красавка *Anthropoides virgo*. Ранее отмечалась только в степных районах области от южных границ до Варненского р-на. Вероятнее всего, залетные особи наблюдались в северной лесостепи на северо-востоке Челябинской области и в окрестностях г. Каменска-Уральского (Кузьмич, 2001; 2002). С начала мая 2004 г. пара красавок постоянно встречалась в южной лесостепи в Октябрьском р-не в окрестностях с. Журавлиного (54°32' с. ш., 62°50' в. д.). Здесь же 6 августа вместе с взрослыми птицами держался нелетный птенец. Это наиболее северная точка достоверного гнездования красавки в Челябинской области.

Большая горлица *Streptopelia orientalis*. Сравнительно обычный вид на востоке области в лесостепных и степных районах. Случаев гнездования в лесных районах не наблюдалось. В Ильменском заповеднике (55°10' с. ш., 60°15' в. д.) воркование самца отмечено 23 мая. Гнездо с 2 яйцами найдено 5 июня на сосне, на высоте около 6 м. Размеры яиц: 32.5 × 25.1 и 32.9 × 24.9. Это наиболее западная гнездовая находка в Челябинской области.

Длиннохвостая чечевица *Uragus sibiricus*. Для Челябинской области урагус является обычным зимующим видом. В Уральском регионе гнездование отмечено гораздо севернее в районе г. Ирбита (Бачурин, 1998). Самая западная гнездовая находка на Урале — западнее Екатеринбурга (Постников, 1998). В этой связи представляет определенный интерес встреча пары птиц в Ильменском заповеднике (55°03 с. ш., 60°05' в. д.), где они держались со второй половины мая по вторую декаду июня. Несмотря на то, что гнездо обнаружено не было, но зафиксированный случай спаривания позволяет предположить гнездование в отдельные годы урагуса на территории Челябинской области.

ЛИТЕРАТУРА

Бачурин Г. Н. Гнездование урагуса в окрестностях Ирбита // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1998. С. 12–13.

Кузьмич А. А. Интересные встречи птиц в Каменске-Уральском и окрестностях // Там же. 2001. С. 122 — 124.

Кузьмич А. А. К орнитофауне севера Челябинской области // Там же. 2002. С. 149–152.

Постников С. Н. Гнездование урагуса на Среднем Урале // Там же. 1998. С. 135.

РЕМЕЗ В ОКРЕСТНОСТЯХ КАМЫШЛОВА

Л. С. Зеленцов

А/я 10, РУПС, г. Камышлов Свердловской области, 624860.

На южной окраине г. Камышлова (около 130 км к востоку от Екатеринбурга) в феврале 2001 г. и в апреле 2002 г. найдены два старых гнезда **ремеза** *Remiz pendulinus*. Они располагались в пойме р. Пышмы, на ивах, и были полностью достроенными, с входной трубкой. Известные места гнездования ремеза в этой части Зауралья находятся южнее (Рябицев, 2001).

ЛИТЕРАТУРА

Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 608 с.

ЗАМЕТКИ ПО АВИФАУНЕ УСТЬЯ РЕКИ ГУБЕРЛИ И ДОЛИНЫ РЕКИ ЧЕБАКЛЫ (ВОСТОЧНОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ)

И. Г. Климова, О. К. Махрова, И. А. Морхова

Орский гуманитарно-технологический институт, пр. Мира, 15-А, г. Орск Оренбургской области, 462403

Приводим наиболее интересные наблюдения из полученных во время небольшой экспедиции в низкогорное Южноуралье (Гайский р-н Оренбургской области), организованной Орским гуманитарно-технологическим институтом в 2004 г.: 21–22 июня — в долине р. Чебаклы (приток р. Губерли) у д. Хмелевка, 23 июня — у д. Казачья Губерля, 24–25 июня — в устье Губерли. Использованы также некоторые сведения из приведенных егерем дома охотника и рыболова, расположенного в устье Губерли.

Малая выпь *Ixobrychus minutus.* В устье р. Губерли 25 июня видели в сумерках летящего над рекой самца.

Скопа *Pandion haliaetus*. Один раз видели летящую над р. Урал скопу.

Краснозобая казарка *Rufibrenta ruficollis.* По рассказам егеря, обычный пролетный вид.

Луговой лунь *Circus pygargus.* В устье Губерли утром и вечером наблюдали самца, высматривающего добычу в высокой траве в понижении между горами.

Европейский тювик *Accipiter brevipes.* В долине р. Чебаклы у д. Хмелевка наблюдали парящего над гористой местностью самца.

Камышница *Gallinula chloropus*. По словам егеря, обычный гнездящийся вид тростниковых зарослей на старице р. Урал.

Стрепет *Tetrax tetrax.* Егерь видел стрепета один раз в конце мая на берегу Урала, со стороны Казахстана.

ДОПОЛНЕНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ПО АВИФАУНЕ ГОРОДА ОРСКА

И. Г. Климова[1], О. С. Сеселкина[2], О. К. Махрова[1], Л. В. Катанова[1], Т. В. Лаврина[1]

[1] Орский гуманитарно-технологический институт, пр. Мира, 15-А, г. Орск Оренбургской области, 462403.
[2] Ул. Стасова, 6, кв. 92, г. Орск Оренбургской области, 462403. E-mail: express2@list.ru

Данное сообщение является дополнением и уточнением нашей предыдущей публикации по орнитофауне г. Орска и его окрестностей (Климова и др., 2003). Наиболее детально в 2004 г. наши наблюдения проводились в юго-восточной части города — пос. Биофабрика на рыборазводном пруду, а также в пойменных лесах города и пригорода. Есть и наблюдения более ранние, 2003 г., о чем с тексте сказано особо.

Чомга *Podiceps cristatus.* Обычный гнездящийся вид. Наблюдали 5 пар с птенцами 6 июля 2004 г. на рыборазводном пруду в пос. Биофабрика.

Черношейная поганка *P. nigricollis.* Гнездится на рыборазводном пруду в пос. Биофабрика. Много пар с выводками видели 6 и 13 июля.

Малая выпь *Ixobrychus minutus.* Улетающую с рыборазводного пруда птицу видели13 июля.

Красноголовая чернеть *Aythya ferina.* Очень большую стаю, покрывшую почти все водное зеркало рыборазводного пруда, видели 17 апреля.

Лысуха *Fulica atra.* Многочисленный гнездящийся вид. Птиц с выводками видели в июле. На рыборазводном пруду 13, 15 августа и 2, 7 сентября держалось более 100 птиц.

Малый зуек *Charadrius dubius.* Обычный гнездящийся вид. Гнездо найдено на галечном пляже в первых числах июня.

Галстучник *Ch. hiaticula.* Стайка птиц примерно из 50 особей зарегистрирована 2 сентября. Птицы кормились у кромки воды.

Чибис *Vanellus vanellus.* Обычный гнездящийся вид. В конце мая 2002 г. на очистных прудах нашли два гнезда, три года подряд на рыборазводном пруду в июле наблюдали молодых птиц.

Камнешарка *Arenaria interpres.* Одну особь в осеннем наряде наблюдали на заболоченных участках у пос. Биофабрика 13 августа.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus.* На галечном пляже р. Урал 1 июня 2003 г. наблюдали одну пару. Птицы беспокоились, кричали, садились на гальку и изображали насиживание. На заболоченных участках у пос. Биофабрика 15 августа 2004 г. видели двух кормящихся у берега птиц.

Турухтан *Philomachus pugnax.* С середины августа до первых чисел сентября стайка держалась на рыборазводном пруду.

Краснозобик *Calidris ferruginea.* На рыборазводном пруду 2 сентября кормились у воды вместе с другими куликами 34 краснозобика. Стайка состояла из молодых птиц с палевым окрасом на груди, белой бровью и белым надхвостьем.

Кулик-воробей *C. minuta.* 2 сентября 29 птиц кормилось вдоль кромки воды, все особи были окрашены в ювенильный наряд (верх тела рыжий с пестринами, низ белый, над глазом заметна небольшая белая бровь).

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*. В пригороде, в пойменном черноольховом лесу, у ручья, 11 апреля встречен один вальдшнеп.

Большой кроншнеп *Numenius arquata.* На рыборазводном пруду 2 сентября встречено 2 птицы.

Большой веретенник *Limosa limosa*. Группы от 2 до 15 птиц встречали на рыборазводном пруду 13–15 августа.

Черноголовый хохотун *Larus ichthyaetus.* Начиная с 6 июля на рыборазводном пруду наблюдали летающих над водой птиц.

Вяхирь *Columba palumbus.* Обычный гнездящийся вид, в последние годы даже многочислен. Во время весенних и летних маршрутов находили гнезда на деревьях и постоянно наблюдали стайки птиц от пяти до пятнадцати особей.

Зимородок *Alcedo atthis*. Вид обычен, часто встречается на р. Урал. Птиц встречали весной, летом и осенью.

Белоспинный дятел *Dendrocopos leucotos.* Самца и самку видели 29 августа в пойменном лесу р. Урал у пос. Никель, 30 августа видели только самку.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis*. Вид многочислен, гнездится в степных окраинах города. Гнездо с 5 яйцами найдено 23 апреля 2003 г.

Белая трясогузка *Motacilla alba.* Вид обычен или многочислен. Встречается у всех водоемов города и пригорода с начала весны до поздней осени. Подтверждено гнездование. У пруда 2 сентября 2004 г. отмечено скопление из 150 пролетных белых трясогузок.

Серая славка *Sylvia communis*. В пос. Новоорск найдено гнездо в зарослях малины.

Ремез *Remiz pendulinus.* В долине р. Б. Кумак (приток Урала) у пос. Новоорск найдено гнездо («рукавичка») в развилке тонких веточек ветлы.

Урагус *Uragus sibiricus*. Два самца зарегистрированы 14 февраля в пойменном лесу р. Урал.

Щур *Pinicola enucleator.* В пойменном лесу р. Урал 14 февраля встречена стайка птиц из 16 особей. Из них 11 имели серую окраску, 4 птицы были окрашены в красный с серым цвета.

ЛИТЕРАТУРА

Климова И. Г., Сеселкина О. С. и др. Материалы по орнитофауне города Орска и его окрестностей // Материалы к распространению птиц на Урале, Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2003. С. 116–123.

ИНТЕРЕСНЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НА ЮГЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 2004 ГОДУ

С. В. Корнев[1], Л. В. Коршиков[2], К. Чепенас[3]

[1] Оренбургский областной эколого-биологический центр, ул. Карагандинская, 110, Оренбург, 460036. E-mail: kornev@mail.oris.ru
[2] Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, Екатеринбург, 620144. E-mail: leonid-k@ipae.uran.ru
[3] Kestutis Cepenas. E-mail: kestutis.cepenas@lv.lt

Все нижеизложенные наблюдения были проведены в административных границах Соль-Илецкого района Оренбургской области.

Кваква *Nycticorax nycticorax.*Одиночного самца кваквы мы наблюдали 4 июня в лесополосе из карагача и лоха серебристого в меловой степи верховьев балки Шыбынды (54°40' с. ш., 54°26' в. д.). При нашем приближении птица слетела с дерева и, крикнув несколько раз, улетела вниз по балке.

Курганник *Buteo rufinus*. При проверке 25 мая гнезда в одном из отрогов балки Шыбынды, занимавшегося птицами в предыдущие годы, было обнаружено, что и в этом сезоне гнездо занято курганниками. На момент осмотра в гнезде было 2 птенца.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. В пойме р. Илек у с. Изобильного (ок. 30 км к юго-западу от г. Соль-Илецка) 1 июля наблюдали хорошо летающую молодую птицу и взрослых с кормом. Позже, со второй половины июля и до середины августа, в этом районе постоянно держался выводок. Мы неоднократно наблюдали молодых и взрослых птиц, а также в утренние и вечерние часы слышали громкие крики орланов.

Тетерев *Lyrurus tetrix*. Ток средней активности слышали почти ежедневно в ранние утренние часы в период с 24 по 30 мая в лесополосе на правобережном плакоре верховьев балки Шыбынды.

Авдотка *Burhinus oedicnemus.* На окраине песчаного массива у с. Буранного (ок. 40 км к юго-западу от г. Соль-Илецка) 2 мая отмечена одиночная птица, проявлявшая сильное беспокойство. Она с криками бегала вокруг наблюдателя, приспуская крылья и притворяясь раненой, но обнаружить гнездо нам не удалось. В песчаном массиве у с. Крутые Горки (ок. 10 км западнее предыдущей точки) 8 июня найдены 2 пуховых птенца возрастом приблизительно 10–12 дней, взрослые птицы приближались к нам на 4–5 м.

Шилоклювка *Recurvirostra avosetta.* Пару с выводком наблюдали в бинокль 9 июня на берегу небольшого соленого лимана в окрестностях с. Новоилецк. Удалось обнаружить только одного птенца, возрастом около 20 дней, в ювенильном оперении с остатками пуха.

Степная тиркушка *Glareola nordmanni.* В окрестностях с. Новоилецк 8 июня обнаружена диффузная гнездовая колония, состоящая, по нашим подсчетам, не менее чем из 60 пар. Поселение располагалось на солончаковых понижениях у мелководных степных лиманов. В этот день найдено 3 гнезда, которые располагались в зарослях низкорослой солянки на границе солончака. В двух из них находились кладки из 3 и 4 яиц, а в третьем — 1 неоплодотворенное яйцо и мертвый пуховичок. Два живых пуховичка найдены затаившимися в полуметре от гнезда. Судя по поведению птиц, которые проявляли сильное беспокойство, у большинства пар были или сильно насиженные кладки или недавно вылупившиеся птенцы.

Филин *Bubo bubo*. На склоне южной экспозиции одного из отрогов в верховьях балки Шыбынды 25 мая найдено гнездо с 3 птенцами (самый взрослый размером с небольшого голубя). Гнездо располагалось в углублении на земле под кустом спиреи. При повторном осмотре гнезда 29 мая самого младшего птенца не было обнаружено; скорее всего, он был заклеван и съеден более взрослыми птенцами или скормлен им родителями из-за недостатка корма.

Степной жаворонок *Melanocorypha calandra.* В течение мая и июня отдельные птицы встречались в степи по правому склону балки Шыбынды. Неоднократно видели взрослых птиц с кормом 19 июня. Целенаправленные поиски гнезда результатов не дали. Вероятно, птицы уже кормили слетков.

Рыжехвостый жулан *Lanius isabellinus*. Одиночную охотящуюся самку наблюдали 24 мая перед заходом солнца в течение двадцати минут в разреженной лесополосе из карагача и лоха серебристого на

правобережном плакоре в верховьях балки Шыбынды. В последующие дни птица не была обнаружена.

НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ К ОРНИТОФАУНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»

В. А. Коровин

Кафедра зоологии Уральского государственного университета; пр. Ленина, 51, Екатеринбург, 620083. E-mail: vadim_korovin@mail.ru

Изучение орнитофауны национального парка «Припышминские боры» в течение длительного времени проводил сотрудник парка А. К. Жуков. Составленный им аннотированный список птиц (опубликован в настоящем сборнике) содержит сведения о 172 видах птиц.

В процессе полевых работ, проводившихся нами на территории парка (в пределах Талицкой дачи) в конце мая — начале июня 2003 и 2004 гг. в рамках программы мониторинга биоты особо охраняемых природных территорий Свердловской области, собраны новые материалы, в той или иной мере дополняющие уже известные ранее сведения по птицам этого района. Обследовались главным образом лесные ландшафты, в гораздо меньшей степени — пойма р. Пышмы. Ниже приводятся данные по видам, не вошедшим в список А. К. Жукова, а также уточняющие статус некоторых присутствующих в списке видов.

Обыкновенная горлица *Streptopelia turtur.* В ходе маршрутных учетов ни разу не зарегистрирована. Если ранее вид был верно определен, остается связывать его отсутствие с наблюдающейся в последние годы глубокой депрессией численности его популяции на Среднем Урале (Коровин, 2001; неопубликованные данные за последние годы), которая, очевидно, в не меньшей степени выражена и далее к востоку, по мере приближения к границе ареала.

Большая горлица *S. orientalis.* Характерный и достаточно обычный вид высокоствольных сосновых и березово-сосновых насаждений. Плотность гнездования, установленная в ходе маршрутных учетов по токующим самцам, составила 0,3–4 особи/км^2. В списке птиц Национального парка отсутствует. Очевидно, причиной пропуска этого вида в предшествующих исследованиях послужило большое внешнее сходство с обыкновенной горлицей, а «песни» — с воркованием вяхиря.

Глухая кукушка *Cuculus saturatus.* Хотя по обилию этот вид и уступает **обыкновенной кукушке** *C. canorus* — в различных лесных био-

топах соответственно 0,7–3 и 3–5 особей/км^2, он вполне заслуживает статуса обычного гнездящегося вида.

Седой дятел *Picus canus.* В ходе учетов за 2 года не зарегистрирован. На этом основании вряд ли может считаться обычным видом. По-видимому, этот дятел встречается спорадически, а численность его колеблется по годам. Весьма актуальным остается для него и подтверждение предполагаемого гнездования.

Пятнистый конек *Anthus hodgsoni.* В сосновых лесах парка — весьма обычный, регулярно гнездящийся вид (17–18 особей/км^2), в процессе учетов четко регистрируется по пению. По-видимому, песня этого вида была не знакома предшествующим исследователям, поскольку вид оказался включенным в список лишь по единственной особи, случайно отловленной в давилку. Возможно, это может служить косвенным свидетельством сравнительно недавнего проникновения вида в южные районы области, что, в частности, хронологически точно зафиксировано для Среднего Урала (Коровин, 2001).

Луговой конек *A. pratensis.* В списке птиц Национального парка указан как редкий гнездящийся вид. Нет почти никаких сомнений, что эти сведения ошибочны. На юге Свердловской области этот вид регулярно встречается в периоды сезонных миграций. Южная граница его гнездового ареала проводится на Урале по заповеднику «Денежкин Камень» (Иванов, 1976) либо по Конжаковскому Камню (Шварц и др., 1951). За время наших исследований не обнаружен. Можно предположить, что в качестве лугового автором списка А. К. Жуковым был принят конек с незнакомой песней (в действительности — пятнистый).

Горная трясогузка *Motacilla cinerea.* Довольно обычный, хотя и не многочисленный, в силу выраженной стенотопности, вид. Неоднократно отмечался по берегам небольших рек, на Ургинском кордоне, территории склада лесопиломатериалов на окраине Талицы и т. п. Нет сомнений, что он был хорошо известен А.К. Жукову, и его пропуск в списке — не более чем досадная случайность.

Садовая камышевка *Acrocephalus dumetorum.* В списке указана как редкий гнездящийся вид. Однако это определение справедливо только для отдельных биотопов, в частности, высокоствольных лесов. В пойменной уреме по р. Пышме, малым рекам и ручьям это один из доминантов и является многочисленным видом (82–132 особи/км^2).

Зеленая пеночка *Phylloscopus trochiloides.* Обычный или многочисленный гнездящийся вид лесных местообитаний (в сосновых лесах — 9–16, в березовых — 4 особи/км^2). В списке А. К. Жукова, очевидно, пропущена случайно.

Желтоголовый королек *Regulus regulus.* Статус «обычный гнез-

дящийся» отражает ситуацию, видимо, только в отдельных биотопах (темнохвойных лесах?). В сосновых насаждениях, не говоря уже о смешанных, за 2 года в ходе учетов этот вид не зарегистрирован — ни по песне, ни по контактным сигналам.

Мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca.* В списке указана как редкий гнездящийся вид. В сосновых, сосново–березовых и березовых лесах она определенно имеет статус многочисленного вида (36–55 особей/км^2).

Садовая овсянка *Emberiza hortulana.* Сведения об этом виде как обычном гнездящемся вызывают сомнения. До сих пор в лесной зоне региона регистрировались только редкие залеты (Шварц и др., 1951; Бобков и др., 1997; Постников, 2000 и др.). В ходе наших работ не зарегистрирована. Возможно, включение этой овсянки в список птиц в качестве гнездящейся также основано на регистрации пения залетных особей.

Таким образом, с учетом сделанных дополнений, список птиц национального парка «Припышминские боры» достигает 174 видов.

ЛИТЕРАТУРА

Бобков Ю. В., Торопов К. В., Шор Е. Л., Юдкин В. А. К орнитофауне южной тайги Западно-Сибирской равнины // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1997. С. 14–21.

Иванов А. И. Каталог птиц СССР. Л.: Наука, 1976. 276 с.

Коровин В. А. Птицы биологической станции Уральского университета // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2001. С. 92–118.

Постников С. Н. Садовая овсянка севернее Екатеринбурга // Там же. 2000. С. 166.

Шварц С.С., Павлинин В.Н., Данилов Н.Н. Животный мир Урала (Наземные позвоночные). Свердловск, 1951. 174 с.

О ВСТРЕЧАХ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕНЬКОВКИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

В. А. Коровин

Кафедра зоологии Уральского гос. университета; пр. Ленина, 51, Екатеринбург, 620083. E-mail: vadim_korovin@mail.ru

Средний Урал целиком охватывается ареалом уральско-сибирского подвида **теньковки** *Phylloscopus collybita fulvescens*, который на западном пределе распространения — в Предуралье — интерградирует

с восточно–европейским подвидом *Ph. c. abietinus* (Степанян, 1990). По другим авторам, всю Западную Сибирь и Урал занимает сибирский подвид *Ph. c. tristis* (Марова, 1991; Марова, Леонович, 1993; Рябицев, 2001). В полосе контакта этих форм встречаются представители обоих подвидов, а также гибридные особи. Межгодовые колебания численности приводят к преобладанию в зоне симпатрии то одного, то другого подвида (Бутьев, Коблик, 1997). Это же явление, по-видимому, лежит и в основе залетов особей этих форм за пределы постоянного ареала.

Указанные формы теньковки отчетливо различаются по песне, которая на слух воспринимается как построенная из повторяющихся односложных колен у *abietinus* и двусложных — у *fulvescens*. В Свердловской области регистрации восточно–европейских теньковок весьма редки (Коровин, 2001). Так, на многолетнем стационаре в Сысертском районе (биостанция Уральского университета, 56°36' с. ш., 61°03' в. д.) за 30 лет наблюдений теньковка с типичной «европейской» песней зарегистрирована лишь однажды — в июне 1999 г. Самец (вероятно, гнездившийся) занимал постоянную территорию в спелом сосновом бору. Еще одна особь, очевидно, пролетная, отмечена 30 апреля 1981 г. в приручьевой уреме на опушке соснового леса. Она исполняла «гибридную» песню — начинала ее с односложных колен, с середины переходя на двусложные.

Заметно чаще восточно–европейская теньковка регистрировалась в Невьянском р-не (в 75 км к северо–западу от предыдущего пункта). За 10 лет, с 1995 по 2004 гг., она отмечена здесь трижды: в мае–июне 2001 г. (одна особь) и в 2004 г. (две — в мае и июне). Птицы пели на постоянных участках и, возможно, гнездились. Кроме того, 18 июля 2004 г. здесь наблюдалась, очевидно, гибридная особь — с комбинацией в песне элементов, характерных для обеих форм. Стенографирование пения в течение 36 мин. позволило выявить следующую картину. Восточно–европейский и уральско–сибирский варианты песни, а также комбинированный, сочетающий в одной песне оба типа колен — односложных и двусложных — исполнялись в близком соотношении, с незначительным преобладанием сибирского типа, составив соответственно 30,4, 38,4 и 31,2 % (n=138). Сибирский напев звучал более сбивчиво, чем обычно, элементы его нередко выстраивались в 4-сложные последовательности, с ударением на последнем слоге: «тиви-дивИть, тиви-дивИть, …», иногда были заметны односложные вставки «тинь». Европейский характеризовался чередованием односложных элементов «тень», «тинь», повторяемых по 2–3 раза на разной высоте: _ _ – – – _ _ _ – – _ _ … Комбинированный вариант начи-

нался с односложных элементов «европейского» типа, сменяясь затем двусложными, либо наоборот. Одна или несколько таких песен обычно предшествовали смене одного варианта песни на другой, реже вклинивались между песнями одного варианта.

ЛИТЕРАТУРА

Бутьев В. Т., Коблик Е. А. Заметки по авифауне юга Республики Коми // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1997. С. 34–37.

Коровин В. А. Птицы биологической станции Уральского университета // Там же. 2001. С. 92–118.

Марова И. М. Гибридизация сибирской и восточно-европейской теньковок в зоне вторичного контакта // Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 1991. Ч. 1. С. 105–107.

Марова И. М., Леонович В. В. О гибридизации сибирской (*Phylloscopus collybita tristis*) и восточноевропейской (*Ph. collybita abietinus*) теньковок в зоне симпатрии // Гибридизация и проблемы вида у позвоночных. М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 147–163.

Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 608 с.

Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны СССР. М.: Наука, 1990. 728 с.

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПТИЦАМИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ЛЕСНОГО

И. Б. Лашук

ЦДТ, объединение «Фауна», ул. Белинского 49, г. Лесной
Свердловской области, 624200. E-mail: lashuk@lib.lesnoy.ru

В данном сообщении приводятся наиболее интересные сведения о встречах с осени 2003 до осени 2004 гг. некоторых видов птиц в окрестностях г. Лесного Свердловской области (58°38' с. ш., 59°50' в. д.). В наблюдениях принимали участие юннаты объединения «Фауна» Центра детского творчества.

Лебедь-шипун *Cygnus olor*. С 20 по 24 мая 5 лебедей держались в верховьях Нижнетуринского пруда.

Осоед *Pernis apivorus*. Найден ослабленный слеток в окрестностях города и принесен в живой уголок экологического центра.

Черный коршун *Milvus migrans*. В 2004 г. часто встречали над городом с 18 апреля по 25 августа.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla.* Наблюдали летящую птицу 8 апреля.

Стервятник *Neophron percnopterus*. Парящую на высоте около 300 м птицу наблюдали 20 апреля над берегом Нижнетуринского пруда. (Мне показали карточку наблюдений с зарисовкой этой птицы. Это мог быть только стервятник. — ***Ред.***)

Ястребиная сова *Surnia ulula*. В середине ноября наблюдали птицу в парке в центре города. Сову одновременно атаковали большие синицы и сорока. Другая (или та же) ястребиная сова была подобрана в середине декабря в лесу в 5 км от города.

Рябинник *Turdus pilaris*. С середины декабря всю зиму большие стаи дроздов (по 60 и более птиц) держались на территории города на яблонях и рябинах. Весной гнезд на контрольной территории было более чем в 3 раза больше, чем в прежние годы.

Дубонос *Coccothraustes coccothraustes*. Всю зиму на территории городских парков встречали стайки по 3–6 птиц. В прежние годы дубоносов в городе мы не отмечали.

НАХОДКИ ЛЕБЕДЕЙ-ШИПУНОВ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ В БАШКОРТОСТАНЕ

А. Ф. Маматов

Кафедра зоологии БашГУ, ул. Фрунзе, 32, Уфа, 450074.
E-mail: mamatovaf@rambler.ru

Известны немногочисленные устные сообщения о встречах лебедей в зимнее время на полыньях некоторых рек Башкортостана (Белая, Бирь, Сакмара). Из них не ясно, к какому виду лебедей относится информация, точные координаты и дальнейшая судьба птиц в течение зимы.

В первой декаде ноября 1968 г. погибший от ранения **лебедь-шипун** *Cygnus olor* из пары был найден близ дер. Салихово Ишимбайского р-на (53°30' с. ш., 56°15' в. д.) и доставлен на биологический факультет БашГУ, чучело экспонируется.

В середине ноября 2000 г. 4 лебедя-шипуна (2 взрослые и 2 молодые птицы) были обнаружены в небольшой полынье на оз. Чебаркуль Абзелиловского р-на (53°20' с. ш. и 58°40' в. д.). Ослабевших от бескормицы птиц отловили местные жители и принесли в индивидуальное подворье. За зиму две птицы погибли, двух следующей весной выпустили на озеро, когда оно очистилось ото льда.

На этом же водоеме в середине ноября 2001 г. в полынье озера держались два молодых шипуна, состояние которых было не лучше, чем у предыдущих. Обе птицы благополучно перезимовали у местного жителя и весной следующего года оказались на озере.

Причины задержки птиц на водоеме не ясны. Возможно, повлияли ранения (явные признаки травм не найдены), болезни, задержка сроков осенне-зимней линьки или что-то другое.

УТКИ НА ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОЕМАХ УФЫ

А. Ф. Маматов

Кафедра зоологии БашГУ, ул. Фрунзе, 32, Уфа, 450074.
E-mail: mamatovaf@rambler.ru

Появление гусеобразных в пределах административных границ населенных пунктов Башкортостана носит регулярный характер. Сведения о зимовке крякв на реках имеются в более ранних публикациях (Сушкин, 1897; Маматов, 1995, 2000, 2002). В большей степени это характерно для городов и сел, расположенных как вблизи стоячих водоемов, так и водотоков, особенно крупных и средних рек. Более показательной в этом отношении является г. Уфа, на территории которой в главную реку республики Белую впадают два самых крупных притока — реки Уфа и Дема. Кроме того, через город, пересекая его с севера на юг, протекает небольшая речка Сутолока. Она местами образует плесы шириной до 30 м.

По пойме этой речки на гнездовании обнаружены **кряква** *Anas platyrhynchos* и **чирок-трескунок** *A. querquedula*, в периоды миграций редко наблюдается **чирок-свистунок** *A. crecca*. Все выводки, обнаруженные по руслу Сутолоки, наблюдались в непосредственной близости от жилых кварталов со строениями малой и большой этажности. Значительно реже кряква выводит потомство даже на небольших заболоченных озерцах и в искусственных запрудах в пределах городских кварталов, примыкающих к не посещаемым людьми территориям (ботанический сад–институт, пруд на границе парка им. Лесоводов Башкирии).

Судя по данным 2003 г., кряква открывает для себя новые внутригородские водоемы. Таковым является оз. Солдатское, расположенное в детском парке им. И. Якутова. Это водоем площадью 2 га карстового происхождения. Форма его овальная, вытянутая, соотношение длины к ширине примерно 2 : 1. По всему периметру тянется мелководная зона шириной от 1–2 до 5–8 м в разных местах. На протяжении 1/5 береговой линии она покрыта разреженными зарослями тростника и рогоза широколистного. На мелководных участках развита низшая растительность (ряска трехдольная, элодея, диатомовые, зеленые и сине-зеленые водоросли), служащая кормом для крякв.

Из неворобьиных птиц ранее были случаи залета на водоем лишь озерных чаек, которые в летнее время появлялись ежедневно в количестве от 5 до 11 особей. В середине октября 2003 г. на озере впервые за многие годы наблюдений встречено 15 крякв (6 самцов и 9 самок). К концу этого месяца число птиц увеличилось до 25, среди них было 10 селезней и 15 уток. В первой декаде октября численность крякв достигла 37 (14 самцов и 23 самки), а неделю спустя сократилась до 26 птиц (соотношение между самцами и самками в целом такое же). К концу третьей декады октября число крякв достигло максимальной цифры 56 экз. и сохранялось вплоть до отлета.

Появление птиц на этом озере, по-видимому, связано с необычно теплой осенью в период отлета. Теплая и сухая осень привлекала в парк много посетителей. Отдыхающие, особенно дети, регулярно подкармливают мелкую рыбу (тугорослая форма серебряного карася, верховка), видимо, занесенную сюда чайками. Возможно, утки нашли новый источник пищи (хлебобулочные изделия, принесенные людьми), а также кормятся водными растениями.

Кряквы покинули озеро 4 ноября, когда установился ледовый покров по всей акватории. Как выяснилось позже, они не улетели на зимовку, а перекочевали на другой водоем в 7–8 км. В середине декабря их обнаружили на пруду площадью 80–100 х 80 м. Этот пруд замерзает не полностью за счет поступления воды городских сбросов и родников. Уток в течение птиц зимы подкармливали хлебом горожане, и 50 крякв благополучно перезимовали. В конце мая 2004 г. на пруду отмечено 9 крякв, среди которых была одна самка с выводком из 6 птенцов. Вся стайка, включая летных птенцов, исчезла с пруда 15–20 июля.

ЛИТЕРАТУРА

Маматов А. Ф. Водоплавающие птицы Южного Урала. Уфа: Изд- во Башкирского гос. ун-та, 1995. 180 с.

Маматов А. Ф. Зимовки кряквы в Уфе // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2000. С. 131.

Маматов А. Ф. Водоплавающая дичь Башкортостана. Уфа: Изд-во Башкирского гос. ун-та, 2002. 92 с.

Сушкин П. П. Птицы Уфимской губернии. СПб, 1897. 331 с.

О ЗИМНИХ ВСТРЕЧАХ НЕКОТОРЫХ ПТИЦ В ГОРОДЕ КУНГУРЕ (ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Д. В. Наумкин[1], А. А. Фуфаева[2], С. В. Чуприянов[1]

[1] Кунгурский краеведческий музей, ул. Гоголя 36, г. Кунгур Пермской области, 617400. E-mail: kungurmuseum@pop.permonline.ru

[2] Пермский государственный педагогический университет, ул. Сибирская 24, г. Пермь, 614990

Зима 2003–2004 гг. отличалась мягкостью и отсутствием сильных морозов. Видимо, этим и объясняется значительное повышение видового разнообразия населения зимующих в городе птиц. Наряду с обычными оседлыми и регулярно зимующими, были отмечены следующие виды.

Кряква *Anas platyrhynchos*. Несколько уток зимовали в полыньях в районе слияния рек Ирени и Сылвы (северо-западная часть города).

Тетеревятник *Accipiter gentilis.* **Перепелятник** *A. nisus.* Одиночные птицы встречены в городском сосняке, где периодически отмечались и в прошлые зимы.

Обыкновенная неясыть *Strix aluco.* Этот вид также был встречен в городском сосняке. На городской территории совы зимуют довольно редко.

Седой дятел *Picus canus.* Одна и та же (по-видимому) птица несколько раз прилетала на кормушку в центре города в январе–феврале 2004 г.

Крапивник *Troglodytes troglodytes.* Самец крапивника был отловлен паутинной сетью 1 декабря 2003 г. в пойменном ивняке у подножия Ледяной горы (сообщение А.А. Пермякова).

Дрозд-белобровик *Turdus iliacus.* Три птицы отмечены 20 января 2004 г. в стае дроздов-рябинников, кормившихся на кустарниках в центре города.

Обыкновенная лазоревка *Parus caeruleus*. Мы видели только птичек, отловленных А.А. Пермяковым паутинной сетью. По его информации, обыкновенная лазоревка нередко встречается зимой в окрестностях города и по его окраинам.

Урагус *Uragus sibiricus*. Маленькие стайки и пары отмечены в пойменных ивняках под Ледяной горой и в парке у входа в Кунгурскую Ледяную пещеру в феврале–марте 2004 г. (последняя встреча — 29 марта 2004 г.). По сообщению А.А. Пермякова, урагусы регулярно зимуют в последние два–три года.

Серый снегирь *Pyrrhula cineracea*. Пара птичек встречена на кустах сирени в центре города в феврале 2004 г. (подпустили вплотную). Еще одну птицу видели в марте в центре Перми.

Дубонос *Coccothraustes coccothraustes.* В феврале и марте дубоносы были обычны по окраинам города везде, где произрастали ягодные кустарники. Три птицы отловлены паутинной сетью 24 марта 2004 г. у Ледяной горы.

Помимо перечисленных, зимой 2003–2004 гг. в Кунгуре встречались или были обычны **грач** *Corvus frugilegus*, **дрозд-рябинник** *Turdus pilaris,* **длиннохвостая синица** *Aegithalos caudatus,* **поползень** *Sitta europaea,* **зяблик** *Fringilla coelebs,* **юрок** *Fringilla montifringilla,* **зеленушка** *Chloris chloris,* **чиж** *Spinus spinus*, **щегол** *Carduelis carduelis*, **чечетка** *Acanthis flammea* (в том числе и светлая тундряная форма), **обыкновенная овсянка** *Emberiza citrinella*. Немногочисленные стаи **свиристелей** *Bombycilla garrulus* появились лишь в марте, а **щуров** *Pinicola enucleator* мы не наблюдали совсем.

ПЕРВАЯ ГНЕЗДОВАЯ НАХОДКА САПСАНА В ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Н. Д. Нейфельд

Печоро-Илычский государственный природный заповедник, п. Якша Троицко-Печорского р-на Республики Коми, 169436. E-mail: pechorazap@komifree.ru

В Печоро-Илычском междуречье, занимающем западный макросклон Северного Урала и часть Печорской низменности, а также на прилегающих территориях **сапсан** *Falco peregrinus* всегда был редким видом (Дмоховский, 1933; Портенко, 1937; Донауров, 1948; Теплова, 1957; Естафьев, 1969, 1977; Нейфельд, 1989; Воронин, 1995; Шепель, 1992; Нейфельд, Теплов, 2000). За последние 25 лет ежегодных стационарных и маршрутных наблюдений за хищными птицами в Печоро-Илычском заповеднике я встретил этого сокола всего 7 раз (в 1984, 1988, 1999, 2003, 2004 гг.). Шесть раз это были одиночные особи и лишь в последнем случае — пара. По ландшафтным районам встречи распределяются следующим образом: 4 — в горном, 1 — в предгорьях и 2 — в равнинном. Большинство регистраций приходится на гнездовое время, две — на период осенних миграций.

До настоящего времени случаи гнездования сапсана для района заповедника не были известны, поэтому мы, как и наши предшественники, относили его к категории возможно гнездящихся лишь на основании летних встреч. Гнездовой статус вида удалось документально подтвердить только в полевом сезоне 2004 г. Жилое гнездо обнаружено 9 августа у истоков Печоры в северной оконечности горного хребта Маньпупунер (62°15' с. ш., 59°18' в. д.). В прошлом здесь неоднократ-

но регистрировали гнездящихся чеглоков, воронов, а также пустельгу, но сапсана отметили впервые. Птицы поселились в старом гнезде ворона, устроенном в небольшой нише на отвесной скальной стенке самого массивного из 9 скальных останцев, стоящих на верхнем плато хребта. Этот останец находится юго-западнее всех остальных, его высота около 26 м. Ниша с гнездом обращена на юго–запад, расположена в 1,5–2 м ниже вершины и практически недоступна. Во время посещений гнездового участка наблюдали пару и одиночных взрослых птиц, из гнезда время от времени раздавался крик птенца. При появлении человека сапсаны вели себя относительно спокойно. Сделав несколько кругов над нами, они улетали в горную тундру. Такое поведение соколов, очевидно, связано с частым появлениям здесь туристов, которых уже многие годы привлекает этот уникальный памятник природы Северного Урала. В окрестностях гнезда, в кустарничковой горной тундре с участками каменных россыпей, найдены останки добытых соколом тундряных куропаток. Численность этого вида в данном сезоне была самой высокой за все время нашей работы. На одном из соседних останцев, в 300 м от сапсанов, успешно гнездилась пара чеглоков.

ЛИТЕРАТУРА

Воронин Р. Н. Сапсан // Фауна европейского Северо-Востока России. Птицы. СПб.: Наука, 1995. Т. 1, ч. 1. С. 101–105.

Донауров С. С. Распространение и питание дневных хищных птиц в Печорско-Ылычском заповеднике // Тр. Печорско-Ылыч. заповедника. М., 1948. Вып. 4. Ч. 2. С. 67–87.

Дмоховский А. В. Птицы средней и нижней Печоры // Бюлл. МОИП. Отд. биол., 1933. Т. 42. Вып. 2. С. 214–241.

Естафьев А. А. Орнитогеографическая характеристика бассейна верхней Печоры // Физиология и экология животных. Сыктывкар, 1969. С. 101–108.

Естафьев А. А. Птицы западного склона Приполярного Урала // Животный мир западного склона Приполярного Урала. Сыктывкар, 1977. С. 44–101.

Нейфельд Н. Д. Редкие хищные птицы в Северном Предуралье // Экология редких, малоизученных и хозяйственно важных животных европейского Северо-Востока СССР. Сыктывкар, 1989. С. 21–28.

Нейфельд Н. Д., Теплов В. В. Птицы юго-восточной части Республики Коми // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2000. С. 132–154.

Портенко Л. А. Фауна птиц внеполярной части Северного Урала. М.; Л., 1937. 240 с.

Теплова Е. Н. Птицы района Печоро-Илычского заповедника // Тр. Печоро–Илычского заповедника. Сыктывкар, 1957. Вып. 6. С. 5–115.

Шепель А. И. Хищные птицы и совы Пермского Прикамья. Иркутск: Изд-во Иркут. ун.-та, 1992. 296 с.

К АВИФАУНЕ ЮГО–ВОСТОКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Н. Д. Нейфельд, В. В. Теплов

Печоро-Илычский государственный природный заповедник, п. Якша Троицко-Печорского р-на Республики Коми, 169436. E-mail: pechorazap@komifree.ru

В 2001–2004 гг. продолжались многолетние орнитологические наблюдения на территории Печоро–Илычского заповедника и в сопредельных районах. В результате последний список авифауны юго–восточной части Республики Коми (Нейфельд, Теплов, 2000) пополнился 4 новыми видами. Также отмечены еще 3 вида, последние регистрации которых относятся к 30–40-м годам прошлого столетия.

Белощекая казарка *Branta leucopsis.* Первая регистрация вида. В верховьях р. Илыч, 2,5 км выше впадения в него заповедного притока Пырсъю, 2 мая 2001 г. зоолог А. Г. Куприянов, хорошо знающий этот вид по исследованиям в арктических районах, наблюдал стаю из 7 птиц, летящих на северо–восток.

Малый лебедь *Cygnus bewickii.* Первая регистрация вида. Зоолог С. М. Сокольский 5 мая 2003 г. встретил стаю из 16 особей, летящих в северо–восточном направлении в верховьях Печоры, в устье р. Кременной. Ниже стаи на высоте около 60 м летел одиночный лебедь–кликун, благодаря чему удалось идентифицировать эти виды по разнице в размерах, а также по голосам.

Кобчик *Falco vespertinus.* В 1930–40-е гг. в районе Печоро–Илычского заповедника отмечался как редкий гнездящийся вид (Портенко, 1937; Донауров, 1948; Теплова, 1957). В период с 1948 г. до начала текущего столетия никто из работавших здесь орнитологов этого сокола не встречал. Одиночная самка кобчика появилась 30 мая 2002 г. на центральной усадьбе заповедника в п. Якша и держалась здесь до вечера. На следующий день ее нашли мертвой на опушке леса. По-видимому, птица погибла от голода, поскольку накануне длительное время отмечалось сильное похолодание с установлением сплошного снежного покрова до 15 см и отрицательными температурами воздуха до –10°С. Масса свежей тушки — 100 г, желудок пустой.

Поручейник *Tringa stagnatilis.* Первая регистрация вида. 12 мая 2004 г. в п. Якша зоолог А. В. Бобрецов наблюдал трех особей, подпускавших человека очень близко. Здесь же 25 мая мы видели одиночную птицу. 13 августа стайку из 4 птиц, кочующих вверх по реке, встретили в верховьях Печоры ниже устья р. Б. Порожной.

Сизоворонка *Coracias garrulus*. Первая регистрация вида. Отмечена в среднем течении Илыча в месте впадения в него Ичет–Ляги.

С 12 июня 2003 г. в течение нескольких дней одиночная птица держалась на кордоне заповедника Усть–Ляга, где ее наблюдали и фотографировали инспектора охраны и группа лесных специалистов из Швеции.

Зимородок *Alcedo atthis.* О единственном случае добычи этого вида в верховьях Печоры в августе 1939 г. упоминает Е. Н. Теплова (1957). Вторая встреча зарегистрирована 16 августа 2003 г. в окрестностях равнинного участка заповедника, в 23 км к юго–западу от п. Якша, на р. Березовка. Местный житель П. А. Соснин (личное сообщение), рыбачивший в этом месте, в течение дня наблюдал, как одиночный зимородок охотился за мелкой рыбешкой. При этом птица несколько раз присаживалась на удочки и торчащие рядом из воды ветки.

Розовый скворец *Sturnus roseus.* Известно о единственном залете этого вида в п. Якша в июне 1948 г. (Теплова, 1957). Одиночная птица отмечена 30 мая 2004 г. в верхнем течении Илыча в 2,5 км выше устья р. Пырсъю. Инспектор охраны заповедника В. В. Лужинский (личное сообщение) наблюдал одиночную кормящуюся птицу у жилья на кордоне Верхняя Ваджега.

ЛИТЕРАТУРА

Донауров С. С. Распространение и питание дневных хищных птиц в Печорско–Ылычском заповеднике // Тр. Печорско-Ылыч. заповедника. М., 1948. Вып. 4. Ч. 2. С. 67–87.

Нейфельд Н. Д., Теплов В. В. Птицы юго–восточной части Республики Коми // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2000. С. 132–154.

Теплова Е. Н. Птицы района Печоро–Илычского заповедника // Тр. Печоро–Илычского заповедника. Сыктывкар, 1957. Вып. 6. С. 5–115.

ИНТЕРЕСНЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. А. Нефедов

Кафедра зоологии Уральского гос. университета, пр. Ленина 51, Екатеринбург, 620083. E-mail: NefedovNA@yandex.ru

В сообщении представлены данные, полученные в ходе учетов птиц в Сысертском районе с 16 апреля по 30 августа 2004 г. Учеты птиц проводились в окрестностях биостанции Уральского госуниверситета (56°35' с. ш. 60°50' в. д.) на постоянных маршрутах, заложенных в поймах рек.

Дроздовидная камышевка *Acrocephalus arundinaceus*. Самца, поющего на постоянной территории в тростниковых зарослях по берегу Усть-Сысертского водохранилища, регулярно встречали с 1 июня до конца июля. Ранее этот вид спорадически отмечали лишь для озер Щучье и Карасье (Некрасов, 1977; Коровин, 2001).

Соловей-красношейка *Luscinia calliope*. Пара (самец и самка) была встречена 1 июня на том же водохранилище. Птицы прилетели со стороны тростниковых зарослей и сели в кусты ив на берегу. Ранее зарегистрирована единственная встреча — самец случайно отловлен в давилку (Коровин, 2001).

Черный дрозд *Turdus merula*. Двух поющих стационарных самцов регулярно встречали по ручью Шатилин Ключ (приток р. Сысерти) на расстоянии 1200 м друг от друга. Первая песня была зафиксирована 21 мая, последняя встреча — 27 июля. Еще один поющий самец отмечен в середине июня на Калиновском ключе (личное сообщение В. А. Коровина). До настоящего времени в окрестностях биостанции отмечали лишь редкие залеты (Коровин, 2001). В пойме р. Каменка в текущем году В. Ю. Банных (личное сообщение) впервые нашел гнездо этого вида.

Урагус *Uragus sibiricus*. Ранее в данной местности неоднократно отмечали кочующих и залетных птиц (Коровин, 2001). Беспокоящиеся самец и самка встречены мной 18 июня в кустах ивы по ручью — притоку р. Исеть, а 1 июля в этом же месте обнаружены три слетка. Птенцы еще плохо летали (перепархивали в кустах), рядом беспокоились родители. Стайка из четырех особей (две взрослых и две молодых) встречена здесь же 23 июля. Поющий самец встречен на Усть-Сысертском водохранилище 23 мая и два кормившихся урагуса самочьей окраски — на поле, прилегающем к водохранилищу, 12 августа. Таким образом, нахождение выводка позволяет считать урагуса гнездящимся в данном районе.

ЛИТЕРАТУРА

Коровин В. А. Птицы биологической станции Уральского университета // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2001. С. 92–118.

Некрасов Е. С. Класс Aves — Птицы. Фауна биологической станции Уральского университета. Учебное пособие. Свердловск, 1977. С. 15–41.

ЗИМНИЕ ВСТРЕЧИ ВЬЮРКОВ И ЗЯБЛИКОВ НА ЮГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. А. Нефедов

Уральский государственный университет, пр. Ленина 51, Екатеринбург, 620083.E-mail: NefedovNA@yandex.ru

В ходе кратковременных визитов в Красноуфимский район (п. Нижняя Сарана) в зимний период 2003–04 гг. зафиксированы встречи птиц в черте поселка и его окрестностях.

Стайка **вьюрков** *Fringilla montifringilla* из 4 самок (или молодых) и 2 самцов кормилась на рябине 28 декабря. На следующий день на дикой яблоне встречена пара вьюрков, в этот же день отмечена стайка из 10 особей (3 самца и 7 самок), это самая крупная стайка из зарегистрированных в зимний период. Вьюрки встречались вплоть до конца периода зимних наблюдений, последняя встреча — 9 февраля. В начале марта уже не обнаружены.

Также были встречены в зимний период **зяблики** *F. coelebs*. На берегу р. Уфы на сухой крапиве 29 декабря кормилась стайка из 5 особей. В километре от п. Н. Сарана, на бесснежном участке по берегу р. Уфы (место выхода ключей), 28 января кормилась самка зяблика.

Вероятной причиной того, что вьюрки и зяблики остались на зимний период, явилась относительно теплая и малоснежная зима. Дополнительной причиной послужил высокий урожай плодов рябины и дикой яблони.

ИНТЕРЕСНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ В РАЙОНЕ САЛЕХАРДА В 2003–2004 гг.

С. П. Пасхальный[1], Д. О. Замятин[2]

[1] Экологический стационар Института экологии растений и животных УрО РАН, ул. Зеленая Горка, 21, г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого авт. округа, 629400. E-mail: spas@lbt.ru

[2] Департамент ИСПИ ЯНАО, ул. Ямальская, 14, г. Салехард Ямало-Ненецкого авт. округа, 629000. E-mail: nauka89@mail.ru

В сообщении приведены наиболее интересные фаунистические наблюдения в Нижнем Приобье (у гг. Салехард, Лабытнанги) и в долине р. Собь (ж.д. станция Красный Камень) в 2003–2004 гг.

Луток *Mergus albellus.* Самец держался 20 июня 2004 г. на старице в пойме р. Собь у ст. Красный Камень.

Чеглок *Falco subbuteo.* Одного сокола наблюдали 20 июня 2004 г. близ ст. Красный Камень.

Стерх *Grus leucogeranus.* По сообщению местных жителей, 21 августа 2004 г. в 10 часов утра на 43 км автодороги Салехард — Аксарка видели двух взрослых стерхов, кормившихся на открытом верховом болоте в лесотундре. Журавлей некоторое время наблюдали с расстояния около 200 м, погодные условия и освещенность были благоприятными для оценки окраски птиц.

Малый зуек *Charadrius dubius.* На территории производственной базы в пойме Оби у г. Лабытнанги 31 мая 2003 г. видели одного кулика, 6 июня 2003 г. и 28 мая 2004 г. здесь держались территориальные пары. На песчаном берегу р. Шайтанка в Салехарде 1 августа 2004 г. наблюдали пару малых зуйков, проявлявших беспокойство.

Камнешарка *Arenaria interpres.* Одна птицы встречена 6 июня 2003 г. в пойме Оби на окраине г. Лабытнанги.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*. Одиночного кулика, пролетевшего в северо–восточном направлении, видели 31 мая 2003 г. у г. Лабытнанги.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola.* Вечером 22 июня 2003 г. на территории ст. Красный Камень видели трех птиц, пролетевших с характерными криками. Здесь же вечером 20 июня 2004 г. зарегистрировали токование одиночной птицы и наблюдали двух пролетевших вальдшнепов.

Бургомистр *Larus hyperboreus*. В Салехарде 8 мая 2004 г. наблюдали 3 птиц, летевших в северном направлении.

Сизый голубь *Columba livia.* В г. Лабытнанги сформировалось вольно живущее поселение голубей, в котором в 2004 г. насчитывали уже более 50 особей. Ночевки и, вероятно, места гнездования располагаются в технических вентиляционных этажах кирпичных зданий, недоступных для осмотра.

Ворон *Corvus corax.* Зимой 2003–04 гг. в Салехарде и Лабытнанги отмечена необычно высокая численность птиц, подобной которой не было за предшествующий 25-летний период наблюдений.

Свиристель *Bombycilla garrulus.* Одну птицу наблюдали 20 июня 2004 г. возле ст. Красный Камень.

Зеленая пеночка *Phylloscopus trochiloides.* На стационаре в г. Лабытнанги самец пел 23 мая — 8 июня 2004 г. Поющего самца встретили 20 июня этого же года в смешанном лесу у ст. Красный Камень.

Черноголовый чекан *Saxicola torquata.* В 2004 г. на окраинах г. Лабытнанги зарегистрирована необычно высокая численность птиц. Не представляли редкости в этом году они и у ст. Красный Камень (встречены три пары).

Синехвостка *Tarsiger cyanurus.* Одиночных поющих самцов встретили 13 и 20 июня 2003 г. в смешанном лесу у пос. Октябрьский и 20 июня 2004 г. — у ст. Красный Камень.

Певчий дрозд *Turdus philomelos.* В смешанном лесу у ст. Красный Камень 20 июня 2004 г. пел самец.

Большая синица *Parus major.* На старом кладбище, заросшем елью, кедром, березой и ивой, в центре Салехарда 29 мая 2004 г. наблюдали поющего самца. Возможно гнездование, поскольку обычно зимующие синицы к этому времени из города исчезают.

Обыкновенный поползень *Sitta europaea.* Двух птиц видели 14 марта 2003 г. на стационаре в г. Лабытнанги.

Зяблик *Fringilla coelebs*. Самец пел на стационаре в г. Лабытнанги 11–30 мая 2003 г.

Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula.* В окрестностях ст. Красный Камень 20 июня 2004 г. отмечены 2 птицы.

НАХОДКА КРАСНОЗОБОЙ ГАГАРЫ НА ЗАПАДЕ БАШКОРТОСТАНА

С. А. Петров[1], В. В. Петров[2]

[1] Ул. Юбилейная, д. 8, кв. 4, с. Бижбуляк, Башкортостан, 452040.
[2] Д. Ермолкино Бижбулякского района, Башкортостан, 452040.

В д. Ермолкино Бижбулякского р-на Башкортостана (ок. 140 км юго–западнее Уфы) 25 октября 2003 г. **краснозобая гагара** *Gavia stellata,* предположительно — молодая, пролетная, по свидетельству местных жителей, залетела в один из деревенских дворов. Она была поймана руками и три дня содержалась в сарае, от пищи и воды отказывалась. После этого птицу отнесли к пруду, где она часа два плавала, ныряла, а затем улетела на юго–восток.

НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГНЕЗДОВАНИЯ ЧЕРНОГО ДРОЗДА В ОКРЕСТНОСТЯХ ВЕРХНЕГО ТАГИЛА

А. Н. Пискунов

Ул. Жуковского, 10, кв. 52, г. Верхний Тагил Свердловской области, 624162.

В июне 1988 г. мне удалось найти гнездо **черного дрозда** *Turdus merula* в окрестностях Верхнего Тагила (Пискунов, 1995). В июне 2002 г. я вновь нашел гнездо черного дрозда неподалеку от места первой находки. Гнездо располагалось на старом пне высотой около 2 м, кладка состояла из 4 яиц.

ЛИТЕРАТУРА

Пискунов А. Н. О редких птицах окрестностей Верхнего Тагила и Висимского заповедника // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1995. С. 62–63.

ЗИМОВКА ЮРКОВ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

А. Н. Пискунов

Ул. Жуковского, 10, кв. 52, г. Верхний Тагил Свердловской области, 624162.

Благодаря необычайно богатому урожаю рябины и теплой зиме 2003–2004 гг., в г. Верхний Тагил зимовало не только много **дроздов-рябинников**, но и **юрки** *Fringilla montifringilla*, чего раньше не отмечалось. Стайку юрков около 20 особей я обнаружил в середине января. Птицы кормились семенами рябины, добывая их из ягод. Иногда вместе с юрками кормились **рябинники** и **свиристели**. Изредка подсаживались **домовые воробьи**, которые тоже пытались добывать семена из ягод, но скоро это бросали. По мере того, как ягод становилось меньше, стайка юрков раздробилась на мелкие группы, которые кочевали по городу в поисках ягод. В 3-й декаде февраля, когда ягод рябины уже не осталось, рябинники перешли на питание яблочками–дичками и ягодами боярышника, а юрки практически исчезли. Мне приходилось встречать только одиночных птиц, которые были заметно ослаблены и пытались кормиться хлебными крошками с голубями. Возможно, часть юрков погибла, другие разлетелись, в том числе к северу. Мне сообщили знающие птиц люди, что в конце февраля юрки появились в окрестностях Североуральска, т.е. более чем на 300 км севернее Верхнего Тагила.

К АВИФАУНЕ ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ

С. В. Попов

Ул. Западная, д. 8-А, кв. 73, г. Каменск-Уральский, 623405.

Изучение птиц проводилось в Каменском р-не Свердловской области и в северной части Кунашакского р-на Челябинской области. В сообщении приводятся данные с 1999 по 2003 г.

Большой крохаль *Mergus merganser*. Пролетная самка встречена на оз. Куракли-Маян 22 апреля 2001 г.

Осоед *Pernis apivorus*. Немногочисленный, возможно, гнездящийся вид. Встречается со второй декады мая по середину августа. В июне

наблюдались брачные демонстрации в осиново-березовых перелесках в окрестностях ж/д станции Разъезд №1 (Каменск-Уральский — Челябинск).

Большой подорлик *Aquila clanga*. Пролетную особь видели в конце апреля 2001 г. над залежами вблизи оз. Куракли-Маян.

Дербник *Falco columbarius*. Редкий вид. Встречено всего 3 пролетные особи (май-июнь).

Кобчик *F. vespertinus***.** Одна особь обнаружена в южной части г. Каменска-Уральского.

Рябчик *Tetrastes bonasia*. Редкий вид. Регулярно встречается только в захламленных пойменных зарослях по долине Синары между д. Чайкина и с. Усть-Багаряк. «Свистящие» рябчики встречены в октябре 2003 г. в осиново-березовом лесу в нескольких километрах к северу от д. Чайкина.

Серая куропатка *Perdix perdix*. Редкий вид. Нерегулярно встречается в лесо-полевом ландшафте по всему району исследований. Встречен выводок во второй половине лета вблизи ж/д станции 31 км.

Малый погоныш *Porzana parva*. Найден мертвый малый погоныш в начале августа на краю тростников у ж/д станции Разъезд №1.

Тулес *Pluvialis squatarola*. На северо-восточном берегу оз. Б. Сунгуль 31 мая 2002 г. встречены 60–70 особей.

Камнешарка *Arenaria interpres*. Там же, где и тулесы, обнаружены 6 пролетных особей.

Ходулочник *Himantopus himantopus*. Нерегулярно встречается на весеннем пролете (апрель–май) на лужах у отвалов алюминиевого завода (южные окраины г. Каменска-Уральского).

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*. Там же, где и ходулочник, встречена 1 особь в конце апреля 2001 г.

Краснозобик *Calidris ferruginea*. Одиночки и пары обнаружены в первой декаде июля и в конце августа — сентябре на лужах у отвалов алюминиевого завода.

Чернозобик *C. alpina*. Стаи численностью в сотни птиц обнаружены на северо-восточном берегу оз. Б. Сунгуль 31 мая 2002 г.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*. Встречался с конца апреля по начало июля в сосняках (с. Исетское), в пойменных зарослях р. Камышенка вблизи ее впадения в Исеть и в осино-березовых лесах в 3 км к западу от станции 31 км.

Средний кроншнеп *Numenius phaeopus*. Пара особей северного подвида встречена в мае 2002 г. на западном берегу оз. Куракли-Маян.

Малая крачка *Sterna albifrons*. Пара малых крачек отмечена во вторую декаду августа 2002 г. — там же, где и предыдущий вид.

Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto*. Пара птиц встречена в начале августа на залежах с перелесками в 5 км к западу от станции 35 км.

Филин *Bubo bubo*. Одна особь встречена в январе 2002 г. в березняках долины Исети в 4–5 км к востоку от Каменска-Уральского.

Ястребиная сова *Surnia ulula*. Встречена в декабре на южной окраине Каменска-Уральского.

Серая неясыть *Strix aluco*. Пара птиц пролетела над отвалами УАЗа в конце июня 2000 г.

Длиннохвостая неясыть *S. uralensis*. Редкий вид. Гнездится в березняках к востоку от Каменска-Уральского. В августе кочует по колкам лесостепи.

Бородатая неясыть *S. nebulosa*. Регулярно гнездится в осиново-березовом лесу между оз. Черное и ж/д станцией 31 км. Каждый год совы занимают новое гнездо канюка. Возможно, гнездится в районе сел Маминское и Исетское.

Козодой *Caprimulgus europaeus*. Одна особь встречена в конце мая 2002 г. на окраине пойменных ивово-ольховых зарослей между Каменском-Уральским и д. Черноскутова.

Зимородок *Alcedo atthis*. В начале августа 2000 г. 1 особь встречена на р. Исеть у д. Давыдова (25 км к востоку от Каменска-Уральского).

Трехпалый дятел *Picoides tridactylus*. Зарегистрирована одна встреча в начале августа в сосняках у д. Давыдова.

Воронок *Delichon urbica*. Постоянная колония существует под перекрытиями моста через Исеть в с. Маминское. Редко встречается в г. Каменске-Уральском. На фасаде автовокзала найдено 3 гнезда.

Степной конек *Anthus richardi*. Несколько особей обнаружены в середине августа на залежах и покосах в 3–5 км к востоку от ж/д станции 35 км.

Горная трясогузка *Motacilla cinerea*. Очень редкий пролетный вид. Поющий самец встречен в начале мая на южной окраине Каменска-Уральского. Одиночки иногда обнаруживаются в августе — начале сентября.

Крапивник *Troglodytes troglodytes*. Пара особей встречена в начале октября в кустах у ручья на южной окраине Каменска-Уральского.

Пятнистый сверчок *Locustella lanceolata*. Обычный вид. Встречается с начала июня по конец августа. На весеннем пролете может быть многочисленным.

Черноголовая славка *Sylvia atricapilla*. Сравнительно обычный пролетный вид. Встречается по пойменным зарослям и березнякам Исети и Синары в конце мая — начале июня.

Пеночка-трещотка *Phylloscopus sibilatrix*. Обычна на послегнездовых кочевках в конце июля — августе.

Таловка *Ph. borealis*. Кочующие таловки иногда встречаются в первой половине августа.

Черный дрозд *Turdus merula*. Редкий на предгнездовых кочевках вид. В конце мая — начале июня встречаются одиночки и пары по долине Исети и Синары.

Белошапочная овсянка *Emberiza leucocephala*. Редкий на предгнездовых кочевках вид (первая половина мая).

Садовая овсянка *E. hortulana*. Редкий вид. Встречалась с июня по конец сентября. В июне у станции Нижняя встречен территориальный самец. В середине августа в 5 км к северо-востоку от этого места встречена группа из 4 овсянок.

ИНТЕРЕСНЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ

С. В. Попов

Ул. Западная, д. 8-А, кв. 73, г. Каменск-Уральский, 623405.

В сообщении приводятся данные, полученные в ходе моего двухмесячного пребывания на территории заповедника «Денежкин Камень» в июне–июле 2002 года.

Чеглок *Falco subbuteo*. В течение июля регулярно наблюдалась охота 1 особи над перевалами хр. Денежкин Камень.

Черный стриж *Apus apus*. Небольшие стайки регулярно наблюдались над г. Чурок.

Черногорлая завирушка *Prunella atrogularis*. Немногочисленный и очень скрытный вид. Поющие самцы встречены в редколесьях Еловского увала и хр. Денежкин Камень в верховьях р. Б. Шегультан.

Речной сверчок *Locustella fluviatilis*. Пение одного самца отмечено в редколесьях Еловского увала 11 июля.

Черноголовая славка *Sylvia atricapilla*. 14 июля в редколесьях Еловского увала встречен поющий самец. После похолодания и снегопада 16 июля черноголовая славка обнаружена в тайге восточного склона Еловского увала.

Пеночка-зарничка *Phylloscopus inornatus*. Немногочисленный вид криволесий. Один поющий самец найден в пойменном ельнике р. Шегультан.

Деряба *Turdus viscivorus*. 1 особь обнаружена на границе тундры и криволесий Кулаковского перевала 21 июля.

Коноплянка *Acanthis cannabina*. Самец встречен 21 июля в березовом криволесье Кулаковского перевала.

Белокрылый клест *Loxia leucoptera*. Стайка из 5–7 особей встречена 18 июня в среднегорной тайге восточного склона Еловского увала.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность И.А. Кузнецовой и В. А. Сысоеву, благодаря поддержке которых состоялось мое знакомство с интереснейшей природой Северного Урала. Отдельное спасибо П. В. Сысоеву, составлявшему компанию во время экспедиции.

ЮРКИ НА ЗИМОВКЕ В ПРЕДУРАЛЬЕ

С. Н. Постников

Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144.

Юрки *Fringilla montifringilla* обнаружены 10 января 2004 г. в пойме р. Данилихи (левый приток Камы) около г. Перми. Два самца и самка ежедневно кормились на рябинах до начала марта. В январе они начинали кормежку в сумерках перед рассветом, заканчивали — через полчаса после наступления темноты. Птицы срывали отдельные ягоды, переносили на асфальт под уличными лампами дневного света, где вышелушивали семена. В конце января к ним присоединились еще два юрка, 4–7 февраля было 10 юрков, а с 11-го периодически прилетали две стайки — 18 и 25 птиц. В первой декаде марта наблюдали юрков на яблонях в других районах близ Перми.

К ФАУНЕ ПТИЦ СИБИРСКИХ УВАЛОВ

В. К. Рябицев[1], А. В. Сесин[2], А. А. Емцев[3]

[1] Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 марта, 202, Екатеринбург, 620144. E-mail: riabits@etel.ru
[2] Географо-биологический факультет Уральского гос. педагогического университета, пр. Космонавтов, 26, г. Екатеринбург, ГСП-135, 620219.
[3] Биологический факультет Сургутского гос. университета, ул. Энергетиков, 14, г. Сургут Ханты-Мансийского авт. округа, 628400.
E-mail: imdia@surguttel.ru

Сибирские увалы представляют собой слабо выраженную возвышенность на севере Западно-Сибирской равнины — на юге Ямало-Ненецкого (ЯНАО) и севере Ханты-Мансийского (ХМАО) автономных округов Тюменской области. Это водораздел между бассейнами рек

Надым, Пур и Таз, впадающих в Обскую и Тазовскую губы, и бассейном Средней Оби.

Вся территория относится к подзоне северной тайги и занимает огромную площадь, на которой лишь в конце XX в. были проведены относительно подробные авифаунистические исследования, причем преимущественно в наиболее доступных местах — в окрестностях железной дороги Сургут — Новый Уренгой. Наиболее интересным в фаунистическом плане было обнаружение в начале 1990-х гг. в междуречье Надыма и Пура тундроподобных верховых плоско-бугристых болот, населенных птицами, характерными для зональных тундр Западной Сибири (Виноградов и др., 1991, 1992). Эти публикации спровоцировали экспедиции специально для обследования соседних территорий, где тоже были найдены виды арктического комплекса (Рябицев, 1998; Рябицев, Тарасов, 1998). Коллегами опубликован еще ряд работ по фауне птиц северной тайги Западной Сибири, которые уточняют распространение многих видов. Наиболее близкие к нашему району обследованные территории — верховья рек Айваседа-Пур и Еркал-Надей-Пур (63°15' с. ш., 78°26' в. д.) на юге ЯНАО (Морозов и др., 2002).

Для экспедиции 2004 г. мы выбрали заведомое «белое пятно» (Рябицев, 2001) к востоку и югу от Ноябрьска, где можно было предполагать наличие подобных же тундроподобных болот, населенных, соответственно, тундровыми птицами. На территории господствует плоский или слабо всхолмленный рельеф. Преобладающая плакорная растительность — сосняки ягельные брусничные (боры–беломошники), большей частью редкостойные, паркового облика. На значительной части этих лесов лишайниковый покров выгорал и находится на разных стадиях восстановления. По долинам речек узкими лентами произрастают большей частью сильно заболоченные смешанные леса с участием или преобладанием темнохвойных пород — кедра (сосны сибирской) и ели. Основные лиственные породы — береза и осина.

Огромные территории междуречий заняты верховыми болотами. Это сосновые рямы, переходящие в плоско-бугристые болота с большим или меньшим наличием мохово-пушицевых мочажин и неглубоких озер. Основная кустарниковая растительность — багульник и мирт болотный, местами обильна карликовая березка.

В районе активно ведется разработка нефтяных и газовых месторождений, которые связаны с «большой землей» сетью шоссейных дорог. От них к «кустам» с качалками проложены грунтовые (песок) дороги, по болотам они специально отсыпаны (тоже песок). Вдоль дорог множество погруженных в грунт трубопроводов. Неизменный элемент ландшафта — линии высоковольтных передач (ЛЭП).

От шоссе ко многим большим (Аган, Ампута) и малым рекам и к рыбным озерам проложены грунтовые дороги, ими активно пользуются любители рыбной ловли и охоты (в «открытые» сроки). Это горожане, многие из которых имеют внедорожный транспорт. Коренное население (ханты, ненцы) практически отсутствует.

Своеобразные местообитания представляют собой участки, оставшиеся после буровых установок или других техногенных воздействий. Это песчаные пустоши, кое-где зарастающие злаками, кустарниками и мелколесьем. В некоторых местах незакрепленные пески, перевеваемые ветром, формируют настоящие дюны, наступающие на болота и лес.

По окраинам г. Радужного, а также вдоль дорог и трубопроводов, довольно много болот, озер, древесно-кустарниковых или луговых местообитаний техногенного происхождения, образовавшихся или видоизмененных в результате подтопления, дренирования, сведения растительности. Таким образом, в районе на больших площадях нарушены климаксовые сообщества, спровоцирован новый сукцессионный процесс, есть довольно много местообитаний, отличных от исходных.

Сроки нашей работы — с 27 мая по 5 июля 2004 г. В нашем распоряжении был «внедорожник» УАЗ–31519. Наличие шоссейных и грунтовых дорог позволило нам побывать в разных местах и обследовать довольно широкий спектр местообитаний. Обследовали территории к северо-востоку, северу и северо-западу от г. Радужного Нижневартовского р-на Ханты-Мансийского округа — в основном территории и окрестности Тагринского и Северо-Варьеганского месторождений, в бассейнах правых притоков р. Аган — речек Мохтикъяун, Логнеяун и Агрнъеган. На крайнем юге обследованной территории находится г. Радужный (62°04' с. ш., 77°23' в. д.) с его ближайшими пригородами. Координаты наиболее восточных пунктов: 62°13' с. ш., 78°10' в. д. (к юго-востоку от Тагринского месторождения) и 62°36' с. ш., 78°26' в. д. (крайний юг Ямало-Ненецкого округа к северо-востоку от Тагринского месторождения). Самая северо-западная точка обследованного района находится на территории Вынгапуровского месторождения в 60–65 км к востоку от г. Ноябрьска (ЯНАО, 63°08' с. ш., 76°30' в. д.). На запад мы добирались до р. Ампута и до Западно-Варьеганского месторождения в 30–35 км к западу от г. Радужного.

В работе нашего полевого отряда принимал участие энтомолог А. В. Рябицев.

* * *

Краснозобая гагара *Gavia stellata*. Довольно редка. По-видимому,

пара гнездилась на больших озерах Тагринского месторождения или несколько южнее, где слышали голоса и видели пролетавших птиц 9–14 июня.

Чернозобая гагара *G. arctica*. В небольшом числе, несомненно, гнездится по всему району исследований. По ночам слышали характерные переклички (до 3 пар), доносившиеся с озер. Группу из 5 кормящихся птиц наблюдали на окраине г. Радужного 1 июля.

Краснозобая казарка *Rufibrenta ruficollis*. Голоса небольшой пролетной стаи слышали в ночь на 28 мая.

Белолобый гусь *Anser albifrons*. Пролетный вид. Основной пролет шел до нашего приезда. Мы видели несколько стай, до 80 птиц, пролетавших на северо-восток в конце мая и первых числах июня.

Гуменник *A. fabalis*. Пара сделала круг и села на озеро на краю верхового болота в среднем течении р. Мохтикъяун 28 мая. Одиночного пролетавшего гуменника видели 2 июня. Хочется надеяться, что это были местные таежные гуменники, гнездование которых достоверно известно несколько южнее, в Юганском заповеднике (Стрельников, Стрельникова, 1998).

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. По-видимому, в небольшом числе гнездятся на наименее посещаемых людьми озерах. Пары попадались нам на протяжении всего периода работ. Одиночные птицы, группы и стаи до 30 особей также встречались время от времени. Скорее всего, не только стайные, но и большинство птиц в парах были негнездящимися, летующими.

Кряква *Anas platyrhynchos*. Немногочисленный гнездящийся вид. С весны регулярно видели пары и одиночных селезней. На мелководной старице р. Агрнъеган 4 июля самка отводила от маленьких пуховичков.

Чирок-свистунок *A. crecca*. Самые обычные из уток. Придерживаются лесных, в основном — пойменных, местообитаний. Найдены гнезда, а в конце июня и июле встречено несколько выводков.

Свиязь *A. penelope*. Зарегистрировано всего несколько встреч пар в конце мая и начале июня. Видимо, для этого вида на обследованной территории нет достаточно широких открытых пойм.

Шилохвость *A. acuta*. Обычны на более-менее открытых водоемах. Найдено 2 гнезда — на верховом болоте и в примыкающем смешанном лесу.

Широконоска *A. clypeata*. Весной несколько раз встречали пары и одиночных самцов. Гнездо с явно неполной кладкой из 4 яиц найдено 29 мая в пушицевой кочке на большом верховом болоте с озерами и отдельными низкорослыми деревьями.

Хохлатая чернеть *Aythya fuligula*. Немногочисленна. Регулярно встречали пары и одиночных птиц на различных открытых водоемах по всей обследованной территории. Гнездо с 8 ненасиженными яйцами найдено на островке посреди небольшого озера, рядом с гнездом полярной крачки. В июле встречали беспокоившихся самок.

Гоголь *Bucephala clangula*. Обычный гнездящийся вид. Пары и одиночных птиц часто встречали на различных озерах и реках, в том числе мелких, по всей обследованной территории. Найдено 2 гнезда в бору-беломошнике, оба они располагались в естественных, открытых сверху, дуплах высоких пней на высоте 1,4 и 2 м. Неоднократно встречали беспокоившихся самок.

Синьга *Melanitta nigra*. Довольно обычная утка верховых болот с озерами. Чаще всего встречали пары и одиночных самцов. Несомненно, гнездятся, хотя формальных подтверждений этого мы не получили. В середине июня наблюдали, как к самцу на одном из озер откуда-то с редкостойного ряма — видимо, с гнезда — приходила самка, они кормились вместе, затем самец опять оставался один.

Луток *Mergus albellus*. На озере в «тундре» 31 мая видели одиночного самца. Еще одного самца встретили на озере вблизи автострады 14 июня. Самка встречена 27 июня.

Длинноносый крохаль *M. serrator*. На одном из больших озер Тагринского месторождения 14 июня на песчаном мелководье кормились 4 длинноносых крохаля в самочьем наряде.

Скопа *Pandion haliaetus*. Пару скоп видели над верховыми озерами 8 июня. При автомобильном обследовании системы больших озер по правобережью среднего течения р. Агрнъеган 3 июля обнаружили гнездо (62°18' с. ш., 77°35' в. д.) на берегу этой речки. Одна птица беспокоилась, другая затаилась на гнезде, затем слетела ненадолго и села обратно, когда наблюдатель был всего в сотне метров. Гнездо не осматривали. Оно было устроено на вершине высокого сухого кедра, с которого все сучья, кроме самых верхних, были спилены когда-то, очевидно, браконьерами — «шишкарями».

Черный коршун *Milvus migrans*. На свалке г. Радужного, в 9 км к северу от города, в конце июня и начале июля мы видели по 1–2 коршуна, которые держались там в компании ворон и чаек. Работник этого «полигона твердых бытовых отходов» сказал, что видел до 5 этих «орлов» одновременно. Одиночных коршунов мы видели еще несколько раз неподалеку от города, самые дальние встречи — около 30 км к северо-востоку. Свидетельств в пользу гнездования нет, хотя это представляется нам вполне вероятным. Где-то на этих широтах проходит северная граница гнездования вида в Западной Сибири.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. Единственная встреча: пролетавшего самца видели 2 июня.

Степной лунь *C. macrourus*. Оказался относительно обычным видом. Регулярно встречали охотящихся птиц в открытых местообитаниях в разных частях района исследований. Гнездо с 5 свежими яйцами нашли 2 июня на сосновом ряме у высоковольтной линии (62°13' с. ш., 78°08' в. д.). У гнезда беспокоились самец и самка, гнездо располагалось на мху между кочек, 7 июня в кладке было также 5 яиц. Есть основания предполагать гнездование степных луней еще в двух местах — на Вынгапуровском месторождении в ЯНАО (63°08' с. ш., 76°32' в. д.) и у р. Агрнъеган (62°16' с. ш., 77°34' в. д.). В каждом из указанных мест в конце июня и в начале июля на тундроподобных верховых болотах неоднократно видели самца и самку. Таким образом, степной лунь впервые найден, притом на гнездовании, в ХМАО. Видимо, продвижение ареала этого вида на север (Шепель и др., 1998) вплоть до южных тундр (Морозов, 1998) имеет характер масштабной экспансии.

Перепелятник *Accipiter nisus*. У среднего течения р. Мохтикъяун, практически в одном и том же месте, 30 мая и 11 июня видели пролетавшего самца.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Пара взрослых орланов кружила 5 июня в районе р. Мохтикъяун. Еще одну пару видели 23 июня над р. Логнеяун. Взрослый орлан пролетал, кружа, в 10 км севернее г. Радужного 4 июля.

Сапсан *Falco peregrinus*. Птицу во взрослом наряде отметили пролетавшей в районе Тагринского месторождения у границы ЯНАО и ХМАО 29 мая.

Чеглок *F. subbuteo*. Пролетавшего чеглока наблюдали немного севернее г. Радужного 28 мая. В окрестностях р. Мохтикъяун 11 июня чеглока видели дважды. Когда мы обследовали верховое болото на Вынгапуровском месторождении в 60 км восточнее Ноябрьска, со стороны приречного темнохвойного леса, что был в полукилометре, прилетел чеглок, покружил над нами и улетел обратно.

Дербник *F. columbarius*. Гнездо с 5 средне насиженными яйцами обследовано 13 июня в угнетенном сосняке среди озер Тагринского месторождения (62°17' с. ш., 78°11' в. д.). Пара использовала старое воронье гнездо на высоте 5 м, беспокоились обе взрослые птицы. В высокоствольном сосняке в 17 км к северо-востоку от Радужного 22 июня слабо беспокоился самец, гнезда мы не нашли. Пролетавшего самца видели на территории Вынгапуровского месторождения 25 июня.

Кобчик *F. vespertinus*. Регулярно встречали кобчиков в окрестнос-

тях р. Мохтикъяун с первых чисел июня. В высокоствольном сосняке ягельном рядом с верховым болотом и ЛЭП 3–4 июня наблюдали пару — ухаживание и спаривание. В этом лесу были старые деревья с дуплами, что, по-видимому, и привлекло кобчиков. В 350 м от этого места (62°13' с. ш., 78°09' в. д.) 7 июня осмотрели гнездо с 3 свежими яйцами. Гнездо было устроено в трухлявой сосне на высоте 5 м, в дупле, сделанном когда-то, очевидно, желной (леток 8 × 12 см), но дупло, как и все дерево, с тех пор существенно разрушилось, труха насыпалась сверху, так что насиживающая птица сидела чуть ниже края летка. При повторном осмотре через неделю в дупле было по-прежнему 3 яйца, с гнезда слетел, как и в первый раз, самец. Еще одно гнездо кобчики устроили посреди озер на обширном верховом болоте с отдельными деревьями, в 1,5 км от описанного выше гнезда. Здесь пара облюбовала старое воронье гнездо на небольшом кедре, почти на вершине, на высоте 6 м. Это гнездо было недоступно для осмотра, пару при посещениях в первой половине июня видели рядом, наблюдали ухаживание и попытки спаривания. Ухаживание еще одной пары наблюдали в высокоствольном сосняке 12 июня примерно в 1 км от каждого из этих гнезд, но в последующие дни кобчиков там не видели. На территории ЯНАО кобчиков не встречали, так же как и у речек Логнеяун и Агрнъеган.

Обыкновенная пустельга *F. tinnunculus*. Пара пустельг проявляла слабое беспокойство на границе ряма и пойменного темнохвойного леса на ручье Саен–Тах, притоке Мохтикъяуна. Неподалеку нашли старое гнездо (похоже, кедровки) на кедре. Возможно пара присматривала место для гнезда, но в последующие несколько посещений этого места пустельг там не находили.

Белая куропатка *Lagopus lagopus.* На тундроподобном болоте у р. Мохтикъяун в начале июня по ночам временами слышали токование. Это единственное свидетельство наличия вида в исследованном районе в гнездовое время, если не считать нескольких найденных перьев летнего наряда. В зимнее время белые куропатки здесь более обычны, о чем можно судить по зимним перьям, которые находили неоднократно. По-видимому, эти останки принадлежали куропаткам более северного происхождения, когда они прилетали в зимнее время. Скорее всего, на менее доступных для людей тундроподобных болотах белых куропаток в районе исследований можно встретить чаще.

Тетерев *Lyrurus tetrix.* Из курообразных наиболее обычен, хотя по встречаемости следует отнести к малочисленным. До середины июня регулярно слышали токование. В большинстве случаев самцы токо-

вали поодиночке, несколько раз мы подходили к «токам» из 2–3 самцов. Гнезд и выводков не находили.

Глухарь *Tetrao urogallus.* В одном месте встретили следы глухарки на песке, несколько раз находили зимний помет из хвои. Самих глухарей не встречали.

Рябчик *Tetrastes bonasia.* Ситуация примерно та же, что с глухарем, самих рябчиков не встречали, находили зимний помет.

Перепел *Coturnix coturnix.* У нашей стоянки возле р. Мохтикъяун слышали перепела только ночью и утром 12 июня.

Серый журавль *Grus grus.* В окрестностях р. Мохтикъяун в конце мая — начале июня неоднократно, обычно ранним утром, слышали крики одной пары журавлей. Еще одну пару слышали в июне у р. Логнеяун. Судя по карте, обе пары держались на обширных труднодоступных болотах.

Погоныш *Porzana porzana.* Неактивное токование было слышно с поймы ручья Саен–Тах 10–11, 14 и 15 июня.

Тулес *Pluvialis squatarola.* Специальное обследование верховых болот с целью поиска гнездящихся тулесов результатов не дало. Пролетных птиц несколько раз наблюдали на одном из верховых болот 1–3 июня. Это были небольшие группы и стаи до 14 птиц — самцов и самок, всегда в компании с чернозобиками или другими куликами.

Малый зуек *Charadrius dubius.* Одного зуйка, выражавшего слабое беспокойство, встретили 1 июля при обследовании окраин г. Радужного на пологом песчаном, слегка захламленном берегу одного из озер. Подозреваем, что пара гнездилась, но им помешали люди, которые купались и загорали здесь в предыдущие жаркие дни. Гнездо с 4 яйцами нашли 2 июля у Северо-Варьеганского месторождения, в 24 км севернее г. Радужного, на зарастающей редкой травой и кустами песчаной пустоши, среди озер, где раньше была буровая установка. Птенцы вылупились 5 июля.

Галстучник *Ch. hiaticula.* Несколько раз регистрировали по голосу в начале июня, когда был активный пролет других куликов. Пара галстучников беспокоилась 1 июля на том же пляже на окраине Радужного, где был малый зуек. Попытки выследить птиц и найти гнездо остались безуспешными. Мы предполагаем, что галстучники, как и малые зуйки, гнездились или пытались гнездиться на берегу озера, но неудачно. Ближайшее известное место гнездования галстучника найдено сравнительно недалеко к северо-западу — в окрестностях г. Муравленко (Рябицев, 1998).

Чибис *Vanellus vanellus.* На осоковом болоте у окраины г. Радужного 9 июня наблюдали пару чибисов, которые активно гоняли сизых

чаек. Одиночная птица встречена 17 июня на верховом болоте в районе р. Логнеяун.

Камнешарка *Arenaria interpres.* Характерный голос камнешарки слышали 7 июня, когда был пролет северных куликов.

Черныш *Tringa ochropus.* Судя по регулярным встречам токующих и беспокоящихся птиц, черныши в небольшом числе гнездятся по облесенным рекам и речкам.

Фифи *T. glareola.* Самый обычный из куликов. Гнезда и выводки найдены на реках и тундроподобных болотах с мочажинами и озерами, по более–менее открытым участкам пойм. Беспокоящихся птиц встречали также на различных заболоченных участках по окраинам г. Радужного.

Большой улит *T. nebularia.* Обычен и, несомненно, гнездится, хотя гнезд и выводков мы не находили. Большие улиты токовали и активно беспокоились на всех без исключения верховых болотах, а в поймах — при наличии открытых участков.

Щеголь *Tringa erythropus.* Голоса и фрагменты токования явно пролетных щеголей слышали 29 мая и 7 июня. У озер на Тагринском месторождении (62°17' с. ш., 78°11' в. д.) 13 июня слышали токование щеголя — единственный повод предполагать гнездование в обследованном районе.

Перевозчик *Actitis hypoleucos.* Обычен практически на всех малых реках и реках Аган и Ампута. Гнездо с 4 ненасиженными яйцами найдено 16 июня, скорее всего — повторное. Начинающий оперяться птенец пойман 2 июля.

Мородунка *Xenus cinereus.* На малых реках встречали всего несколько раз, и нигде — дважды. Очень обычными мородунки были на реках Аган и Ампута, в том числе в черте г. Радужного. Токующих птиц встречали на озерах среди верховых болот и на водоемах техногенного происхождения. Пару с маленькими пуховичками встретили 2 июля у небольшой лужи с редкой пушицей и кустами ив на техногенной песчаной пустоши среди верховых озер.

Турухтан *Philomachus pugnax.* Пролетные стаи до 25–30 самцов и самок отмечали в конце мая — начале июня. Тока до 15 самцов регистрировали на верховых болотах в эти же дни. После 7 июня самцов не встречали. Найдено 3 гнезда (одно из них — с 6 яйцами), все — на верховых болотах с озерами. В начале июля встречали самок, беспокоившихся, очевидно, у выводков.

Кулик-воробей *Calidris minuta.* В начале июня, когда была наиболее активна миграция куликов, несколько раз видели стайки мелких песочников до 10–15 птиц. Дважды — 5 и 6 июня — удалось точно определить куликов-воробьев.

Длиннопалый песочник *C. subminuta.* По-видимому, в небольшом числе гнездится по всей рассматриваемой территории. Все встречи приурочены к обширным верховым болотам с озерами, осоково-пушицевыми мочажинами и топями, где слышали по одному, редко — двух токующих самцов одновременно. Несколько раз наблюдали кормящихся длиннопалых песочников, в том числе пары, видели спаривание. Но гнезд найти не удалось. Токующих самцов встречали с 29 мая до середины июня, когда токование, постепенно ослабевая, прекратилось. Насколько известно (Томкович, 1984), у этого вида насиживают кладки и водят птенцов самцы, так что во второй половине периода наших работ низкая токовая активность длиннопалых песочников вполне объяснима. Очевидно, из-за нее мы нередко пропускали этих малозаметных птиц при обследовании их местообитаний.

Белохвостый песочник *C. temminckii.* Возможно, в стаях мелких песочников были птицы этого вида, но остались не определенными.

Краснозобик *C. ferruginea.* В одной из стай пролетных куликов, кормившихся на верховом болоте 3 июня, разглядели трех краснозобиков. Возможно, их было больше.

Чернозобик *C. alpina.* Встречены только на пролете 2–3 июня — несколько стаек от 2 до 15 птиц, во всех случаях — вместе с другими куликами, на открытом верховом болоте. Специальные поиски и прослушивания в гнездовое время результатов не дали.

Гаршнеп *Lymnocryptes minimus.* Над некоторыми большими верховыми болотами регистрировали токование: у Тагринских озер близ границы ЯНАО и ХМАО (62°25' с. ш., 78°10' в. д.) — 29 мая, немного юго-западнее (62°20' с. ш., 78°00' в. д.) — 10 июня. У р. Агрнъеган (62°16' с. ш., 77°35' в. д.) гаршнепа слышали три ночи подряд — с 2 по 4 июля. Токование, особенно в разгар лета, позволяет предполагать гнездование.

Бекас *Gallinago gallinago.* Обычен. Токующих бекасов чаще всего встречали в заболоченных местообитаниях с антропогенным влиянием, где были заросли пушиц и осок, в негустых заболоченных лесах, реже — на верховых болотах. Несомненно гнездование, хотя гнезд не найдено.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola.* Очевидно, в этой части северо-таежной Западной Сибири вальдшнепа нет, хотя есть предположения о гнездовании гораздо севернее (Покровская, 1998). За все время экспедиции не было ни одной регистрации «тянущего» самца. Ближайшее место, где мы слышали вальдшнепа (единственного за вечер), это на пути к району исследований, у р. Варнъеган (61°33' с. ш., 77°23 в. д.), около 50 км к югу от г. Радужного, 25 мая.

Большой кроншнеп *Numenius arquata.* Малочисленный вид, гнездится на тех же верховых болотах, что и средний кроншнеп. В бассейне средней части р. Мохтикъяун, включая его приток Саен–Тах, на территории Тагринского месторождения обнаружены 4 пары, пара — в низовьях р. Логнеяун, еще пара — в среднем течении Агрнъеган у Северо-Варьеганского месторождения. На примере этих находок можно приблизительно оценить гнездовую плотность: на пару приходится 3–6 км^2 верховых болот с озерами, мочажинами и редкими деревьями. Некоторые беспокоившиеся птицы вылетали на песчаные пустоши, голые берега озер и даже на довольно оживленные шоссе, так что трудно говорить о биотопической привязанности этого вида более определенно. На большинстве обследованных болот большие кроншнепы отсутствовали. Одну беспокоившуюся пару встретили у р. Ампута несколько южнее Западно-Варьеганского месторождения. При выслеживании одной из пар 20 июня в районе среднего течения р. Мохтикъяун пойман 1–2-дневный птенец.

Средний кроншнеп *N. phaeopus.* Обычный гнездящийся вид верховых болот и разреженных рямов, где есть озера. Локальная плотность примерно та же, что для большого кроншнепа, 2–5 км^2 на пару, но средние кроншнепы были найдены почти на всех участках указанного выше облика. Найдено 2 гнезда, вылупление птенцов происходило в них 17 и 27–28 июня.

Большой веретенник *Limosa limosa.* На верховом болоте у р. Мохтикъяун держалась пара, самец регулярно токовал, обе птицы активно гоняли чаек и ворон. Гнездо с 4 ненасиженными яйцами нашли 5 июня на моховом островке на озере (62°13' с. ш., 78°10' в. д.). На следующий день гнездо обнаружили разоренным, после чего пара исчезла. Эта гнездовая находка большого веретенника — самая северная в междуречной части севера Западной Сибири. Неподалеку от того места 15 июня встретили сразу 5 беспокоившихся птиц. В 6 км к востоку от р. Логнеяун 17 и 22 июня отмечали токующего самца. Там же пара веретенников гоняла чаек и ворон 24 июня.

Малый веретенник *L. lapponica.* Пара оседло держалась на том же болоте, что и пара больших веретенников, мы регулярно регистрировали токование, активное беспокойство и преследование чаек и ворон, но гнезда найти не удалось. Одного беспокоившегося самца встретили на верховом болоте 20 июня примерно в 15 км юго-западнее. Группу из 3 пролетных, видимо, неполовозрелых («серых») малых веретенников видели на мелководной мочажине 3 июня.

Халей, или восточная клуша *Larus heuglini.* Гнездятся одиночными парами на озерах, где встречали беспокоившихся птиц, издали

видели халеев, сидящих на гнездах на островках. Обычны и негнездящиеся птицы разного возраста. Около 3–4 сотен их держалось на свалке г. Радужного в первых числах июля, а скоре всего — с весны до осени.

Сизая чайка *L. canus.* Обычный гнездящийся вид верховых болот с озерами. Колоний мы не находили, все гнездящиеся и предположительно гнездящиеся чайки держались обособленными парами. Гнездо с 3 свежими яйцами осмотрено 29 мая. Регулярно встречали негнездящихся птиц разного возраста. Несколько сотен их было в начале июля на свалке г. Радужного.

Речная крачка *Sterna hirundo.* Нет ни одной достоверной регистрации, хотя мы были готовы к встрече этого вида, особенно в широкой пойме р. Аган. Ближайшие места, где мы встречали речных крачек — долина Оби у Нижневартовска и Сургута.

Полярная крачка *S. paradisaea.* Обычна на гнездовании на верховых болотах с озерами по всей обследованной территории. Найдено несколько гнезд с 2 и 3 яйцами. Они располагались на островках, реже — на мысках берегов озер. Все это были одиночные пары.

Сизый голубь *Columba livia.* Обычны в городах Радужный и Ноябрьск.

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus.* Обычна в самых разных местообитаниях.

Глухая кукушка *Cuculus saturatus.* Обычна, но несколько малочисленнее обыкновенной кукушки. Кукование слышали почти исключительно в смешанных лесах с темнохвойными породами по долинам речек.

Болотная сова *Asio flammeus.* Единственный встреченный вид сов. Обычны, предположительно гнездились. В различных открытых местообитаниях неоднократно слышали токование, почти ежедневно встречали охотящихся птиц, видели сов, несущих в когтях полевок.

Черный стриж *Apus apus.* Почти всюду после 2 июня видели стрижей над лесом — до 6–8 птиц одновременно. Над пойменным лесом р. Аган немного западнее г. Радужного 3 июля реяли около 20 стрижей. В сосняке брусничном у р. Легнеяун (62°08' с. ш., 77°48' в. д.) 26 июня обследовали старое дупло пестрого дятла в сосне на высоте 4 м, в которое залетали стрижи. В дупле оказалось 2 яйца и взрослая птица, которая не вылетела, несмотря на наши манипуляции с лестницей и дуплоскопом. Это самая северная достоверная регистрация гнездования черного стрижа в Западной Сибири.

Вертишейка *Jynx torquilla.* Поющих самцов встречали в участках смешанных лесов у речек и ручьев 9, 12 и 18 июня, 4 июля. Хотя не

найдено ни одного места, где вертишейки держались бы постоянно, гнездование нам представляется очень вероятным.

Желна *Dryocopus martius.* Желн мы не видели и не слышали ни разу, но нашли несколько дупел, которые могли выдолбить только они.

Пестрый дятел *Dendrocopos major.* Единственный встреченный нами вид дятлов, обычен или многочислен, особенно в сосняках ягельных. Дупло с 6 яйцами обследовано 7 июня. Найдено много жилых дупел, где с середины июня кричали подраставшие птенцы. Дупло в сосне с кричащими птенцами, которых кормили родители, мы видели 23 июня в центре г. Ноябрьска, напротив здания городской администрации. В начале июля, после долгого периода низкой демонстративной активности, дятлы снова начали активно барабанить.

Береговая ласточка *Riparia riparia.* Мы работали в основном в местах, где не было откосов, удобных для гнездования береговушек. Высоко над рямом 10 июня летали 30–40 ласточек, видимо, пролетных, которые вскоре исчезли. Позднее береговушек несколько раз видели в разных местах, а у окраины г. Радужного 1 июля осмотрели колонию из 150–200 внешне жилых норок. Она располагалась в старом песчаном карьере неподалеку от озер и болот, куда птицы в основном и летали кормиться.

Лесной конек *Anthus trivialis.* Довольно обычен в различных лесных местообитаниях, преимущественно по опушкам, верховым болотам с хотя бы отдельными деревьями, по рямам с озерами. Гнездо с 4 начинающими оперяться птенцами и неоплодотворенным яйцом найдено 26 июня на заросшем травой песчаном берегу озера у опушки сосняка ягельного.

Пятнистый конек *A. hodgsoni.* Примерно столь же обычен, как лесной конек, поющих самцов этих видов нередко встречали по соседству — по опушкам. Пятнистые предпочитали более сомкнутые древостои, негустой лес — преимущественно у речек. Больше всего поющих самцов встречали на границах густых пойменных лесов и сосняков ягельных, либо рямов. Гнезд не нашли, но беспокоившихся коньков и птиц с кормом встречали неоднократно.

Луговой конек *A. pratensis.* В целом обычен, но распространен очень неравномерно. На некоторых верховых болотах с отдельными деревьями и озерами, где были также лесные коньки, держалось по соседству по несколько пар луговых коньков. В таких местах нашли 2 гнезда. При обследовании других верховых болот подобного облика луговых коньков вообще не нашли. Наиболее восточная точка гнездования из найденных нами имеет координаты 62°13' с. ш., 78°10' в. д. Это одна из нескольких достоверно известных самых восточных мест

гнездования вида, найденных в последние годы (Головатин, 2001; Виноградов, 2002).

Желтая трясогузка *Motacilla flava.* В целом обычный, местами многочисленный вид верховых болот с озерами и мочажинами. Распространение неравномерное, на ряде болот найдены единичные пары или вид не обнаружен вовсе. Гнездо с 7 средне насиженными яйцами осмотрено на высохшем (дренированном) ряме 13 июня. Желтых трясогузок было много и на трансформированных болотах по окраинам г. Радужного, а также на песчаных пустошах, если рядом были озера или болота. Все встреченные птицы имели облик, характерный для северного подвида *M. f. thunbergi* (по Степаняну, 2003), или формы *plexa* (по Редькину, 2001).

Желтоголовая трясогузка *M. citreola.* Пара желтоголовых трясогузок встречена 28 мая на верховом болоте у р. Мохтикъяун. Очевидно, это были пролетные птицы.

Горная трясогузка *M. cinerea.* Довольно обычны по таежным речкам. Встречались также в антропогенных местообитаниях, где было хотя бы немного открытой воды. Пары встречались практически у каждого моста через реки, на захламленных техногенных площадках среди леса. В крутом берегу р. Логнеяун под нависшим дерном 10 июня нашли гнездо с 6 насиженными яйцами.

Белая трясогузка *M. alba.* Обычна в городах Радужный и Ноябрьск, в вахтовых поселках, у всевозможных технических сооружений, а также в «диких» местообитаниях с полуокрытой и открытой водой. На сосновом ряме с озерами 17 июня найдено гнездо с 5 яйцами, устроенное на манер гнезда желтой трясогузки — в моховой кочке под кустом багульника, птенцы вылупились 21–22 июня. В начале июля встречали хорошо летающих длиннохвостых молодых.

Обыкновенный жулан *Lanius collurio.* Встречен несколько раз в разных местах в бассейне Агана. Гнездо с 6 яйцами найдено 5 июня в кусте багульника на верховом болоте с озерами и редкими соснами (62°13' с. ш., 78°09' в. д.), 12 июня яйца были сильно насижены, а 28 июня возле пустого гнезда нашли нелетного птенца. Еще одну предположительно гнездившуюся пару жуланов наблюдали в 15 км к юго–западу 22 июня, самец кормил самку.

Серый сорокопут *L. excubitor.* На том же верховом болоте, где было гнездо жулана, примерно в 1 км, 3 июня наблюдали, как серый сорокопут активно преследовал ворону. Одиночных пролетающих птиц встречали 6 и 9 июня. Неподалеку в сосняке ягельном вечером 12 июня видели поющего серого сорокопута. Предполагаем, что где-то там пара гнездилась.

Кукша *Perisoreus infaustus.* В беломошнике у р. Логнеяун 28 июня слышали крики, похоже, нескольких птиц, но успели разглядеть только одну. Одиночную кукшу видели 2 июля в лесу у Северо–Варьеганского месторождения.

Сорока *Pica pica.* Сороки были обычными в городах Радужный и Ноябрьск и в их ближайших окрестностях, где они, очевидно, и гнездятся. В конце июня и начале июля несколько раз встречали сорок на расстоянии 10–15 км от Радужного.

Кедровка *Nucifraga caryocatactes.* Немногочисленная, но везде встречавшаяся и очень заметная птица. Несколько раз в пойменных темнохвойных древостоях находили старые гнезда, которые предположительно могли принадлежать кедровкам.

Серая ворона *Corvus cornix.* Немногочисленны, но встречались и гнездились всюду — как вблизи, так и вдали от населенных пунктов. Гнезда найдены в разных местообитаниях — и в высокоствольных лесах, и на верховых болотах с единичными деревьями. В 4 осмотренных гнездах было: 3 июня — 5 маленьких птенцов; 8 июня — 4 насиженных яйца; 13 июня — 3 птенца примерно недельного возраста; 3 июля — 5 птенцов, почти готовых к вылету. На свалке г. Радужного в начале июля видели несколько десятков ворон.

Ворон *C. corax.* Встречались всюду. Несомненно, это птицы, гнездящиеся в рассматриваемом районе с невысокой плотностью. Весной и в начале лета приходилось видеть воронов, пролетавших с раздутым подъязычным мешком. Примерно в середине июня начали попадаться семейные группы с крикливыми молодыми. В начале июля на свалке г. Радужного видели несколько птиц. Ворона, копавшегося в мусорных баках одного из городских дворов, наблюдали 6 июня.

Свиристель *Bombycilla garrulus.* Немногочисленный, несомненно, гнездящийся вид. Свиристелей встречали регулярно в течение всего периода работы. Видели 30 мая, как одна взрослая птица (видимо, самец) кормила другую (самку?), которая прилетела откуда-то из гущи елей и кедров и сразу после кормления улетела обратно. Гнездо в этом затопленном темнохвойнике мы не нашли, как и в других подобных труднопроходимых местах.

Певчий сверчок *Locustella certhiola.* Статус неясен. Двух поющих самцов встретили при обследовании окраин г. Радужного 1 июля, одного — в заросших осокой ивняках у городского пляжа, другого — в заболоченных кустах с осокой и березами возле другого озера. На пойменном болоте с высокой осокой и ивняками в среднем течении р. Агрнъеган слышали пение 3 июля.

Камышовка-барсучок *Acrocephalus schoenobaenus.* Довольно ред-

ка. При маршрутном обследовании встречено всего несколько поющих самцов: 5 июня — на ручье Саен–Тах, притоке р. Мохтикъяун, 14 июня — у озер Тагринского месторождения, 23 июня — на окраине г. Радужного, 3 июля — в среднем течении р. Агрнъеган. Территориального самца отмечали в среднем течении р. Логнеяун с 10 по 16 июня. Во всех случаях самцы пели на техногенных осоковых болотах с ивняками и редкими деревьями.

Садовая камышовка *A. dumetorum.* Единственная встреча: самец пел в ночь на 23 июня в кустах у придорожной канавы на окраине г. Радужного.

Садовая славка *Sylvia borin.* Пение слышали 3 и 4 июля в высоких пойменных ивняках на краю смешанного леса у р. Агрнъеган в 15 км севернее г. Радужного. Еще одного самца слышали 3 июля в 3 км к северу от предыдущего самца.

Славка-завирушка *S. curruca.* Обычный гнездящийся вид, встречалась в основном в пойменных местообитаниях и других смешанных лесах с подлеском, по мелколесьям на трассах трубопроводов, ЛЭП и т.п. Гнездо с 1 яйцом (видимо, частично разоренное и брошенное) осмотрено 22 июня в сосновом подросте на заросшем песчаном карьере в окрестностях р. Мохтикъяун. Неподалеку было другое гнездо, еще пустое, устроенное очень похоже — возможно, той же пары. Много раз встречали беспокоившихся птиц.

Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus.* Обычный гнездящийся вид смешанных лесов и их опушек — преимущественно по рекам, а также по молодым лесам на техногенных территориях. В зональных местообитаниях — борах, рямах и на верховых болотах — практически не встречается. Гнездо с 6 маленькими птенцами найдено 2 июля.

Пеночка-теньковка *Ph. collybita.* Немногочисленна. Поющих самцов отмечали по смешанным, в основном — пойменным, лесам и их опушкам. В пойме р. Логнеяун 28 июня найдено гнездо с 1 яйцом — видимо, повторное (самка вылетела).

Пеночка-таловка *Ph. borealis.* Обычна и, несомненно, гнездится, хотя гнезд мы не нашли. Поющие самцы и беспокоившиеся птицы распределялись главным образом по поймам рек со смешанными лесами, а также по вторичным смешанным лесам.

Зеленая пеночка *Ph. trochiloides.* Поющих самцов встречали с 30 мая по 4 июня, причем 2 июня в разных участках пойменного леса по ручью Саен–Тах (приток р. Мохтикъяун) пели 3 самца. Позднее зеленых пеночек нигде не слышали, что говорит о том, что они в обследованном районе не гнездились, а пели залетные самцы.

Пеночка-зарничка *Ph. inornatus.* Гнездящийся вид, обычный по смешанным, главным образом — пойменным лесам с преобладанием кедра и ели — по всей обследованной территории. В пойменном лесу по р. Агрнъеган 4 июля видели короткохвостого слетка, беспокоилась пара взрослых.

Серая мухоловка *Muscicapa striata.* Сильно беспокоившуюся птицу встретили 4 июля в пойменном лесу по р. Агрнъеган, около 10 км к северу от г. Радужного.

Черноголовый чекан *Saxicola torquata.* В небольшом числе встречали по всей обследованной территории, главным образом — на открытых участках техногенного происхождения, зарастающих кустами и мелколесьем, реже — в естественных местообитаниях. Беспокоившуюся пару встретили 21 июня. Гнездо с 6 подросшими птенцами найдено 24 июня.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe.* Обычна всюду вдоль дорог, трубопроводов, на техногенных пустошах, в населенных пунктах, где есть участки с открытым грунтом (песок). Нередко поющих и беспокоившихся каменок встречали в редких сосняках, где был сожжен или выбит лишайниковый покров. На песчаном пляже одного из озер на окраине г. Радужного 1 июля наблюдали, как пара каменок носила корм в брошенную трубу. Судя по капсулам помета, которые выносили птицы, птенцы были уже довольно крупными.

Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus.* Очень обычны как в пойменных лесах, так и в сосняках, обилие старых дупел пестрых дятлов дает хорошие возможности для гнездования. Горихвосток, залетавших в дупла, видели неоднократно, кормление птенцов наблюдали 12 июня.

Соловей-красношейка *Luscinia calliope.* Отмечен единственный раз: 23 июня в ивняках у моста через р. Аган в черте г. Радужного слышали пение.

Варакушка *L. svecica.* Единственная встреча: поющего самца видели на кустах ивы у придорожной канавы 29 мая на Тагринском месторождении. Возможно, это была пролетная птица.

Чернозобый дрозд *Turdus atrogularis.* Гнездится по всей обследованной территории, но очень неравномерно. В окрестностях г. Радужного чернозобые дрозды были немногочисленны, если не сказать — редки, все встречи приурочены к пойменным лесам с преобладанием темнохвойных пород. На Вынгапуровском месторождении этот вид был обычным — как в естественных пойменных лесах, так и (еще более) во вторичных смешанных лесах на месте вырубок и на трубопроводах. Там 25 июня найдено гнездо с двумя свежими яйцами, несомнен-

но, повторное, а неподалеку нашли еще одно гнездо, разоренное — видимо, первое гнездо этой пары.

Рябинник *T. pilaris.* Самый обычный из дроздов, местами многочисленный. Гнездятся преимущественно колониями. В одной из них, обследованной 3–5 июня в смешанном лесу на краю верхового болота и по соседству с ЛЭП у р. Мохтикъяун, было около дюжины гнезд. Мы осмотрели 8, в них были кладки по 5–6 яиц — от совершенно свежих до сильно насиженных. Еще несколько колоний располагались в смешанных приречных лесах с преобладанием темнохвойных деревьев. Часто видели рябинников, таскавших корм, на окраинах городов Радужный и Ноябрьск. Несколько раз встречали одиночные беспокоившиеся пары.

Белобровик *T. iliacus.* В обследованном районе оказался немногочисленным. Поющих самцов встречали по опушкам смешанных пойменных лесов и во вторичных лесах на техногенных территориях. Несомненно, гнездящийся вид, хотя гнезд мы не находили.

Певчий дрозд *T. philomelos.* Немногочисленный вид пойменных лесов по всем обследованным малым рекам, где регистрировали пение. Предполагаем гнездование, хотя формальных доказательств нет.

Деряба *T. viscivorus.* Немногочисленный гнездящийся вид, по меньшей мере — в бассейне Агана, где слышали пение на всех малых реках по пойменным лесам и в зональных сосновых лесах. На р. Логнеяун нашли гнездо в сосняке ягельном, 16 июня в нем было 4 оперяющихся птенца, которые покинули гнездо 20–21 июня. В окрестностях Ноябрьска деряб не слышали, как не нашел их в 1994–95 гг. Н.Н. Балацкий (1997).

Буроголовая гаичка *Parus montanus.* Немногочисленный вид смешанных пойменных лесов, несомненно, гнездящийся. Встречали взрослых птиц, слышали пение, позывки и «побаловки». С конца июня встречали группы — видимо, выводки.

Сероголовая гаичка *P. cinctus.* Обычны, чаще всего встречались в зональных сосновых борах. В сосняке брусничном (62°13' с. ш., 78°09' в. д.) 7 июня нашли старое дупло пестрого дятла, из которого вылетела сероголовая гаичка; 9 июня дупло осмотрели с дуплоскопом, насчитали 8 яиц.

Большая синица *P. major.* Беспокоящаяся птица встречена 6 июня в высокоствольных ивняках у р. Аган в черте г. Радужного. В тот же день там дважды видели кормящихся больших синиц.

Поползень *Sitta europaea.* Найден немногочисленным гнездящимся по пойменным лесам, где встречали поющих и беспокоящихся птиц. Дупло, в которое залетали птицы с кормом, осмотрено 8 июня на р. Лог-

неяун (62°08' с. ш., 77°49' в. д.), в дупле оказались маленькие птенцы. Дупло, очевидно, ранее принадлежало пестрому дятлу. Леток не был обмазан.

Домовый воробей *Passer domesticus.* Многочисленны в городах Радужный и Ноябрьск.

Полевой воробей *Passer montanus.* Встречен только раз: взрослый воробей прилетел к нашему лагерю у р. Мохтикъяун 13 июня, подбирал насыпанные для него крупу и крошки, а через несколько часов улетел.

Юрок *Fringilla montifringilla.* Обычный или многочисленный вид в разных местообитаниях, главным образом в смешанных пойменных, припойменных и вторичных лесах на техногенных территориях, меньше — в сосняках, отсутствовал на рямах.

Чиж *Spinus spinus.* На р. Логнеяун 16 июня встречен поющий самец. На Вынгапуровском месторождении (63°07' с. ш., 76°33' в. д.) 24 июня наблюдали, как самец кормил хорошо летающего молодого.

Чечетка *Acanthis flammea.* Несомненно, гнездящийся вид, хотя прямых подтверждений не получено. Однако, больше всего в течение всего периода работ, почти ежедневно, видели явно негнездящихся чечеток, пролетавших в разных направлениях, часто слышали голоса. Чаще всего это были пары или одиночные птицы, реже — небольшие группы. Несколько раз встречены беспокоившиеся чечетки.

Клест-еловик *Loxia curvirostra.* Многократно слышали и видели еловиков, кормившихся на елях и соснах или пролетавших в разных направлениях. Хорошо разглядели пару взрослых 31 мая.

Белокрылый клест *Loxia leucoptera.* Достоверно, когда клестов удалось хорошо разглядеть, отметили 31 мая. Это была группа из 5–6 птиц, хорошо разглядели яркого самца, самку, остальные, кажется, были молодыми. Пару с 3–4 уверенно летавшими молодыми видели 2 июля.

Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula.* Мы склонны считать снегиря малочисленным гнездящимся. В течение всего периода работ встречали пары, одиночных птиц, часто слышали голоса в пойменных лесах с преобладанием ели и кедра.

Белошапочная овсянка *Emberiza leucocephala.* Поющий самец встречен 13 июня у техногенно трансформированных озер Тагринского месторождения (62°17' с. ш., 78°11' в. д.), самец пел у дороги в мелколесье рядом с сосновым рямом. Беспокоившуюся пару встретили 3 июля у шоссе и трубопровода в 18 км к северу от г. Радужного (62°18' с. ш., 77°30' в. д.), здесь было сложное сочетание из сосняка ягельного, смешанного мелколесья, зарастающего озерка и небольшой свалки.

Тростниковая овсянка *E. schoeniclus.* Несомненно, гнездящаяся птица всего района исследований, но распространение очень неравномерное. Не найдена в зональных местообитаниях, а в интразональных встречена в небольшом числе только в полуоткрытых поймах с ивняками и осокой. Более всего (обычный вид) тростниковых овсянок было на техногенных болотах с зарослями рогоза, тростника и осок, с ивняками или мелколесьем на окраинах г. Радужного, а также на аналогичных болотах на месторождениях и трассах трубопроводов. Гнезд не найдено, но помимо встреч поющих самцов и беспокоившихся птиц, в конце июня и июле встречали слетков.

Овсянка-ремез *E. rustica.* Встречена только в одном месте: на краю смешанного заболоченного леса в пойме р. Агрнъеган у нашего лагеря (62°16' с. ш., 77°35' в. д.) 29 июня — 5 июля пел самец.

Овсянка-крошка *E. pusilla.* Обычная гнездящаяся птица всего обследованного района. В зональных борах и на верховых болотах отсутствовала или была только на их границах со смешанными лесами. Обычна или многочисленна по полуоткрытым поймам, просекам с ЛЭП, на зарастающих трубопроводах и т.п.

Дубровник *E. aureola.* Несколько поющих самцов встречены в окрестностях г. Радужного, причем 3 из них — в конце июня и начале июля — в черте самого города на техногенных болотах и болотцах с рогозом, тростником, осокой и кустами ив. Еще один самец пел 3 июля на осоковом болоте с ивняками в пойме р. Агрнъеган у моста, т.е. тоже в техногенно трансформированном местообитании.

* * *

Проведенные исследования позволили уточнить границы гнездовых ареалов нескольких видов в этом малоизученном районе Западной Сибири. Несомненно, какие-то виды мы пропустили из-за их редкости. За один сезон никогда не выявляется весь видовой состав местности. Из-за того, что мы поздно приехали и не работали осенью, не встретили целый ряд пролетных видов, которые в этой местности должны быть.

Как было сказано в предисловии, нас особенно привлекали верховые болота, мы надеялись найти на них представителей тундровой авифауны. Однако не найдены на гнездовании основные представители тундровой авифауны, которых нашли относительно недалеко севернее и западнее: тулес, золотистая ржанка, чернозобик, поморники, краснозобый конек, подорожник. Наиболее вероятно, что причина отсутствия этих видов — биотопическая. Хотя многие верховые болота физиономически очень похожи на южные тундры, но мало от-

крытых, без кустарников, мохово–лишайниковых участков, какие господствуют, например, на междуречье Пура и Надыма и в верховьях р. Айкаеган, где были найдены представители тундровых орнитокомплексов.

Доступность обследованных нами мест для рыбаков и охотников с внедорожным транспортом заставляет предполагать несомненное воздействие их на птиц. Конечно, мы увидели далеко не девственную тайгу. Она давно освоена охотниками — видимо, еще на стадии первых колышков, когда «любители побродить с ружьем» не были ограничены ни сроками, ни правилами охоты. Не удивительно, что везде, куда можно добраться на вездеходе, практически отсутствуют белые куропатки, глухари и рябчики, которые так и остаются в депрессивном состоянии под ежегодным прессом теперь уже вполне законной охоты. Наличие у многих охотников снегоходов оставляет мало надежд на то, что оседлые курообразные в районах с развитым нефтегазовым промыслом еще сохранились с относительно высокой плотностью. Как сообщают Н.С. Морозов с соавторами (2002), местами на юге ЯНАО в относительно более глухих местах куриные птицы встречаются более-менее регулярно. В обследованной нами местности из всех курообразных в небольшом числе сохранились только тетерева — видимо, благодаря тому, что на местах многочисленных вырубок, на трассах ЛЭП и трубопроводов вместо малопродуктивных ягельных сосняков и рямов появились открытые местообитания, травянистые пространства, кустарники и мелколесья.

Это как раз проявление благоприятного влияния техногенного пресса на орнитофауну. В приведенном выше повидовом обзоре есть целый ряд видов, которые были встречены преимущественно или только на трансформированных территориях. Во многом увиденная нами картина сходна с описанной для окрестностей Ноябрьска Н.Н. Балацким (1997).

Не встречены, вопреки ожиданиям, представители целого ряда видов, которых в исследованном районе, в соответствии с очертаниями их ареалов и биотопическими предпочтениями, мы предполагали встретить. Это **трехпалый дятел**, **пятнистый сверчок**, **малая мухоловка**, **синехвостка**, **длиннохвостая синица**, **чечевица** и некоторые другие.

ЛИТЕРАТУРА

Балацкий Н. Н. Птицы окрестностей Ноябрьска // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1997. С. 4–8.

Виноградов В. Г., Кривенко В. Г., Панфилов А. Д. Очаг тундровой орнитофауны в верхней части бассейна реки Пур // Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф. Минск, 1991. Ч. 1. С. 52–53.

Виноградов В. Г., Кривенко В. Г., Парфенов А. Д., Уникальное сообщество куликов на севере Западной Сибири // Информация рабочей группы по куликам. Новосибирск, 1992. С. 63–65.

Виноградов В. Г. Птицы реки Русской (Луце-яхи) и низовьев Таза // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2002. С. 72–85.

Головатин М. Г. Об орнитофауне Верхне-Тазовского заповедника // Там же. 2001. С. 58–64.

Морозов В. В. Степной лунь *Circus macrourus* на юге Ямала // Русский орнитол. журн., 1998. Экспресс-вып. 47. С. 3–5.

Морозов Н. С., Марамзин О. В., Преображенская А. А. К орнитофауне верхней части бассейна реки Пур // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2002. С. 169–177.

Покровская И. В. Материалы по орнитофауне северной границы таежной зоны Западно-Сибирской равнины // Там же. 1998. С. 132–135.

Редькин Я. А. Новые представления о таксономической структуре группы «желтых трясогузок» // Достижения и проблемы орнитологии Северной Евразии на рубеже веков. Казань, 2001. С. 150–165.

Рябицев В. К. К орнитофауне верховьев Пяку-Пура и окрестностей // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1998. С. 160–165.

Рябицев В. К. Авифаунистические исследования на Урале, в Приуралье и Западной Сибири за последнюю четверть века и взгляд на будущее // Там же. 2001. С. 4–12.

Рябицев В. К., Тарасов В. В. Птицы верховьев реки Айкаеган // Там же. 1998. С. 165–172.

Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области). М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. 808 с.

Стрельников Е. Г., Стрельникова О. Г. Краткие комментарии к распространению некоторых видов птиц в бассейне Большого Югана // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1998. С. 173–180.

Томкович П. С. Социально-пространственная организация песочников в репродуктивный период // Систем. принципы и экол. подходы в изучении популяций. Пущино, 1984. С. 197–205.

Шепель А. И., Мусихин А. Э., Рыбкин А. В. Кунщиков К. П., Чуприянов С. В., Фишер С. В. Новые регистрации степного луня в Пермской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1998. С. 185–186.

СПЛЮШКА И СЫЧИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. М. Самигуллин

Пр. Гагарина, 52, кв. 14, г. Оренбург, 460051.

Исследования проведены на территории Оренбургской области в 1970–2004 гг.

Сплюшка *Otus scops*. Гнездование сплюшек зарегистрировано нами по опушкам горно–лесных ландшафтов и речных урем южной оконечности хр. Дзяутюбе и хр. Накас, в березово–осиновых колках Саринского плато и Губерлинских гор, в верховьях р. Суундук на крайнем юге Зауральского плато, в пойме р. Сакмара от устья р. Катрала в Кувандыкском р-не до устья р. Б. Ик в Саракташском р-не и по притокам р. Сакмара на этом отрезке, в пойме р. Урал от устья р. Киргильдысай у г. Новотроицк Гайского р-на до устья р. Уртабуртя в Беляевском р-не. В долине р. Урал южная граница гнездования вида проходит по колочным лесам и уремам верховьев рек Эбита (историческое название р. Ибетта), Алимбет, Киялы-Буртя, Бурлы и среднего течения р. Уртабуртя. В Бузулукском бору мы находили гнезда сплюшек по р. Боровка и в междуречье Боровки и Тока в окрестностях с. Лисья Поляна Бузулукского р-на. Прилетают сплюшки в 1–2-й декадах мая. Откладывают яйца с 3 декады мая до середины июня. Птенцы появляются в гнездах с последних чисел июня, вылетают из гнезд — с середины июля. Обнаружено 9 гнезд. В гнездах бывает 4–6 яиц, в выводках 3–6 птенцов. Осенние миграции — с последних чисел августа до конца 2 декады сентября.

Мохноногий сыч *Aegolius funereus*. В апреле 1983 г. в долине р. Катрала в Кувандыкском р-не в стволе сосны мы нашли старое дупло желны, у которого пел самец мохноногого сыча. В начале июня 1983 г. наблюдали, как обе птицы гнездовой пары носили корм в это дупло. Мигрирующих мохноногих сычей в ноябре — феврале наблюдали в г. Оренбурге в 1989, 1990, 1996, 2001 гг., в с. Грачевка Грачевского р-на — в 1992–1993 гг., в пос. Саракташ Саракташского р-на — в 1997, 2003 гг.

Домовый сыч *Athene noctua*. В степных ландшафтах Оренбургской области домовые сычи редки на гнездовании. В гнездовой период они наиболее обычны к югу от широтного и к востоку от меридионального течения р.Урал. На зиму все сычи улетают, остаются зимовать лишь отдельные особи и только в отдельные годы (например в пос. Саракташ Саракташского р-на в 1999, 2001, 2002 гг.). Гнездование домовых сычей зарегистрировано только в селах и на их окраинах. Прилетают эти сычи в марте, откладывание яиц происходит в апреле, насиживание — с конца апреля и весь май. Птенцы появляются в июне, а в июле они начинают летать. Обнаружено 14 гнезд. В кладках 5–8

яиц, в выводках 3–8 птенцов. Осенние миграции происходят с середины августа до конца ноября.

Воробьиный сыч *Glaucidium passerinum*. Во второй половине марта и в апреле на хр. Накас(1984–1985гг.) и на южной оконечности хр. Дзяутюбе (1989, 1993, 1998 гг.) я слышал печальные свисты самцов воробьиных сычей. Самих птиц наблюдал лишь 3 раза поодиночке: 27 марта 1984 г. и 4 апреля 1984 г. на хр. Накас и 9 апреля 1993 г. — на хр. Дзяутюбе.

ДОПОЛНЕНИЯ К ОРНИТОФАУНЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

М. П. Сульдин

7 микрорайон, д. 25д, кв. 23, г. Нефтеюганск Ханты-Мансийского авт. округа, 628307.

Сообщение содержит результаты весенне–летнего сезона 2004 г., дополняющие и уточняющие предыдущую публикацию (Сульдин, 2003). В связи с низким половодьем в пойме сформировалась обширная заболоченная растительная формация из хвоща болотного и осоки, которая в прошлые годы, с более высокими уровнями воды, превращалась в залитое водой пространство. Заросли осоки и хвоща образовали значительного размера заболоченный, труднопроходимый остров, местами с топкими участками, по окраине — со сплавинами. Это хвощово–осоковое болото располагалось в лабиринте слабопроточных озер, сформированных меандрирующей в этом месте протокой Чеускина, было окружено водой и не имело сухопутной связи с окружающей местностью. К этому биотопу относятся сведения по ржанкообразным. Также посещались близлежащие хвойно-мелколиственные перелески и леса. Часть видов обнаружена впервые, для других получены доказательства их гнездования или приведены уточненные и более свежие данные.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*. Плавунчики держались в смешанной колонии малых чаек и белокрылых крачек 7–11 июня. Плавунчик демонстрировал поведение отводящей птицы 7 июня. Кормящихся птиц я спугивал 9 июня. Одиночный плавунчик 11 июня кормился в нескольких десятках метров от гнезд озерной и малой чаек и был сфотографирован. Предположительно, это были бродячие, не размножающиеся особи на летних кочевках. (Это, конечно же, были птицы, мигрировавшие на север. — ***Ред.***) В прошлые годы плавунчики не встречались.

Озерная чайка *Larus ridibundus*. Обычный гнездящийся вид поймы (менее обычна, чем малая чайка), установлено предполагавшееся ранее гнездование. Постоянных колоний не известно, а расположение сезонных зависит от уровня воды. Колония из 12 гнезд, содержащих (все) по 3 сильно насиженных яйца, обнаружена 9 июня на окраине заболоченного хвощово-осокового массива. 10 гнезд размещались довольно плотно, расстояние между ними было от 1 до 3–4 м, два других гнезда располагались до десятка метров от остальных. В 2–3 м от их гнезд были устроены гнезда малых чаек. В одной из кладок 11 июня на двух яйцах были наклевы.

Малая чайка *L. minutus*. Вид обычен, места расположения колоний зависят от высоты половодья. В заболоченном массиве из осоки и хвоща размещалось их смешанное поселение с белокрылыми крачками. В колонии часть гнезд образовывали скопления из 2–4 гнезд с расстоянием между ними 2–3 м, а между отдельными группами — до нескольких десятков метров. Размножалось более 50 пар. Большинство гнезд располагалось среди осоки. В 15 гнездах 7 июня кладки имели разную насиженность — от свежих до средней насиженности. 9 июня яйца в 9 кладках оказались средне насижены, в 6 — сильно насижены, в 1 — слабо насижены. 11 июня, наряду с насиженными кладками, найдена кладка из 1 ненасиженного яйца и кладка из 1 слабонасиженного яйца. Размер кладки по зарегистрированным 7–11 июня 35 гнездам в среднем — 2,7 яйца (от 1 до 3).

Белокрылая крачка *Chlidonias leucopterus*. Довольно обычный гнездящийся вид, доказано предполагавшееся ранее гнездование на северной окраине ареала. Места колоний не постоянны и напрямую зависят от уровня половодья. Вероятно, крачки гнездятся не ежегодно, что известно для многих видов на периферии ареала. Кормящуюся совместную стаю крачек (16–20 особей) и малых чаек (более 20) наблюдал 2 июня на открытой воде, а 7 июня в 200 м найдена их смешанная колония (описание местообитания см. выше). Крачек было 20–25 пар. Гнезда крачек, в отличие от гнезд малой чайки, были менее массивны и слабо возвышались над водой. Отмечено тяготение гнезд крачек к более сырым и заболоченным участкам с хвощом, в отличие от малой чайки, предпочитавшей устраивать гнезда в менее сырой и заболоченной формации из осоки. Расстояние между гнездами — как белокрылых крачек, так и соседствующих с ними гнездами малых чаек — составляло от 2–3 до нескольких десятков метров. Большинство кладок 7 июня были средней насиженности, но были также как слабо, так и сильно насиженные. При посещении колонии 9 июня найдено гнездо с 2 ненасиженными яйцами, а 11 июня — гнездо с 1 све-

жим яйцом (повторная кладка?). Средний размер кладки по всем найденным 7–11 июня 17 гнездам — 2,6 яйца (от 1 до 3). В описанном поселении найдено 6 гнезд красношейных поганок, но гнездилось их больше. Здесь же найдено гнездо широконоски, днем «пели» погоныши, по окраине гнездились озерные чайки и речные крачки.

Речная крачка *Sterna hirundo*. На гнездовании обычна. В 2004 г. очень разреженное поселение сформировалось в сотне метров от совместной колонии малых чаек и белокрылых крачек. На сплавинах, на границе заболоченного массива и открытой воды, найдено 5 гнезд. Расстояние между соседними гнездами составляло от 10 до 100 м, чаще — около 30–40 м. Одно гнездо, в котором 7 июня было 1 свежее яйцо, 9 июня содержало 2 яйца. В двух других гнездах, найденных 11 июня, было по 1 яйцу, в одном — свежее, в другом — средне насиженное.

Глухая кукушка *Cuculus saturatus*. Малочисленный, очевидно гнездящийся вид. На согре у хвойно–мелколиственного леса 9 июня слушал и одновременно наблюдал поющего самца. Голос глухой кукушки 11 июня доносился из смешанного перелеска.

Черный стриж *Apus apus*. В предыдущие годы стрижи не зарегистрированы. Над дачными постройками, аэродромом и смешанным лесом 14 июня наблюдал 4 стрижей (возможно, их было больше) и слышал их голос. На следующий день птиц на этом месте не встретил. В городе стрижей не отмечено.

Зеленая пересмешка *Hippolais icterina.* В смешанном перелеске с густыми зарослями рябины 2 июня рассмотрел пересмешку. В соседнем густом осиново–березовом перелеске у водоема 15 июня слушал активное пение в кронах берез и ив. Это севернее известных мест гнездования в Западной Сибири.

Зеленая пеночка *Phylloscopus trochiloides*. Вероятно, гнездится. Довольно обычна, но уступает по встречаемости другим пеночкам. Пение самцов в этот год отмечено 23 мая в кедровнике, но прилетели они раньше. В смешанном лесу на постоянном месте пение слышал 2–15 июня, а в городе — с 3 декады мая до конца июля. Примечательно, что в прошлые годы в городе на этом же месте в конце мая пели веснички, но в 2004 г. они здесь не встречены.

Белобровик *Turdus iliacus*. Немногочислен, встречается гораздо реже рябинника. Гнездо с кладкой из 6 яиц (2 средне насижены, 4 сильно насижены) найдено 15 июня. Оно размещалось на окраине смешанного обгоревшего перелеска у заливного луга, на периферии колонии рябинников, в нише обгоревшего пня на высоте 170–180 см.

Камышовая овсянка *Emberiza schoeniclus*. Подтверждено гнездо-

вание этого обычного вида. Гнездо, содержащее 6 сильно насиженных яиц, обнаружено 14 июня на сухой поляне у окраины березово-осинового перелеска.

ЛИТЕРАТУРА

Сульдин М. П. Птицы окрестностей Нефтеюганска // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2003. С. 176–193.

ЗИМНЯЯ ВСТРЕЧА ЗИМНЯКА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Т. А. Суслова

Центр гос.сан.-эпид.надзора Свердловской жел. дороги,
пер. Ишимский, д. 2, Екатеринбург, 620107

На Среднем Урале, в пределах Свердловской и Пермской областей, **зимняк** *Buteo lagopus* регистрировался только в периоды весенних и осенних миграций (Данилов, 1969; Шепель, 1992; Коровин, 2004). Осенью некоторые особи могут задерживаться до середины — конца ноября (Шепель, 1992; Коровин, 2004). В окрестностях д. Ольховка (Сысертский р-н Свердловской области) зимняк встречен 3 января 2004 г. Птица пролетала над пересекающей поля дорогой и села на телеграфный столб, видовые признаки рассмотрены с близкого расстояния. Столь поздняя встреча кочующего зимняка обусловлена, скорее всего, необычно теплой и малоснежной зимой.

ЛИТЕРАТУРА

Данилов Н. Н. Птицы Среднего и Северного Урала: Ч. 1 // Тр. Урал. отд. МОИП. Свердловск, 1969. Вып. 3. С. 3–123.

Коровин В. А. Птицы в агроландшафтах Урала. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. 504 с.

Шепель А. И. Хищные птицы и совы Пермского Прикамья. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1992. 296 с.

ЗАЛЕТ КОЛПИЦЫ НА СРЕДНИЙ УРАЛ

В. В. Тарасов

Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 марта, 202,
Екатеринбург, 620144. E-mail: tarasov-@mail.ru

Колпицу *Platalea leucorodia* в ювенильном оперении вспугнули 6 августа 2004 г. с обочины дороги рядом с обширной свалкой у пос. Атиг в Нижне-Сергинском р-не на юго-западе Свердловской области.

К ФАУНЕ ПТИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В. В. Тарасов[1], **И. В. Примак**[2], **В. Е. Поляков**[3]

[1] Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 марта, 202, г. Екатеринбург, 620144. E-mail: tarasov-@mail.ru
[2] Ул. Республики, д. 76б, кв. 42, г. Ишим Тюменской обл., 627405.
[3] Факультет экологии Челябинского государственного университета, ул. Василевского, 75, г. Челябинск, 454120. E-mail: v.bird@mail.ru

Исследования проведены в период с 13 мая по 28 июня в 20–30 км к югу и юго–западу от г. Кургана на территории площадью 400 км^2 в окрестностях населенных пунктов Садовое (55°15' с. ш., 65°08' в. д.), Менщиково (55°12' с. ш., 65°06' в. д.), Галишово (55°11' с. ш., 64°58' в. д.), Черемухово (55°21' с. ш., 65°15' в. д.), Лесниково (55°17' с. ш., 65°19' в. д.), Бараба (55°14' с. ш., 65°14' в. д.), Темляково (55°12' с. ш., 65°13' в. д.), Утятское (55°10' с. ш., 65°11' в. д.), Нагорское (55°09' с. ш., 65°12' в. д.), Митино (55°11' с. ш., 65°29' в. д.). Кроме авторов в экспедиции участвовали Н. Я. Мурзина и H. W. Schafstall (Германия). Своими наблюдениями по некоторым видам поделились местные егеря А. Л. Новоселов, В. С. Пимоненко, А. Н. Серебряков, Н. В. Кузнецов. Выражаем им благодарность. Финансовая поддержка оказана Курганским областным экологическим фондом и Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Курганской области, которые планируют в дальнейшем на этой территории многолетний мониторинг животного мира.

Обследованная территория расположена на границе южной и северной лесостепных подзон. В меридиональном направлении ее пересекает р. Тобол с впадающими в него притоками (наиболее крупный — р. Юргамыш), что создает большое разнообразие ландшафтов. Вдоль левого берега Тобола тянется широкая пойма, плавно переходящая в междуречье. Правый берег высокий, с выраженной песчаной террасой, занятой ленточным интразональным сосновым бором. Междуречные пространства представлены березово–осиновыми колками, безлесные участки все распаханы, залежей почти нет. Вследствие близости областного центра вся территория сильно урбанизирована. Населенные пункты вдоль Тобола переходят практически из одного в другой. Немногие свободные от них участки берегов заняты детскими лагерями, домами отдыха, дачными поселками. На приозерных лугах и в пойме Тобола ведется интенсивный выпас скота. На озерах всегда много местных и приезжих рыбаков.

Особенностями сезона были глубокая депрессия мышевидных грызунов, сухое жаркое лето, полное отсутствие дождей, повсеместные низовые пожары. На треть выгорел Илецко–Иковский бор, сгорело

несколько населенных пунктов. Сильно пострадали от пожаров и другие лесные массивы Курганской области. Уровень водности, неуклонно поднимавшийся в последние годы, снизился по сравнению с прошлым годом почти на полметра, в результате чего высохли многие осоковые, камышовые, рогозовые болота и тростниковые займища.

После аннотированного списка приведен перечень видов, обычных или многочисленных для исследованной территории.

* * *

Чернозобая гагара *Gavia arctica*. Нами не отмечена. По словам егеря А.Н. Серебрякова, несколько пар гнездится на оз. Бездонном у с. Черемухово.

Кудрявый пеликан *Pelecanus crispus*. Регулярно в течение сезона встречали пеликанов, кормящихся на оз. Крутали (до 35 особей) и отдыхавших на песчаной косе оз. Тайшино (до 6 особей).

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. Довольно обычен. Пролетавших одиночек и небольшие группы бакланов регистрировали в разных местах. В юго–западной части оз. Крутали встречали стаи до 50 молодых и холостых особей. На песчаной косе оз. Тайшино насчитывали до 100 отдыхавших бакланов, преимущественно неполовозрелых. Егерь Н.В. Кузнецов предполагает гнездование на оз. Севастьян.

Цапли — серая *Ardea cinerea* и **большая белая** *Egretta alba*. В кольце густых тростников вокруг острова на оз. Крутали в совместной колонии гнездилось около 40 пар серых цапель и около 15 пар — белых. Гнезда разных видов различались по устройству и цвету яиц и располагались на расстоянии в 15–100 м. В одном случае гнезда белой и серой цапель были устроены всего в двух метрах одно от другого. В кладках было по 4–6 яиц, вылупление птенцов серой цапли произошло примерно 20 мая, белой — 30 мая. Еще одна колония из 30 пар серых цапель и нескольких пар белых цапель была в юго-западной части оз. Крутали. По словам рыбаков и егерей, в предыдущие годы белых цапель на этом озере было больше.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. Немногочислен. Одиночных птиц и группы по 3–7 особей наблюдали в разных частях обследованной территории. Вероятно, гнездится.

Лебедь-шипун *C. olor*. В небольшом числе гнездится на оз. Крутали: егерь В.С. Пимоненко в предыдущем году видел здесь шипунов с выводком из 6 птенцов. Мы встречали на этом озере одиночных птиц — вероятно, из пар. Пара шипунов отмечена 15 мая на небольшом озере у с. Утятского. На оз. Камарском у с. Садового весь сезон держа-

лось около 70 молодых особей, группу из 12 лебедей видели 22 мая на болоте у с. Менщиково.

Пеганка *Tadorna tadorna*. Единственная встреча: на одном из островков в юго–западной части оз. Крутали 19 мая видели пару, самка осматривала старую лисью нору, самец оставался поблизости. Гнезда в норе не оказалось. По словам рыбаков и егерей, в последние годы из-за подъема уровня воды многие лисьи норы оказались затоплены, и пеганок стало заметно меньше. Со слов егеря А.Н. Серебрякова, иногда селятся в старых скирдах соломы.

Огарь *T. ferruginea*. Три пары отмечены 15 мая на оз. Камарском у с. Садового. Позднее мы здесь бывали многократно, но огарей не встречали.

Шилохвость *Anas acuta*. Редка. Единичные пары отмечены только на заросших степной растительностью островах на оз. Крутали.

Свиязь *A. penelope*. Пару наблюдали 14–16 мая на старице в пойме Тобола у с. Утятского, еще один самец встречен 23 мая в нескольких километрах ниже по течению реки.

Чирок-свистунок *A. crecca*. Редок. Предполагать гнездование можно только на водоемах с кустарниками в пойме р. Юргамыш у с. Менщиково, где мы иногда слышали голоса самцов и встречали единичные пары.

Красноносый нырок *Netta rufina*. Пять пар держались в течение всего сезона на оз. Камарском у с. Садового. Две одиночные самки отмечены 1 июня на оз. Крутали. Несомненно, гнездится.

Морянка *Clangula hyemalis*. По словам охотников, в последние годы почти перестала встречаться на пролете. Егерь А.Н. Серебряков в первой декаде октября иногда встречает табунки по 15–20 особей.

Гоголь *Bucephala clangula*. На оз. Тайшино 18 мая видели стаю из 15 самцов.

Крохали — большой *Mergus merganser*, **длинноносый** *M. serrator*, **луток** *M. albellus*. Со слов егерей, пролетные пары встречаются весной во второй половине апреля.

Осоед *Pernis apivorus*. H.W. Schafstall видел 17 мая одиночную птицу в бору у с. Утятского. Еще две встречи отмечены нами в долине р. Юргамыш — в березово-осиновых колках к западу от с. Менщиково.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. Вероятно, из-за депрессии грызунов луни практически отсутствовали. Полевой лунь отмечен дважды: 20 мая наблюдали охотившуюся над полями у с. Садового самку, 31 мая — пролетевшего над колками у с. Менщиково самца.

Степной лунь *C. macrourus*. Зарегистрирован один раз: 18 мая видели самца, охотившегося над полями к югу от оз. Крутали.

Тетеревятник *Accipiter gentilis*. В бору у с. Утятского найдено гнездо, устроенное под кроной сосны на высоте 15 м; 22 мая в нем было 4 сильно насиженных яйца, 31 мая — два пуховых птенца и свежедобытый ощипанный сизый голубь; 17 июня птенцы были величиной с курицу, с растущими трубочками махов. Поблизости были найдены еще несколько старых нежилых гнезд, возможно, той же пары. По словам егерей А. Л. Новоселова, А. Н. Серебрякова, Н. В. Кузнецова, в бору между селами Лесниково и Утятским ястреб довольно обычен (обитает около 5 пар), кормится сизыми голубями, часто бьет домашнюю птицу.

Перепелятник *A. nisus*. Отмечено несколько встреч, в том числе видели самку, которая под крики рябинников ощипывала обезглавленного сизого голубя в д. Затобольной.

Обыкновенный канюк *Buteo buteo*. Встречи одиночных охотившихся птиц были нередки, однако из-за отсутствия грызунов канюки не гнездились. Крик беспокойства за весь сезон слышали лишь 16 мая в бору у с. Утятского.

Беркут *Aquila chrysaetos*. Неудачное гнездование отмечено в небольшом колке у оз. Тайшино в 3 км к северу от с. Садового. Гнездо располагалось на одиночной сосне в центре колка на высоте 16 м, имело диаметр около 80 см и высоту 60 см. Лоток был выстлан свежим лапником. Кроме того, в нем были куски коровьего навоза, различный мусор, тряпки. В гнезде 30 мая было 2 яйца, 21 июня — мертвый птенец недельного возраста и брошенное холодное яйцо, останки молодого грача и суслика. В постройке, несмотря на ее незначительные размеры, гнездились шесть пар полевых воробьев. Маленькое гнездо и поздние сроки гнездования могут свидетельствовать о неопытности птиц, которые, вероятно, были молодыми: у обеих было довольно много светлых перьев на теле. По словам местных жителей, в предыдущие годы гнезда здесь не было. Одна встреча взрослой птицы отмечена нами 28 мая в 20 км севернее, у райцентра с. Введено.

Могильник *A. heliaca*. Между селами Садовым и Черемухово 27 мая наблюдали, как взрослый орел вылетел из колка и стал кругами набирать высоту.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Со слов рыбаков, жилое гнездо около двух десятков лет существует у южного берега оз. Крутали. Оно устроено на одной из стоящих на опушке колка (не самой высокой) осине и представляет собой весьма массивную постройку диметром около 2 м и такой же высоты, лоток был выстлан соломой. При осмотре 25 июня в нем обнаружили двух оперенных птенцов размером с гуся, а также останки грачей, ондатр, чешую рыб. В постройке

гнездились несколько пар полевых воробьев. Н. Я. Мурзина и H. W. Schafstall видели 26 мая пару взрослых птиц на оз. Тайшино. Егерь А. Н. Серебряков утверждает, что одна пара уже более 20 лет обитает на участке Тобола у с. Барабы.

Чеглок *Falco subbuteo*. Довольно редок. Несколько раз в мае–июне у с. Утятского видели соколов, вероятно, из одной и той же пары. Птицы заняли старое гнездо вороны на самой верхушке строевой сосны высотой 28 м на опушке бора, выходящей к Тоболу. В осмотренной 23 июня кладке было три насиженных яйца. В других местах чеглоков не встречали.

Дербник *F. columbarius*. Одиночная самка 24 мая держалась без беспокойства на небольшом высохшем рогозовом болоте в пойме Тобола у с. Утятского.

Обыкновенная пустельга *F. tinnunculus*. Единственный раз пустельгу (самку) видели 26 июня у южного берега оз. Бездонного.

Серая куропатка *Perdix perdix*. Гнездо с 12 свежими яйцами найдено 24 июня у с. Садового. Оно было устроено под кустами спиреи и вишни среди разнотравья на краю березового колка, в 20 м от ближайших деревьев. Лоток был выстлан сухими листьями березы и обломками одревесневших стеблей трав. С гнезда спугнули самку, вероятно, только что вернувшуюся в него после отлучки: яйца были полностью укрыты сверху сухими листьями. Самец находился в нескольких метрах от гнезда. Других встреч не было.

Глухарь *Tetrao urogallus*. Нами не отмечен. Тем не менее, егерь А. Л. Новоселов знает в бору между селами Лесниково и Утятским 11 токов, на которые собирается по 3–7 самцов.

Пастушок *Rallus aquaticus*, **погоныш** *Porzana porzana*, **погоныш-крошка** *P. pusilla*. Немногочисленны. Голоса нескольких самцов слышали на небольших тростниковых водоемах к западу от с. Менщиково.

Камышница *Gallinula chloropus*. Две одиночные птицы отмечены 17 и 21 июня на болоте у с. Галишово и в кустах ивы на Тоболе у с. Утятского соответственно. На р. Юргамыш у с. Менщиково 21 июня и на старицах Тобола 23 июня слышали голоса. Вероятно, птиц намного больше, но из-за скрытного поведения регистрировать их удавалось редко.

Тулес *Pluvialis squatarola*. Встречается на пролете. Двух самцов и две самки (две пары?) видели 30 мая на острове оз. Крутали.

Галстучник *Charadrius hiaticula*. Два десятка птиц видели 30 мая в стае других пролетных куликов на острове оз. Крутали. Долгое время в лесостепном Зауралье мигрирующих галстучников не встречали. Ранее их наблюдали здесь 20 лет назад (Блинова, Блинов, 1997).

Камнешарка *Arenaria interpres*. На озерах Камарском и Тайшино 22 мая кормились, соответственно, одна и две птицы.

Ходулочник *Himantopus himantopus*. Обычен. Мы встречали ходулочников в разных точках обследованной территории. Поселение из четырех пар было найдено у болотца на северной окраине с. Садового; 22 мая в кладках были сильно насиженные яйца, 24 июня видели летного птенца.

Шилоклювка *Recurvirostra avosetta*. Двух птиц (пару?) видели 18 мая на песчаной косе оз. Тайшино. Позднее их здесь не встречали.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*. Со слов егеря Н. В. Кузнецова, в первых числах мая был обычен на Тоболе и некоторых притоках (р. Исток). По словам А. Л. Новоселова, ежегодно бывает многочислен на пролете по р. Исток, были встречи в июне–июле на оз. Лебяжьем у с. Кропанка и по Тоболу у д. Старокомогорской, возможно гнездование.

Черныш *Tringa ochropus*. Одна регистрация: одиночная особь — 28 мая в пойме р. Юргамыш у с. Менщиково.

Фифи *T. glareola*. На острове оз. Крутали 1 июня слышали голос.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. На Тоболе между селами Утятским и Барабой 23 мая перевозчиков встречали по одной–двум парам на 1 км русла. Очевидно, это были пролетные птицы, так как к 31 мая их осталось две пары на 10 км реки. Пара перевозчиков сильно беспокоилась 16–22 июня на берегу маленького озера у с. Утятского. Несомненно, гнездится.

Мородунка *Xenus cinereus*. Нескольких токовавших пролетных птиц наблюдали с 18 до 24 мая на берегах оз. Тайшино.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*, **краснозобик** *Calidris ferruginea*, **чернозобик** *C. alpina*, **кулик-воробей** *C. minuta*. Встречены на пролете 30 мая — 1 июня на острове оз. Крутали. В смешанных стаях насчитывалось по два–три десятка особей каждого вида.

Турухтан *Philomachus pugnax*. Десятки или даже сотни тысяч пролетных турухтанов держались всю вторую половину мая по берегам озер Крутали, Камарское, Тайшино. На гнездовании не отмечен.

Белохвостый песочник *Calidris temminckii*. Одного пролетного кулика видели 22 мая на оз. Камарском.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*. Егерь Н.В. Кузнецов рассказал, что в бору у с. Бараба гнезд не находил, но птиц вспугивал частенько.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. По словам егерей В. С. Пимоненко, А. Н. Серебрякова, Н. В. Кузнецова, в конце лета кроншнепы не представляют редкости, встречаются и пары с молодыми. Отличий от среднего кроншнепа никто не назвал.

Степная тиркушка *Glareola nordmanni*. Пара птиц встречена 30 мая у оз. Тайшино. Позднее в тот же день, возможно, эту же пару видели на острове оз. Крутали.

Черноголовый хохотун *Larus ichthyaetus*. Колония из 11 пар найдена 18 мая на острове оз. Крутали среди большой разреженной колонии хохотуний. Гнезда располагались очень компактно (1,5–2 м друг от друга). В кладках было по 3, реже — по 2 яйца средней насиженности. Это первая достоверная гнездовая находка хохотуна на территории Курганской области, хотя косвенные свидетельства гнездования были и ранее (Бойко, Сысоев, 2000; Тарасов и др., 2003).

Чайки — **сизая** *Larus canus* и **малая** *L. minutus*. Гнездование не отмечено. По несколько десятков, вероятно, пролетных особей отдыхало 18–24 мая на песчаной косе оз. Тайшино.

Клинтух *Columba oenas*. Немногочислен. Одиночные птицы и пары встречены в бору у сел Утятское и Бараба, в перелесках у с. Митино и в пойме р. Юргамыш у с. Менщиково. Предполагаем гнездование.

Обыкновенная горлица *Streptopelia turtur*. В припойменных колках в долине р. Юргамыш у с. Менщиково в конце мая ворковали два самца. 25 мая в кусте боярышника на высоте 2 м найдено гнездо со свежим яйцом. На следующий день самка отложила второе яйцо. На остальной территории горлицу нигде не встречали, как и ранее в других районах области, кроме Звериноголовского (Рябицев и др., 2002).

Глухая кукушка *Cuculus saturatus*. Один–два самца стационарно куковали в бору у с. Утятского с 19 мая по 16 июня. «Пение» двух самцов слышали 19 и 20 июня в колках у р. Боровлянки к северо-востоку от с. Нагорского и еще одного — 24 и 26 июня в долине р. Юргамыш у с. Менщиково. Вероятно гнездование.

Белая сова *Nyctea scandiaca*. По словам егерей и рыбаков, встречается в течение всего снежного периода.

Филин *Bubo bubo*. Егерь А.Л. Новоселов сказал, что около четырех последних лет слышит уханье филина на восточной окраине бора в окрестностях с. Бараба, наибольшая активность токования — с 20 апреля по 10 мая.

Болотная сова *Asio flammeus*. Охотившихся над лугами сов видели 24 мая в широкой пойме Тобола к востоку от с. Менщиково, 30 мая — на восточном берегу оз. Крутали и 25 июня — в пойме р. Юргамыш у с. Менщиково.

Сплюшка *Otus scops*. Токовые крики двух самцов слышали 20 мая в перелесках к юго-востоку от оз. Крутали. В заброшенном фруктовом саду у с. Садового поздно вечером 24 мая слышали голоса трех самцов. Здесь же в ночь на 24 июня перекликалась пара птиц, а 25 июня

в дупле недавно упавшего обломка тополя нашли разбитое яйцо, похожее на яйцо сплюшки.

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis*. Мы слышали голос 26 мая в березово-осиновых колках в долине р. Юргамыш в 2 км к западу от с. Менщиково, 30 мая здесь же — H. W. Schafstall. На лесном ручье в бору у с. Утятского во второй половине июня почти ежедневно встречали взрослую птицу с очень коротким хвостом, по ночам слышали крики птенцов. Здесь же 26 июня увидели другую взрослую птицу с нормальными пропорциями и хорошо летавшего молодого в мезоптиле.

Обыкновенный козодой *Caprimulgus europaeus*. Численность в бору у с. Утятского оказалась значительно ниже, чем в притобольных борах Звериноголовского р-на (Рябицев и др., 2002). На участке площадью 1,8 км^2 токовали 3–4 самца. Здесь 6 июня найдено гнездо с 2 яйцами, 26 июня на них появились наклевы. Еще одно гнездо с двумя насиженными яйцами найдено 19 июня в березовом колке в 4 км к востоку от с. Нагорского. Пение козодоев слышали также 24 июня в заброшенном саду у с. Садового и 25 июня — в колках у с. Менщиково.

Обыкновенный зимородок *Alcedo atthis*. У д. Темляково 23 мая заметили птицу, вылетевшую из норы в обрыве Тобола. В устроенном в глубине норы гнезде оказались 7 слегка насиженных яиц. На лесном ручье в бору у с. Утятского, протекающем в овраге глубиной 6–8 м, 16 июня появилась птица, которая в последующие дни копала нору в песчаном обрыве (наблюдали ее до 23 июня). Одновременно двух птиц мы не видели: возможно, это была самка, готовившаяся ко второму гнездованию, а самец из этой пары еще докармливал первый выводок. В этом месте были еще три старых начатых норы, без гнездовой камеры. Ранее зимородков в Курганской области встречали в Куртамышском (Блинова, Блинов, 1997) и Притобольном (Славинских, 2002) р-нах, о гнездовании сведений не было.

Желна *Dryocopus martius*. В бору у с. Утятского 16 мая слышали голос.

Белоспинный дятел *Dendrocopos leucotos*. Сравнительно редок. В старом заброшенном фруктовом саду у с. Садового 25 июня видели птенца, который молча высовывался из дупла в тополе, взрослых птиц рядом не было. На следующий день в припойменных березово-осиновых колках долины р. Юргамыш у с. Менщиково отмечен не проявлявший беспокойства взрослый дятел.

Малый дятел *D. minor*. Несомненно гнездится, но встречен всего один раз — 25 июня в старом фруктовом саду у с. Садового.

Вертишейка *Jynx torquilla*. Голос слышали 26 мая в березово-осиновом колке у р. Юргамыш в 2 км к западу от с. Менщиково.

Горная трясогузка *Motacilla cinerea*. Отмечено гнездование в 2 км к северо-востоку от с. Утятского — в 400 км к югу и востоку от известных ранее границ ареала (Рябицев, 2001), впервые в лесостепном Зауралье. Брачную пару обнаружили здесь 15 мая и в течение сезона неоднократно встречали на одном и том же участке лесного ручья. Беспокойства птицы не проявляли. Самец в паре был молодой, с серым пятном на горле. 17–20 июня наблюдали самку, собиравшую корм, 21 июня — собиравшую траву для выстилки гнезда. Гнездо с 4 слабо насиженными яйцами (очевидно, повторное) найдено 26 июня. Оно было устроено в полуметре от верхнего края обрыва, в нише, и скрыто свисающими корнями трав.

Обыкновенный жулан *Lanius collurio*. Вероятно, пролетный самец с элементами песни (были лишь отрывистые скрипучие звуки) отмечен 15 мая на опушке бора у с. Утятского. Позднее его там не встречали. Неподалеку в елово-сосновых посадках найдено прошлогоднее гнездо жулана.

Сойка *Garrulus glandarius*. В бору у с. Утятского довольно обычна (на участке площадью 1,8 км^2 держалось 3–5 пар). Нередко находили старые гнезда, в том числе этого года, пустые и с расклеванными яйцами. Жилое гнездо с 8 слабо насиженными яйцами найдено 21 мая в молодой еловой посадке. В другом месте этого бора 31 мая видели сойку с кормом, не проявлявшую, однако, беспокойства. 23 июня наблюдали, как сойка, несмотря на атаки серых мухоловок, съела из их гнезда несколько яиц.

Галка *Corvus monedula*. В большом числе гнездится в старых тополях вдоль русла Тобола — по несколько пар в каждом. В двух осмотренных 23 мая дуплах были голые птенцы.

Ворон *C. corax*. Несколько пар гнездились в бору между селами Лесниково и Нагорское. Одна семья с 4–5 молодыми держалась к северо-востоку от с. Утятского, еще одна — у с. Бараба.

Широкохвостка *Cettia cetti*. Один самец стационарно пел в конце мая в густых пойменных ивняках р. Юргамыш у с. Менщиково. Это значительно севернее известных ранее мест обитания широкохвостки в лесостепном Зауралье (Тарасов, Ляхов, 2000; Морозов, Корнев, 2001; Рябицев и др., 2002).

Соловьиный сверчок *Locustella luscinioides*. В небольшом числе отмечен в береговых тростниках на оз. Крутали, на тростниковых озерах к востоку от с. Галишово, где, несомненно, гнездится.

Камышовка-барсучок *Acrocephalus schoenobaenus*. Поющих сам-

цов встречали местами на старицах с кустами и зарослями ивы в пойме Тобола (3–5 самцов на 400 м береговой линии), в ивняках по берегам р. Утяк между селами Лесниково и Митино.

Болотная камышовка *A. palustris*. Минимум 4 самца пели 22 мая в ивовых кустах на осоковом болоте в пойме Тобола к востоку от с. Менщиково. Еще один поющий самец отмечен 24 мая в другом месте этой же поймы.

Зеленая пересмешка *Hippolais icterina*. Один, вероятно, пролетный самец пел 23 мая в высокоствольном, паркового типа, бору без подроста и подлеска у с. Темляково. В березово-осиновых колках в долине р. Юргамыш у с. Менщиково на участке площадью 30 га отмечены два–три территориальных самца. В одном гнезде 24 июня было 5 недавно вылупившихся птенцов.

Северная бормотушка *H. caligata*. Несколько поющих самцов отмечено 24 мая в пойме Тобола к востоку от с. Менщиково, еще один — 16 июня среди богатого разнотравья на склоне коренного берега у с. Утятского.

Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus*. Вероятно, пролетные самцы пели во второй половине мая на широких просеках в бору у с. Утятского, в июне их не было слышно. На зарастающей вырубке у западной опушки этого бора в мае и июне пел один самец, еще один встречен 27 июня в березовой посадке на краю гари у дороги Менщиково — Галишово.

Зеленая пеночка *Ph. trochiloides*. Два самца стационарно пели с 14 мая по 18 июня на отрезке лесного ручья длиной 1,7 км в бору у с. Утятского. Вероятно гнездование.

Луговой чекан *Saxicola rubetra*. Отмечен лишь один раз — поющий самец 19 июня на заросшей бурьяном вырубке у опушки бора к северо-востоку от с. Нагорского.

Черноголовый чекан *S. torquata*. Несколько самцов отмечено 18 мая на заросших бурьяном неугодьях вдоль р. Утяк между селами Лесниково и Митино, одна пара — 24 мая в пойме Тобола к востоку от с. Менщиково.

Певчий дрозд *Turdus philomelos*. Довольно обычен в бору у с. Утятского: на участке площадью 1,8 км^2 было 5–7 пар, найдено несколько гнезд.

Длиннохвостая синица *Aegithalos caudatus*. На лесном ручье к северо-востоку от с. Утятского 17 мая слышали голос. На лесном болотце к юго-западу от с. Менщиково 28 мая отмечено беспокойство.

Московка *Parus ater*. Поющие самцы (5–7 на участке площадью 1,8 км^2) держались в бору у с. Утятского с 14 мая по 17 июня. Вероятно гнездование.

Князек *P. cyanus*. Отмечен только в березово-осиновых колках в долине р. Юргамыш к западу от с. Менщиково — две пары на участке площадью 30 га, где они, несомненно, гнездились.

Обыкновенная пищуха *Certhia familiaris*. Найдено гнездо в бору у с. Утятского. Оно было устроено в расщелине старой сосны на высоте 10 м. Неудачную попытку пары мухоловок-пеструшек выгнать пищух из дупла наблюдали 17 мая, позднее пеструшки загнездились в 1,5 м ниже в этом дереве. В гнезде пищух 18 мая было 6 сильно насиженных яиц, 24 мая — недавно вылупившиеся птенцы. Эта место находится существенно южнее известных ранее мест гнездования пищухи в лесостепном Зауралье (Рябицев и др., 2003).

Юрок *Fringilla montifringilla*. Один самец пел во второй половине мая на одном и том же участке высокоствольного бора в окрестностях с. Утятского, 15 мая видели его погони за самкой. Еще одного самца наблюдали 26 и 28 мая в березово-осиновых колках в долине р. Юргамыш у с. Менщиково.

Обыкновенная зеленушка *Chloris chloris*. Были весьма обычными в бору у с. Утятского. Гнездо с 6 сильно насиженными яйцами найдено 21 мая на краю еловой посадки 10–15 летнего возраста. Оно было устроено в мутовке ели на высоте 1,8 м. В этой посадке площадью 25 га обитали 3–5 пар, найдены также старые гнезда зеленушек.

Клест-еловик *Loxia curvirostra*. В бору к северо-востоку от с. Утятского 17 мая наблюдали, как стайка из 10–15 птиц спустилась с вершин сосен к лесному ручью. В ней были самцы, самки и молодые птицы. В эти же дни часто слышали позывки клестов в вершинах сосен. Т.К. и В.Н. Блиновы (1997) видели выводок клестов на юге Тюменской области. В Курганской области встреч в летнее время не было.

Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula*. Пение, вероятно, пролетных птиц слышали 17 мая в бору у с. Утятского.

Дубонос *Coccothraustes coccothraustes*. В бору у с. Утятского несколько пар дубоносов видели 17 мая. Очевидно, это были пролетные птицы.

Белошапочная овсянка *Emberiza leucocephala*. Довольно редка. Один самец пел 26 мая в березово-осиновом колке в долине р. Юргамыш у с. Менщиково. Двух поющих самцов учли 20 июня на участке площадью 28 га в колках к востоку от с. Нагорского.

* * *

Кроме перечисленных выше видов, обычными и многочисленными гнездящимися (найдены гнезда или нелетные птенцы, встречены беспокоившиеся особи с кормом) в соответствующих местообитаниях

были: **поганки** — **чомга** *Podiceps cristatus*, **серощекая** *P. grisegena* и **черношейная** *P. nigricollis*, **серый гусь** *Anser anser*, **кряква** *Anas platyrhynchos*, **серая утка** *A. strepera*, **широконоска** *A. clypeata*, **чирок-трескунок** *A. querquedula*, **красноголовая чернеть** *Aythya ferina*, **хохлатая чернеть** *A. fuligula*, **серый журавль** *Grus grus*, **лысуха** *Fulica atra*, **малый зуек** *Charadrius dubius*, **чибис** *Vanellus vanellus*, **поручейник** *Tringa stagnatilis*, **травник** *T. totanus*, **большой веретенник** *Limosa limosa*, **хохотунья** *Larus cachinnans*, **белокрылая крачка** *Chlidonias leucopterus*, **вяхирь** *Columba palumbus*, **большая горлица** *Streptopelia orientalis*, **ушастая сова** *Asio otus*, **пестрый дятел** *Dendrocopos major*, **береговая ласточка** *Riparia riparia*, **лесной конек** *Anthus trivialis*, **желтоголовая трясогузка** *Motacilla citreola*, **иволга** *Oriolus oriolus*, **обыкновенный скворец** *Sturnus vulgaris*, **сорока** *Pica pica*, **грач** *Corvus frugilegus*, **серая ворона** *C. cornix*, **садовая камышовка** *Acrocephalus dumetorum*, **славки** — **садовая** *Sylvia borin*, **серая** *S. communis* и **завирушка** *S. curruca*, **пеночка-теньковка** *Phylloscopus collybita*, **мухоловки** — **пеструшка** *Ficedula hypoleuca* и **серая** *Muscicapa striata*, **обыкновенная горихвостка** *Phoenicurus phoenicurus*, **обыкновенный соловей** *Luscinia luscinia*, **варакушка** *L. svecica*, **дрозды** — **рябинник** *Turdus pilaris* и **деряба** *T. viscivorus*, **ремез** *Remiz pendulinus*, **пухляк** *Parus montanus*, **большая синица** *P. major*, **поползень** *Sitta europaea*, **полевой воробей** *Passer montanus*, **зяблик** *Fringilla coelebs*, **черноголовый щегол** *Carduelis carduelis*, **обыкновенная чечевица** *Carpodacus erythrinus*, **овсянки** — **обыкновенная** *Emberiza citrinella* и **тростниковая** *E. schoeniclus.*

Вероятно гнездящиеся (формальных доказательств не получено): **выпь** *Botaurus stellaris*, **черный коршун** *Milvus migrans*, **болотный лунь** *Circus aeruginosus*, **перепел** *Coturnix coturnix*, **тетерев** *Lyrurus tetrix*, **коростель** *Crex crex*, **бекас** *Gallinago gallinago*, **озерная чайка** *Larus ridibundus*, **крачки** — **черная** *Chlidonias niger* и **речная** *Sterna hirundo*, **обыкновенная кукушка** *Cuculus canorus*, **полевой жаворонок** *Alauda arvensis*, **трясогузки** — **желтая** *Motacilla flava* и **белая** *M. alba*, **обыкновенный сверчок** *Locustella naevia*, **камышовки** — **индийская** *Acrocephalus agricola* и **дроздовидная** *A. arundinaceus*, **чиж** *Spinus spinus*. В населенных пунктах многочисленны: **сизый голубь** *Columba livia*, **деревенская ласточка** *Hirundo rustica*, **домовый воробей** *Passer domesticus*.

ЛИТЕРАТУРА

Бойко Г. В., Сысоев В. А. Интересные встречи птиц в Курганской, Челябинской и Свердловской областях // Материалы к распространению

птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2000. С. 46–48.

Блинова Т. К., Блинов В. Н. Птицы Южного Зауралья: Лесостепь и степь. Т. 1. Фаунистический обзор и охрана птиц. Новосибирск: Наука, 1997. 296 с.

Морозов В. В., Корнев С. В. К фауне птиц юга Западной Сибири // Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып. № 169. 2001. С. 1043–1057.

Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 608 с.

Рябицев В. К., Тарасов В. В., Примак И. В., Поляков В. Е., Грехов Р. Г., Бологов И. О. К фауне птиц юга Курганской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2002. С. 211–228.

Рябицев, В. К. Тарасов, В. В., Примак И. В., Поляков В. Е., Жуков А. А. К фауне птиц Илецко-Иковского бора // Там же, 2003. С. 153–159.

Славинских Ю.Л. К фауне птиц южных районов Курганской области // Там же. 2002. С. 235–236.

Тарасов В. В., Ляхов А. Г. Широкохвостая камышевка в Курганской области // Там же. 2001. С. 160.

Тарасов В. В., Рябицев В. К., Примак И. В., Поляков В. Е., Сесин А. В., Жуков А. А., Бологов И. О. Орнитофауна северо-восточных районов Курганской области // Там же, 2003. С. 193–213.

ДОПОЛНЕНИЯ К ОРНИТОФАУНЕ СЕВЕРО-ВОСТОКА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В. В. Тарасов[1], И. В. Примак[2], В. Е. Поляков[3]

[1] Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 марта, 202, г. Екатеринбург, 620144. E-mail: tarasov-@mail.ru

[2] Ул. Республики, д. 76–б, кв. 42, г. Ишим Тюменской обл., 627405.

[3] Факультет экологии Челябинского государственного университета, ул. Василевского, 75, г. Челябинск, 454120. E-mail: v.bird@mail.ru

По результатам наблюдений 2–15 июня 2004 г. на территории Мокроусовского и Частоозерского районов Курганской области, мы дополняем сведения по фауне птиц, полученные здесь в предыдущем году (Тарасов и др., 2003). Географические координаты основных пунктов приведены в предыдущем сообщении.

Чернозобая гагара *Gavia arctica*. На оз. Камышном у д. Журавлевка в Частоозерском р-не держались 7 пар гагар (в предыдущем году было 5 пар). Осмотрев 9 июня весь периметр озера, нашли лишь одно гнездо с расклеванным яйцом. На одном из озер к востоку от с. Частоозерье 6 июня найдено гнездо с 2 свежими яйцами, которые к 8 июня были расклеваны хохотуньями.

Кудрявый пеликан *Pelecanus crispus*. По результатам авиаучета пеликанов на водоемах северо-востока Курганской и юга Тюменской областей, произведенного нами 28 мая с самолета АН-2, полученные в предыдущем году опросные сведения о гнездовании этого вида на оз. Стекленей, болоте Куртан и некоторых других водоемах не подтвердились. На многих расположенных в радиусе 20–25 км от оз. Черного водоемах, используемых пеликанами для кормежки и отдыха, нередко встречались группы до 30–50 особей (преимущественно не достигших половой зрелости). Такие встречи и вызывают иногда ошибочные предположения о местах гнездования. В 2004 г. единственным местом гнездования пеликанов на северо-востоке Курганской области было озеро Черное, на котором мы насчитали 11 колоний по 8–25 пар, общей численностью в 160–180 пар. При осмотре с лодки некоторых колоний 12 июня в кладках обнаружили по 1–2 яйца (в среднем 1,9) на ранних и средних стадиях насиживания. Вместе с тем, по меньшей мере в отдельные годы, происходит расселение пеликанов с оз. Черного на окрестные водоемы, о чем свидетельствуют факты их гнездования на озерах Щучьем (Якименко, Гаврилин, 1995), Бутырино (Тарасов и др., 2003) и др.

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. Отмечен только на оз. Черном. На сделанных 28 мая с самолета фотографиях видно, что многие пары еще только приступили к строительству гнезд. В двух совместных с пеликанами колониях, которые мы посетили 12 июня, было около 80 и 40 гнезд бакланов с 1–5 слабо насиженными яйцами; многие гнезда были еще пустыми. На оз. Быково колонию на прошлогоднем месте не обнаружили.

Большая белая цапля *Egretta alba*. В предыдущем году была найдена нами весьма обычной на оз. Черном, но гнезд не находили. При облете озера 28 мая мы видели сидевших на гнездах белых цапель, что подтвердило наше предположение об их гнездовании здесь.

Казарки — краснозобая *Rufibrenta ruficollis* и **черная** *Branta bernicla*. По словам охотников и егерей из с. Рассвет Мокроусовского р-на, на оз. Кривом в южной части озерной системы Куртан оба вида изредка встречаются на пролете: весной летят раньше белолобого гуся, осенью — позже.

Красноносый нырок *Netta rufina*. На оз. Черном 12 июня мы встречали этих нырков несколько реже, чем в предыдущем году, впрочем, как и другие виды уток. Возможно, это связано с более поздними сроками наблюдений.

Морянка *Clangula hyemalis*. Одна самка попала 5 июня в рыбацкие сети на оз. Быково у с. Сивково в Частоозерском р-не. Она была еще в

почти полном зимнем наряде и сильно истощена. Вероятно, плохое физическое состояние явилось причиной задержки весеннего перелета или отклонения от маршрута. Двумя днями позже здесь встречена еще одна самка. В предыдущем году морянка нами не была отмечена.

Савка *Oxyura leucocephala*. На краю плес и тростниковых зарослей оз. Быково в разных местах 7 июня встречено три одиночных самца.

Черный коршун *Milvus migrans*. В 15 км к востоку от с. Частоозерье 4 июня осмотрено гнездо, построенное на березе, на высоте 11 м. В нем было 2 яйца с проклевами, из добычи — птенец лысухи. По словам начальника районного охототдела С.А. Посемейнова, эта пара гнездится здесь 3–4 года.

Беркут *Aquila chrysaetos*. Рыбак В.Н. Беспоместных (Мокроусовский р-н, с. Шелепово) в ноябре прошлого года подобрал на льду оз. Черного раненого подросшего птенца без левой кисти и сумел его выкормить. Мы увидели птицу в июне в хорошем состоянии, но не способную к полету. По словам рыбака, «такие орлы» часто охотятся над озером, чаще всего орлов он видит поздней осенью.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. В Мокроусовском р-не, в 5 км к юго-востоку от с. Б. Каменное, найдено гнездо, устроенное в центре небольшого заболоченного колка. Оно располагалось на вершине старой сухой березы, на высоте 12 м. Диаметр гнезда составлял 1,4 м, высота — 1,8 м. 11 июня в нем было 3 оперенных птенца, старший — немного крупнее канюка. Гнездо было буквально выстлано ондатровыми шкурками (больше десятка). Кроме того, в нем были останки зайца, хохотуньи, лысухи, чешуя карасей и карпов.

Белая куропатка *Lagopus lagopus*. С обочины полевой дороги у д. Журавлевка 9 июня спугнули самца еще почти в полном весеннем наряде. В предыдущем году было несколько встреч.

Пастушок *Rallus aquaticus*. Редок. В тростниках оз. Быково 10 июня слышали голос. В 2003 г. не был отмечен.

Погоныш-крошка *Porzana pusilla*. Пение одного самца слышали 8 июня на оз. Быково, больше нигде не отмечали.

Галстучник *Charadrius hiaticula*. На отмелях оз. Быково 5 июня кормились 4 пролетных галстучника.

Ходулочник *Himantopus himantopus*. На солончаковом берегу оз. Быково в начале июня найдено несколько пар и одно гнездо с сильно насиженными яйцами. В обширной колонии на мелководьях среди пастбищ у с. Куртан 14 июня видели птенцов недельного возраста.

Шилоклювка *Recurvirostra avosetta*. На прибрежной полосе солончака оз. Быково найдено 5 гнезд, в которых 8–9 июня дружно вылупились птенцы.

Мородунка *Xenus cinereus*. На оз. Быково 3 июня слышали голос.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. На оз. Быково 3 июня встречена одиночная, не проявлявшая беспокойства особь.

Азиатский бекасовидный веретенник *Limnodromus semipalmatus*. Стайку из пяти особей, затем еще 9 птиц, наблюдали 14 июня на берегу оз. Куртан у одноименного села в Мокроусовском р-не. Все птицы были в ярком брачном наряде. Ранее залет этого вида в лесостепное Зауралье был отмечен 20 лет назад: двух птиц видели в июле 1982 г. в долине Тобола на юге Тюменской области (Блинова, Блинов, 1997).

Степная тиркушка *Glareola nordmanni*. Два гнезда со свежими, еще неполными кладками из двух яиц найдены 5 и 8 июня на илистой отмели оз. Быково. Крупная колония (не менее 50 пар) обнаружена 14 июня на заметно высохших с прошлого года пастбищных лугах у с. Куртан; в осмотренных 5 гнездах были кладки из 3–4 яиц средней и сильной насиженности.

Филин *Bubo bubo*. Егеря в с. Рассвет рассказали, что 5–7 лет назад видели филина на покосе к востоку от села.

Усатая синица *Panurus biarmicus*. Один самец кормился 10 июня в тростниках на оз. Быково. Беспокойства не проявлял.

Коноплянка *Acanthis cannabina*. Как и в предыдущем году, единственная встреча поющего самца отмечена в с. Мокроусово — 15 июня.

ЛИТЕРАТУРА

Блинова Т. К., Блинов В. Н. Птицы Южного Зауралья: Лесостепь и степь. Т. 1. Фаунистический обзор и охрана птиц. Новосибирск: Наука, 1997. 296 с.

Тарасов В. В., Рябицев В. К., Примак И. В., Поляков В. Е., Сесин А. В., Жуков А. А., Бологов И. О. Орнитофауна северо-восточных районов Курганской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2003. С. 193–213.

Якименко В. В., Гаврилин Е. В. Кудрявый пеликан на юге Западной Сибири // Там же, 1995. С. 80–81.

ОБЗОР ОРНИТОФАУНЫ ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

О. В. Тарасов

Центральная заводская лаборатория, ФГУП
Производственное объединение «Маяк», ул. Ермолаева, 18; г. Озерск
Челябинской обл., 456780; E-mail: cpl@po-mayak.ru

Восточно-Уральский государственный заповедник (ВУГЗ) был организован в 1966 г. в головной части Восточно-Уральского радиоактив-

ного следа (ВУРС), образовавшегося в 1957 г. в результате крупной радиационной аварии на химкомбинате «Маяк», и находится на севере Челябинской области, на границах с Каслинским и Кунашакским районами вблизи г. Озерск и г. Касли. Эта территория относится к Восточно-Уральской провинции лесостепной зоны Западно-Сибирской низменности и находится в северной лесостепи Зауралья. С юга к заповеднику примыкает территория санитарно-защитной зоны ПО «Маяк» с каскадом промышленных водоемов. Территории заповедника и санитарно-защитной зоны, благодаря хорошей охране, представляют собой единую природоохранную систему. Орнитологические наблюдения проводили как сопутствующие при радиоэкологических исследованиях с 1980 г. по настоящее время.

Площадь ВУГЗ составляет 16616 га. В доаварийный период район был достаточно освоен в сельскохозяйственном отношении. После аварии 1957 г. население ряда населенных пунктов было выселено, сельскохозяйственные угодья выведены из использования. На значительной части территории была проведена перепашка открытых участков для захоронения выпавшей смеси радионуклидов. На этих угодьях с первых лет после аварии шло восстановление доагрикультурной растительности, которое к настоящему времени в основном закончилось. Большая часть залежей перешла в стадию молодого леса, либо степи, в зависимости от типа почвы. Исключение составляют участки бывших деревень, на которых до настоящего времени удерживается высокостебельная нитрофильная рудеральная растительность. Леса занимают около 50 % площади заповедника. Наиболее распространен березняк травяной. Сосновые и смешанные леса по площади незначительны — 5 %. Болота занимают около 7 % территории ВУГЗ, водоемы — 9 %. На территории заповедника находятся два озера — Бердениш и Урускуль, к границам примыкают озера Алабуга, Кожакуль, Малые Кирпичики и промышленные водоемы № 4, 10, 11. Береговая линия всех водоемов занята тростниковыми плавнями. Большая часть территории загрязнена долгоживущими радиоактивными веществами, прежде всего стронцием-90, выше допустимых уровней. Однако влияния радиационного фактора на численность птиц и распределение их по территории заповедника не установлено.

На изучаемой территории нами зарегистрировано 219 видов птиц.

* * *

Чернозобая гагара *Gavia arctica*. Редкий гнездящийся вид. Отмечается на большинстве водоемов исследуемой территории. Гнезда находили на оз. М. Кирпичики и водоеме №11.

Чомга *Podiceps cristatus* и **черношейная поганка** *P. nigricollis* — обычные, местами многочисленные, гнездящиеся виды. Прилетают чомги в конце апреля, отлет осенью — в октябре. Наиболее поздние встречи — 19 октября 1982 г., 22 октября 1993 г., 5 ноября 2003 г.

Серощекая поганка *P. grisegena* и **красношейная поганка** *P. auritus* встречаются довольно редко.

Кудрявый пеликан *Pelecanus crispus*. Стая из 10 птиц, сидящих на льду, отмечена на оз. Бердениш 30 апреля 1985 г. Пеликаны наблюдались до 10 июля 1985 г. на водоемах № 10, 11, на оз. Кожакуль, Урускуль. На водоеме № 11 10 мая 1989 г. отмечались 6 пеликанов. Все эти птицы были, видимо, залетными неполовозрелыми особями.

Выпь *Botaurus stellaris*. Обычный гнездящийся вид. Голос выпи слышен на водоемах с середины апреля (раннее наблюдение 9 апреля 1990 г.) до второй декады июня.

Малая выпь, или **волчок** *Ixobrychus minutus*. Встречается очень редко.

Серая цапля *Ardea cinerea*. Обычна на всех водоемах. Наиболее крупная гнездовая колония расположена на подтопленном берегу водоема № 11. Численность жилых гнезд достигает 18–20. Прилет — во второй декаде апреля, отлет — в октябре. Самое раннее наблюдение — 3 апреля 1991 г. Наиболее поздняя встреча — 19 октября 1982 г.

Большая белая цапля *Egretta alba*. Залет трех особей отмечался в июле 1984 г. и двух — 18 октября 2002 г.

Краснозобая казарка *Rufibrenta ruficollis*. Отмечается на осеннем пролете.

Серый гусь *Anser anser*. До последнего времени являлся многочисленным гнездящимся видом. Первые стаи гусей отмечаются с конца марта — начала апреля. Выводки появляются в конце мая — начале июня. После открытия сезона охоты на водоемы изучаемой территории слетаются гуси с прилегающих районов. В отдельные годы стаи вылетающих на убранные поля серых гусей насчитывали 6–8 тыс. птиц. В начале 1990-х гг. за счет повышенного количества осадков и изменения гидрологического режима заметно повысился уровень воды в озерах ВУРСа и промышленных водоемах, что повлекло за собой ухудшение условий гнездования и кормления водоплавающих и привело к значительному снижению их численности. Некоторые склонны связывать снижение численности гусей также с увеличением числа гнездящихся лебедей-шипунов.

Белолобый гусь *A. albifrons* и **гуменник** *A. fabalis* отмечались на осеннем пролете.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus* на водоемах ВУРСа наблюдается очень редко на осеннем пролете.

Лебедь-шипун *C. olor*. Довольно обычный гнездящийся вид. В 1978–1980 гг. предпринимались неудачные попытки акклиматизации шипунов на оз. Кожакуль и водоеме №10. Впервые шипун отмечен на гнездовании на оз. Бердениш в 1983 г. В 1983 г. в выводке было три птенца, в 1984 г. — четыре. В последующие годы лебеди гнездятся практически на всех водоемах изучаемого района. В настоящее время численность шипунов в летне-осенний период составляет 20–25 особей, на пролете отмечаются стаи до 35–40 птиц.

Из речных уток обычными, местами многочисленными гнездящимися видами, являются **кряква** *Anas platyrhynchos*, **серая утка** *A. strepera*, **чирок-трескунок** *A. querquedula*. Реже встречаются **чирок-свистунок** *A. crecca*, **широконоска** *A. clypeata*, **свиязь** *A. penelope*, **шилохвость** *A. acuta*.

Самыми распространенными видами из нырковых уток являются **хохлатая чернеть** *Aythya fuligula* и **красноголовая чернеть** *A. ferina*. **Гоголь** *Bucephala clangula* обычен на пролетах, особенно осеннем, в гнездовой период отмечался лишь несколько раз (в июле и августе 1985 г.).

Морская чернеть *A. marila* редкий пролетный вид.

Турпан *Melanitta fusca* в 1970–80 гг. являлся редким пролетным видом. В последнее десятилетие нами не отмечается.

Луток *Mergus albellus*, **средний крохаль** *M. serrator* и **большой крохаль** *M. merganser* — редкие пролетные виды. В гнездовой период пара больших крохалей наблюдалась 6 июня 1990 г. на оз. Бердениш.

Весенний прилет уток начинается с 8–9 апреля, когда появляются первые стайки крякв. С 13 апреля наблюдались серые утки, к концу второй декады отмечались гоголь, чирки, красноголовая чернеть. Основная масса водоплавающих прибывает с началом вскрытия водоемов. Численность уток разных видов, довольно высокая за счет незначительного влияния антропогенного фактора, за последние 10 лет снизилась в несколько раз, что обусловлено, по нашему мнению, подъемом уровня воды, затоплением мест кормления и гнездования.

Заповедный режим и достаточная кормовая база обусловили богатую фауну хищных птиц.

Скопа *Pandion haliaetus*, **беркут** *Aquila chrysaetos*, **могильник** *A. heliaca*, **сапсан** *Falco peregrinus* наблюдались только во время осеннего пролета. Осенью отмечен **балобан** *F. cherrug.*

Осоед *Pernis apivorus* достоверно отмечался лишь однажды: в конце июля 1981 г. была поймана молодая птица с переломом ноги.

Черный коршун *Milvus migrans*, **канюк** *Buteo buteo*, **болотный лунь** *Circus aeruginosus*, **перепелятник** *Accipiter nisus* и **пустельга** *Falco tinnunculus* — довольно обычные гнездящиеся хищные птицы. Значительно реже встречаются **полевой лунь** *C. cyaneus*, **степной лунь** *C. macrourus* и **луговой лунь** *C. pygargus*.

Тетеревятник *Accipiter gentilis* в гнездовой период редок, чаще встречается во время осеннего пролета.

Зимняк *Buteo lagopus* обычен на осеннем пролете. Пролет начинается в первой половине октября (раннее наблюдение — 27 сентября 1983 г.) и продолжается до конца месяца. Во время массового пролета в поле зрения наблюдателя отмечалось до 11–13 птиц. Маршруты весеннего и осеннего пролетов у мохноногого канюка, видимо, различны, т. к. весной зимняки наблюдались лишь несколько раз: 3 мая 1984 г., 3 апреля 1991 г.

Большой подорлик *Aquila clanga*. Ежегодно в заповеднике отмечается 1–2 гнезда.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla* на изучаемой территории довольно обычен. Хорошая кормовая база водоемов обеспечивает гнездование до 5–6 пар — на оз. Бердениш и на водоемах № 10 и 11. Часть орланов держится в местах обитания круглый год. Зимой чаще всего их можно наблюдать на останках погибших или загрызенных волками косуль, лосей и кабанов.

Кобчик *Falco vespertinus* и **чеглок** *F. subbuteo* — редкие гнездящиеся виды.

Перепел *Coturnix coturnix* — редкий гнездящийся вид.

Серая куропатка *Perdix perdix* немногочисленный оседлый вид, численность не превышает 70–80 особей.

Белая куропатка *Lagopus lagopus* в последние годы стала очень редка.

Рябчик *Tetrastes bonasia*. Обычный вид в горных лесах, на изучаемой лесостепной территории встречается очень редко.

Тетерев *Lyrurus tetrix*. Наиболее распространенный у нас вид куриных. Его численность достигает 300–400 особей. В зимний период в стаях отмечали до 50 птиц. В это время самцы и самки держатся, как правило, отдельно. Смешанные стаи наблюдаются редко. Токование начинается с конца февраля — начала марта и продолжается у некоторых особей до конца мая — начала июня.

Глухарь *Tetrao urogallus*. Стал довольно обычным в последние годы.

Серый журавль *Grus grus* на территории заповедника обычен. Средние сроки прилета — 18 апреля, ранний — 4 апреля 1995 г. Гнездится на болотах и заболоченных берегах озер. В предотлетный пери-

од обычно наблюдается концентрация журавлей в районе водоема № 11, когда отмечаются стаи до 700–800 птиц.

Коростель *Crex crex* — редкий гнездящийся вид суходольных лугов.

Погоныш *Porzana porzana*, **пастушок** *Rallus aquaticus* и **камышница** *Gallinula chloropus* — редкие и очень редкие малоизученные виды.

Лысуха *Fulica atra* обычна на всех водоемах ВУРСа, хотя в последние годы отмечается снижение ее численности, обусловленное, как и для утиных, ухудшением кормовых условий на водоемах.

Широко представлены в районе исследований кулики, хотя значительная часть видов встречаются лишь на пролете. Из пролетных видов отмечены **ржанка** *Pluvialis sp.*, **галстучник** *Charadrius hiaticula*, **камнешарка** *Arenaria interpres*, **щеголь** *T. erythropus*, **круглоносый плавунчик** *Phalaropus lobatus*, **турухтан** *Philomachus pugnax*, **кулик-воробей** *Calidris minutus*, **белохвостый песочник** *C. temminckii*, **краснозобик** *C. ferruginea*, **чернозобик** *C. alpina*, **грязовик** *Limicola falcinellus*, **средний кроншнеп** *Numenius phaeopus*. Среди мигрантов иногда бывают достаточно многочисленными турухтаны и плавунчики, которые держатся на водоемах до лета, остальные виды встречаются редко.

Обычными гнездящимися видами являются **чибис** *Vanellus vanellus*, **малый зуек** *Charadrius dubius*, **бекас** *Gallinago gallinago*, **большой веретенник** *Limosa limosa*.

Реже встречаются **фифи** *Tringa glareola*, **черныш** *T. ochropus*, **большой улит** *T. nebularia*, **поручейник** *T. stagnatilis*, **травник** *T. totanus*, **мородунка** *Xenus cinereus*, **дупель** *Gallinago media*.

Основными местами гнездования куликов являются побережья водоемов № 10 и 11, разливы, образовавшиеся на обводных каналах этих водоемов, оз. Кожакуль, Мал. Кирпичики, Алабуга, Бердениш. Средний срок прилета **чибиса** — 9 апреля, ранние — 29 марта 1989 г. и 31 марта 1983 г.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola* является редким гнездящимся видом. На весенней тяге наблюдали от 3 до 5 птиц. Наиболее поздняя встреча осенью зарегистрирована 30 октября 2003 г.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*, отмечавшийся нами ранее как редкий гнездящийся вид, в последнее десятилетие не встречался.

Поморник *Stercorarius sp.* — одна встреча в сентябре.

Многочисленными гнездящимися видами чаек являются **озерная чайка** *Larus ridibundus* и **хохотунья** *L. cachinnans.* Основными местами расположения колоний являются водоем № 11, оз. Бердениш и М. Кирпичики. Весной ранее всех прилетают хохотуньи, средний срок

прилета — 1 апреля, ранний — 26 марта. Осенью задерживаются до первой декады ноября. **Сизая чайка** *L. canus* и **малая чайка** *L. minutus* встречаются заметно реже.

Гнездовая колония **черноголовых хохотунов** *L. ichthyaetus*, до 13–15 пар, в течение многих лет располагалась на островках водоема №11. В последние годы места гнездования были затоплены, что привело к снижению численности этого редкого вида. Также отмечалось гнездование хохотунов на оз. Бердениш.

Речная крачка *Sterna hirundo* — многочисленный гнездящийся вид. **Малая крачка** *S. albifrons* встречается редко. Обычными гнездящимися видами являются **светлокрылая крачка** *Chlidonias leucopterus* и **черная крачка** *Ch. niger*. На северной стороне водоема 11 отмечалась в течение двух лет большая (около тысячи особей) колония светлокрылой крачки.

Сизый голубь *Columba livia*, **клинтух** *C. oenas*, **вяхирь** *C. palumbus* и **горлица** *Streptopelia turtur* — обычные виды. Возможно, не была диагностирована **большая горлица** *S. orientalis.* Раньше других видов прилетают клинтухи, ранний срок — 24 марта 1990 г., средний — 1 апреля. Вяхири прилетают в середине апреля (ранний срок — 9 апреля 1990 г.), горлицы появляются лишь к концу месяца. В 1980 г. обнаружено гнездо вяхиря, располагавшееся на трех сосенках под жилым гнездом пустельги.

Кольчатая горлица *S. decaocto* в последние 4–5 лет в гнездовой период встречается в населенных пунктах на границах заповедника — в г. Озерск, п. Метлино, с. Б. Куяш. В г. Озерске в 2002 г. была поймана молодая, еще плохо летающая особь, кормившаяся вместе с сизыми голубями.

Кукушка *Cuculus canorus* обычна на всей территории. Весенний прилет и первое кукование отмечаются в конце первой — второй декаде мая. Самое раннее наблюдение — 28 апреля 1990 г. **Глухая кукушка** *C. saturatus* регистрировалась дважды в гнездовой период.

Фауна совообразных насчитывает 10 видов.

Пролет **белых сов** *Nyctea scandiaca* в осенне-зимний период носит нерегулярный характер, в некоторые годы (например, в 1994 г.) они были довольно обычны.

Филин Bubo bubo достоверно отмечался лишь однажды, 27 мая 1982 г. в перестойном березовом лесу.

Ушастая *Asio otus* и **болотная** *A. flammeus* **совы** обычны на всей территории. Гнезда ушастой совы неоднократно обнаруживали в старых сорочьих, реже — вороньих гнездах, обычно в сосновых насаждениях. Болотную сову в течение нескольких лет отмечали на гнездо-

вании на южной стороне оз. Бердениш. В период гнездования этот вид вылетает на охоту и в светлое время суток.

Мохноногий сыч *Aegolius funereus* и **воробьиный сыч** *Glaucidium passerinum* встречаются очень редко, как правило, в зимний период. Несколько раз обнаруживали погибших птиц.

Ястребиная сова *Surnia ulula* в 1980–90 гг. постоянно встречалась в лесах заповедника, в последнее десятилетие очень редка.

К относительно обычным видам следует отнести **длиннохвостую** *Strix uralensis* и **бородатую** S. nebulosa **неясытей**, **серая неясыть** *S. aluco* редка.

В осенне-зимний период встречи сов учащаются — как за счет пролетных и кочующих особей, так и за счет лучшей просматриваемости лесов.

Козодой *Caprimulgus europaeus* — немногочисленный гнездящийся вид. Гнездо с двумя яйцами обнаружено в июне 1986 г. в сосновом бору недалеко от лежневой дороги в южной части заповедника. Несколько раз на проходящем через заповедник шоссе находили сбитых машинами козодоев.

Черный стриж *Apus apus* — обычный гнездящийся вид в населенных пунктах на границах заповедника.

Очень редко встречаются представители ракшеобразных. **Сизоворонка** *Coracias garrulus* и **зимородок** *Alcedo atthis* — залетные виды, **удод** *Upupa epops* несколько раз встречался в гнездовой период.

Пестрый дятел *Dendrocopos major*, **белоспинный дятел** *D. leucotos* и **малый дятел** *D. minor* являются обычными оседлыми видами.

Желна *Dryocopus martius* гнездится в заповеднике в количестве 1–2 пар, в холодное время года встречается регулярно, последнее относится и к **седому дятлу** *Picus canus*.

Трехпалый дятел *Picoides tridactylus* отмечался в зимний период — 2–3 раза за все время наблюдений.

Вертишейка *Jynx torquilla*. Регулярно гнездится в синичниках, вывешенных в заповеднике.

Ласточки — **городская** *Delichon urbica*, **береговая** *Riparia riparia*, **деревенская** *Hirundo rustica* — гнездятся по границам заповедника в населенных пунктах и на берегах небольших карьеров (береговушки), на территорию исследований залетают в поисках корма в гнездовой и послегнездовой периоды. Прилет весной происходит в начале мая, реже — в конце апреля (28 апреля 1989 г.). Отмечались случаи, когда при похолоданиях, в случаях раннего прилета, деревенские ласточки кормились у лунок рыбаков замерзшим мормышем (29 апреля 1989 г.).

Полевой жаворонок *Alauda arvensis* — обычный гнездящийся вид, характерный обитатель возделанных полей, пойменных лугов высоких уровней, степных участков. Прилетают жаворонки в среднем в начале апреля (ранние наблюдения — 27 марта 1995, 26 марта 2001 г.). Осенью отмечались до 15 октября (1981) Стайки **рогатых жаворонков** *Eremophila alpestris* встречаются на осенних кочевках с 7 октября по 7 ноября. **Хохлатый жаворонок** *Galerida cristata* за время наблюдений отмечен два раза в осенне-зимний период.

Лесной конек *Anthus trivialis* — многочисленный гнездящийся вид, **краснозобый конек** *A. cervinus* отмечен 12 мая 1989 г.

Желтая трясогузка *Motacilla flava* — обычный вид на пойменных лугах с богатой травянистой и кустарниковой растительностью, **желтоголовая** *M. citreola* и **желтоспинная** *M. lutea* — редкие виды. Желтые трясогузки прилетают в последней пятидневке апреля, а осенний отлет заканчивается в первой половине сентября. **Белая трясогузка** *M. alba* обычна, прилетает в среднем 10 апреля, ранний срок — 31 марта 1995 г., осенью отмечалась до 1 октября.

Обыкновенный жулан *Lanius collurio* широко распространен в районе исследований по опушкам, пустошам и пойменным лугам при наличии кустарниковой растительности. Появляется поздно, в последней декаде мая. Гнезда, помимо кустарников, дважды находили на поверхности почвы. **Большой сорокопут** *L. excubitor* обитает в районе изучения в холодный период года, отмечался в период с 9 октября по 20 апреля, чаще в октябре. Отдельные особи живут довольно оседло в течение всей зимы.

Иволга *Oriolus oriolus* — довольно обычный гнездящийся вид высокоствольных березовых лесов. Весенний прилет — 16–17 мая.

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris* — обычный синантропный вид. На территории заповедника можно встретить стаи этих птиц в послегнездовой период. Средняя дата прилета 31 марта, ранние — 23 марта 1983 г. , 24 марта 1990 г.

Сорока *Pica pica,* **серая ворона** *Corvus cornix*, и **ворон** C. corax являются обычными, местами многочисленными, оседлыми видами. Концентрируясь в прибрежной полосе озер, наносят заметный ущерб гнездам и выводкам многих видов птиц.

Грач *C. frugilegus*. Средний срок прилета весной — 16 марта. В 1995 г. отмечен прилет части грачей 28 февраля, а основной массы птиц — 7 марта, что было спровоцировано тем, что с середины февраля держались плюсовые температуры. На территории заповедника существовала колония грачей на окраине бывшей деревни Бердениш, выселенной в 1957 г. После 1987 г. колония прекратила свое суще-

ствование. В 1988 г. возникла новая колония на северном берегу водоема № 11. После подъема уровня воды в водоеме и затопления участка под гнездами, грачи переселились в березовый колок на сухом месте и на опоры высоковольтной электролинии. Во время выкармливания птенцов заметный урон их численности наносят поздние похолодания, характерные для Урала, вызывая массовую гибель грачат и отдельных взрослых особей.

Галка *Corvus monedula* использует территорию заповедника лишь как кормовую базу, гнездится же в поселке Метлино. Имеется поселение галок в разрушенной мельнице на месте бывшей д. Метлино.

Сойку *Garrulus glandarius*, по-видимому, следует отнести к редким гнездящимся видам. Во время зимних кочевок встречаются чаще. **Кедровку** *Nucifraga caryocatactes* отмечали в осенне-зимний период.

Свиристель *Bombycilla garrulus* обычен, иногда многочислен во время зимних кочевок. Прилетает осенью в первой–второй декаде октября, средняя дата 12 октября, раннее наблюдение — 25 сентября 1989 г. В середине зимы встречается значительно реже. Обратный пролет заканчивается в начале мая (поздние встречи — 23 мая 1987, 13 мая 1989 г.).

Фауна камышовок и сверчков изучена нами слабо. Речной сверчок *Locustella fluviatilis* и **обыкновенный сверчок** *L. naevia* — немногочисленные, очевидно, гнездящиеся виды. **Камышевка-барсучок** *Acrocephalus schoenobaenus* и **дроздовидная камышевка** *A. arundinaceus* — обычные, местами многочисленные виды, заселяют хорошо развитые тростниковые заросли по берегам озер. **Садовая камышевка** *A. dumetorum* является более «сухопутным» видом и встречается на суходольных лугах с развитой кустарниковой растительностью. **Зеленая пересмешка** *Hippolais icterina* — немногочисленный гнездящийся вид высокоствольных березовых лесов.

Из **славок** обычны **садовая** *Sylvia borin* и **серая** *S. communis*, типичными местами обитания являются опушки лесов, пустоши, поросшие бурьяном и кустарниками. Появляются на местах гнездования поздно, во второй половине мая. **Славка-завирушка** *S. curruca* встречается заметно реже. Пара **ястребиных славок** *S. nisoria* наблюдалась 25 июня 1987 г. в кустарниках севернее оз. Урускуль. **Черноголовые славки** *S. atricapilla* отмечены 19 мая 1985 г. в березовом лесу. В обоих случаях поведение птиц указывало на наличие у них гнезд.

Пеночки — весничка *Phylloscopus trochilus* и **теньковка** *Ph. collybita* прилетают к местам гнездования во второй половине апреля, **зеленая** *Ph. trochiloides* — позднее. Все они являются обычными гнездя-

щимися видами, обитателями березовых и смешанных лесов с выраженным подлеском.

Желтоголовый королек *Regulus regulus*, как правило, встречается в сосновых лесах и посадках в осенне-зимний период в составе смешанных стай синиц, пищух, дятлов. Редок.

Мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca* и **серая мухоловка** *Muscicapa striata* — обычные в районе исследований виды. Более многочисленны мухоловки-пеструшки, которые охотно занимают искусственные гнездовья (до 50–70 % от всех дуплогнездников). Серая мухоловка предпочитает гнездиться в естественных дуплах и укрытиях.

Из семейства дроздовых **чеканы** — **луговой** *Saxicola rubetra* и **черноголовый** *S. torquata*, **горихвостка-лысушка** *Phoenicurus phoenicurus*, **варакушка** *Luscinia svecica*, **рябинник** *Turdus pilaris*, **белобровик** *T. iliacus* относятся к обычным гнездящимся видам. **Певчий дрозд** *T. philomelos*, **обыкновенный соловей** *Luscinia luscinia*, **каменка** *Oenanthe oenanthe* встречаются заметно реже. В годы хорошего урожая рябины рябинники остаются на зиму, например зимой 2003–2004 гг. наблюдалась массовая зимовка дроздов. **Зарянка** *Erithacus rubecula*, **деряба** *T. viscivorus* отмечались лишь на пролете. **Пестрый дрозд** *Zoothera dauma* отмечен лишь однажды — 17 октября 2003 г. Поющий самец **горихвостки-чернушки** *Phoenicurus ochruros* отмечен 25 апреля 1992 г. в г. Озерске.

Усатые синицы *Panurus biarmicus* встречаются редко во время кочевок в период с начала ноября по конец января. Держатся исключительно в тростниковых зарослях озер.

Длиннохвостая синица *Aegithalos caudatus* обычна в зимний период, в гнездовой период редка. Держатся как отдельными стайками, так и в составе смешанных синичьих стай.

Ремез *Remiz pendulinus* редкий гнездящийся вид. Неоднократно находили гнезда — «рукавички» на оз. Кожакуль, М. Кирпичики, водоемах № 10 и 11.

Круглый год многочисленны **большая синица** *Parus major*, и **пухляк** *P. montanus*, обычным видом является **князек** *P. cyanus*. **Московка** *P. ater* и **обыкновенная лазоревка** *P. caeruleus* наблюдаются периодически в составе смешанных стай в холодное время года.

Поползень *Sitta europaea* на изучаемой территории редок, чаще встречается во время зимних кочевок. Отмечалось гнездование в синичнике в 1985 г. в районе оз. Бердениш.

Пищуха *Certhia familiaris* встречается редко в составе зимних стаек синиц.

Воробьи — **домовый** *Passer domesticus* и **полевой** *P. montanus* —

многочисленны в населенных пунктах. В заповеднике полевые воробьи охотно занимают искусственные гнездовья, развешанные недалеко от экспериментальных сельскохозяйственных участков.

Зяблик *Fringilla coelebs* — многочисленный фоновый лесной вид. Прилетает в первой–второй декаде апреля (средний срок прилета 9 апреля, раннее наблюдение — 31 марта 1983 г.). Отлет на зимовку продолжается до середины октября. **Юрок** *F. montifringilla* обычен во время осеннего пролета. **Зеленушка** *Chloris chloris*, **черноголовый щегол** *Carduelis carduelis*, **коноплянка** *Acanthis cannabina* обычны, **дубонос** *Coccothraustes coccothraustes* и **чечевица** *Carpodacus erythrinus* встречаются реже. Щегол и дубонос встречаются круглогодично. Зеленушка и коноплянка прилетают в конце марта — первой декаде апреля, чечевица — 15–17 мая. **Чиж** *Spinus spinus* в гнездовой период редок, чаще встречается в зимний период. **Чечетка** *Acanthis flammea* обычна в зимний период. **Урагус** *Uragus sibiricus* — довольно редкий зимующий вид. Стайки **щуров** *Pinicola enucleator* отмечены в декабре 1999 г., ноябре 2001 г. **Снегири** *Pyrrhula pyrrhula* осенью появляются в первой декаде октября (в среднем 9 октября), реже — в конце сентября (раннее наблюдение 19 сентября 2004 г.). Возможно гнездование отдельных особей в изучаемом районе, на что указывают единичные встречи снегирей в июле 1989 г. и 2004 г. **Серый снегирь** *P. cineracea* несколько раз отмечался в стайках обыкновенных снегирей. **Клесты** — **еловик** *Loxia curvirostra* и **сосновик** *L. pytyopsittacus* отмечались лишь во время кочевок. Надо отметить, что на изученной территории очень мало хвойных лесов.

Фоновым видом является **обыкновенная овсянка** *Emberiza citrinella*, многие особи держатся в районе круглый год. Довольно обычна **камышовая овсянка** *E. schoeniclus*. Весной прилетает рано (6 апреля 1986 г., 7 апреля 1988 г.), осенью наблюдалась до 13 октября (1982 г.), хотя основная масса отлетает к концу сентября. **Дубровник** *E. aureola* появляется после 20 мая, это немногочисленный гнездящийся вид пойменных лугов. Самец **белошапочной овсянки** *E. leucocephala* наблюдался один раз, 27 мая 1982 г., в перестойном березовом лесу. **Овсянки-ремезы** *E. rustica* отмечены 22 апреля 1981 г. и 19 мая 1981 г. Пролет **пуночек** *Plectrophenax nivalis* идет обычно в ноябре.

В заключение следует отметить, что, несмотря на радиационную специфику Восточно-Уральского заповедника и вынужденный характер его создания, он в достаточной мере выполняет природоохранную функцию и наравне с другими особо охраняемыми природными территориями способствует поддержанию биологического разнообразия в регионе.

К ФАУНЕ ПТИЦ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ»

О. А. Торгашов

Ул. Матросова, д. 15, кв. 92, г. Мелеуз, Башкортостан, 453854.
E-mail: ekocenter@bashnet.ru

Национальный парк «Башкирия» был создан в 1986 г., а в 1995 г. отнесен к категории особо охраняемых природных территорий федерального значения. Он расположен на юге Башкортостана в пределах горно-лесной и лесостепной частей республики (52°51' — 53°09' с. ш., 56°22' — 57°07' в. д.).

Общая площадь 82300 га, из них 2500 га приходится на акваторию Нугушского водохранилища. На востоке парк граничит с заповедником «Шульган-Таш». Рельеф национального парка грядово-увалистый, сильно расчлененный. Здесь находятся хребты Кибиз, Утямыш, Ямантау (от 400 до 700 м н.у.м.), протекают реки Белая и Нугуш. Территория парка на 90 % покрыта лесами, большей частью широколиственными. Менее трети приходится на мелколиственные породы, также имеются небольшие участки сосняков, и по северным склонам хребтов — единичные островки ельников.

На склонах южной экспозиции местами разбросаны горные степи. На западе и юго-западе национального парка в хозяйственной зоне имеются поля, суходольные и пойменные луга, а также березовые и осиновые колки.

Климат парка континентальный, за год выпадает 500–550 мм осадков.

По характеру и степени использования территория НП «Башкирия» поделена на 6 функциональных зон: заповедную, особо охраняемую, познавательного туризма, рекреационную, обслуживания посетителей и хозяйственную.

В предыдущем выпуске настоящего сборника автор опубликовал статью «Птицы национального парка «Башкирия» (Торгашов, 2003). Однако, за прошедший год встречено немало новых видов во время полевых исследований, а также проработаны некоторые литературные источники и 3 выпуска «Летописи природы заповедника «Шульган-Таш» за 1986, 1988 и 1990 гг. В последнем источнике имеется много интересных данных о встречах птиц в с. Иргизлы, его окрестностях (зона обслуживания посетителей) и в долине реки Белой, которая практически полностью, за исключением 6 км правобережья, относится к хозяйственной зоне и зоне познавательного туризма.

Краснозобая казарка *Rufibrenta ruficollis.* По наблюдениям И. А. Лоскутовой (1998), ежегодно пролетает весной в долине р. Белой группами в 7–12 особей.

Красноносый нырок *Netta rufina.* М.В. Бакалова (2003) 10 мая 2003 г. наблюдала стаю из 8–12 самцов и 14 самок на старице р. Белой возле с. Иргизлы. Для горно-лесной зоны Южного Урала этот вид отмечен впервые.

Степной лунь *Circus macrourus.* Этот вид луня имеется в списках птиц долины р. Белой в широтном течении (Баянов, Валуев, 2004). Автор также наблюдал охотящегося самца в 1 км к юго-востоку от д. Верхнебиккузино 29 апреля 2004 г. Кроме того, один степной лунь был встречен мной и С. В. Баккой 15 августа в 1 км к северо-западу от плотины Юмагузинского водохранилища.

Змееяд *Circaetus gallicus.* Отмечен М. Г. Баяновым и В. А. Валуевым (2004) в широтном течении р. Белой. Для заповедника «Шульган-Таш» и сопредельной территории характеризуется И. А. Лоскутовой (1988) как «малочисленный, нерегулярно залетный вид». С. В. Бакка и автор наблюдали охотящегося змееяда 15 августа 2004 г. над высоким правым берегом р. Белой в 1–2 км ниже плотины Юмагузинского водохранилища.

Кречет *Falco rusticolus.* Кречет отмечен И.А. Лоскутовой в с. Иргизлы на осеннем пролете 25 октября 1990 г. Одна птица белой морфы наблюдалась мной и еще семью свидетелями (группой туристов) 1 мая 2004 г. над долиной р. Нугуш в районе устья ручья Куперля. Мы наблюдали кречета с высокого берега и могли хорошо рассмотреть как верхнюю, так и нижнюю стороны тела, а также бока головы и шеи. Еще больший интерес вызвала встреча белого кречета там же 10 июля. На этот раз с автором на экскурсии было 45 человек педагогов и юннатов. Более 10 минут сокол сидел на сухой наклонной сосне, находящейся на правом, противоположном берегу Куперлинского ущелья. Удалось рассмотреть небольшие светло-бурые помарки на темени, лбу и по бокам головы. Когда же я стал подходить к птице, то она взлетела, и я разглядел почти чисто-белые грудь, брюхо и испод крыльев, темными были только концы первостепенных маховых.

Балобан *F. cherrug.* Над д. Мутай 17 апреля 2004 г. в 16.10 появился балобан, чем вызвал большой переполох среди деревенских сизарей и гнездящихся здесь грачей. Почти все взрослые грачи поднялись на крыло и плотной стаей стали атаковать сокола. Один балобан встречен 2 мая 2004 г. в 300 м к юго-востоку от д. Саргай.

Дербник *F. columbarius.* Одна особь встречена И. А. Лоскутовой около с. Иргизлы 31 мая 1990 г.

Большой кроншнеп *Numenius arquata.* Редкий пролетный вид. Старший научный сотрудник НП Л. А. Султангареева видела двух больших кроншнепов 30 сентября 2003 г. в вечерних сумерках над п. Нугуш. Птицы летели на юго-запад. А 3 октября она же наблюдала одного кроншнепа, пролетавшего на запад. М. Г. Баянов и В. А. Валуев (2004) встречали больших кроншнепов и в долине р. Белой.

Халей *Larus heuglini.* Редкая пролетная чайка. Одна особь отмечена нами на Холодном озере 30 октября 2003 г. Удалось хорошо рассмотреть особенности окраски и оценить размеры (вдвое крупнее плававших поблизости гоголей).

Бородатая неясыть *Strix nebulosa.* Отмечалась И. А. Лоскутовой 29 сентября и 4 октября 1990 г. в с. Иргизлы.

Сизоворонка *Coracias garrulus.* Редкий залетный вид. Одиночная особь отмечена И. А. Лоскутовой в урочище Проломовском 23 мая 1990 г. (у юго-восточной окраины НП).

Полевой конек *Anthus campestris.* Один полевой конек пел, сидя на одиночном невысоком дубке на южном остепненном склоне близ хутора Березовский.

Желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola.* Сотрудница заповедника «Шульган-Таш» М. В. Бакалова (2003) наблюдала на берегу р. Иргизлы двух самцов и двух самок этого вида 6 мая 2003 г. Вероятно, это были пролетные особи.

Серый сорокопут *Lanius excubitor.* Редкий вид с неопределенным статусом. Один большой сорокопут сидел на проводах у восточного берега оз. Холодного 15 апреля 2004 г. При моем приближении птица перелетела на противоположный берег водоема.

Розовый скворец *Sturnus roseus.* Редкий залетный вид. С. А. Нехорошков (2003) наблюдал одну кормящуюся птицу среди нескольких обыкновенных скворцов 6 июня 1989 г. на садовых деревьях заброшенного хутора Кашеля на правом берегу р. Нугуш в Мелеузовском р-не.

Крапивник *Troglodytes troglodytes.* Редкий гнездящийся вид. И. А. Лоскутова (1998) отмечала его дважды: 13 мая 1993 г. в захламленном нагорном широколиственном лесу в 2,5 км северо-западнее д. Максютово и 18 мая 1993 г. у недостроенного гнезда в смородиновом кусте на окраине д. Максютово.

Соловьиный сверчок *Locustella luscinioides.* Редкий вид поймы р. Белой. Встречен А.В. Лоскутовым (1998) 18 июня 1993 г.

Пестрый каменный дрозд *Monticola saxatilis.* В.А. и К.В. Валуевы (2003) встретили самку этого вида 17 августа 2002 г. в 3 км вверх по течению р. Белой от д. Верхнебиккузино.

Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros.* Самка встречена на

фронтоне недостроенного дома в п. Нугуш 16 октября 2003 г. В окрестностях этого же поселка на развалинах бетонного завода 15 и 22 апреля 2004 г. наблюдал пение и облет участка самцом горихвостки-чернушки европейского подвида. Вероятно, еще одного самца видел 22 апреля на шлюзах Нугушского гидроузла. Поиски гнезда 29 апреля и в мае не увенчались успехом, сами птицы тоже больше не встречались. Скорее всего, это были самцы-»разведчики», не сумевшие найти себе пару.

Ремез *Remiz pendulinus.* На берегу старицы между д. Иштуган и р. Белой (52°58' с. ш., 56°58' в. д.) 17 апреля 2004 г. найдено прошлогоднее гнездо ремеза на ветле.

Урагус *Uragus sibiricus.* Редкий кочующий в холодное время года вид. А.В. Лоскутов (1989) трижды встречал урагусов в с. Иргизлы Бурзянского р-на: 14 февраля 1986 г., 28 октября и 27 декабря 1988 г.

Щур *Pinicola enucleator.* Кочующий в холодное время года вид. Одна птица встречена И.А. Лоскутовой 15 января 1990 г. на черемуховых кустах в с. Иргизлы. Позднее щура замечали чаще в годы обильного плодоношения рябины.

Тростниковая овсянка *Emberiza schoeniclus.* Малочисленный вид пойменных лугов с кустарником в долине р. Белой. Данные о гнездовании отсутствуют.

Подорожник *Calcarius lapponicus.* Встречен на осеннем пролете. Четыре подорожника кормились на теплотрассовой проталине рядом с водонапорной башней в п. Нугуш 30 октября 2003 г.

* * *

Таким образом, с учетом выявленных за последний год видов, орнитофауна Национального парка «Башкирия» (к концу августа 2004 г.) представлена 212 видами птиц. Гнездование подтверждено для 129 видов. Работа по дальнейшей инвентаризации и выяснению статуса видов будет продолжаться.

ЛИТЕРАТУРА

Бакалова М. В. Весенний пролет гусеобразных на реке Белой в горно-лесной зоне Южного Урала // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2003. С. 27–28.

Бакалова М. В. Встреча желтоголовой трясогузки в горно-лесной зоне Южного Урала // Там же. С. 28.

Баянов М. Г., Валуев В. А. Птицы долины реки Белой в широтном течении // Тезисы докладов Региональной научно-практической конференции «Проблемы сохранения биоразнообразия на Южном Урале». Уфа, 2004. С. 99.

Валуев В. А., Валуев К. В. К редким видам птиц Башкирии // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2003. С. 73–74.

Лоскутов А. В. Длиннохвостый снегирь в заповеднике «Шульган-Таш» // Распространение и фауна птиц Урала. Оренбург, 1989. С. 18.

Лоскутова И. А., Лоскутов А. В. Позвоночные животные заповедника «Шульган-Таш». М., 1998. Вып. 67. 44 с.

Нехорошков С. А. Дополнительные заметки по фауне птиц РБ // Итоги биологических исследований 2001 г. Вып. 7.: Сборник научных трудов. Уфа: РИО БашГУ, 2003. С. 25.

Торгашов О. А. Птицы Национального парка «Башкирия» // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2003. С. 213–241.

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОГО И СИБИРСКОГО ПОДВИДОВ ТЕНЬКОВКИ В ГОРНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЕ ЮЖНОГО УРАЛА

О. А. Торгашов

Ул. Матросова, д. 15, кв. 92, г. Мелеуз, Башкортостан, 453854.
E-mail: ekocenter@bashnet.ru

По справочнику-определителю В. К. Рябицева (2001) «граница между европейским и сибирским подвидами **теньковки** *Philloscopus collibyta* проходит западнее Урала, примерно от п-ва Канин до Оренбурга. Это, собственно, не граница, а широкая полоса перекрывания подвидовых ареалов шириной до 100–200 км, где обитают представители обоих подвидов и их гибриды» (с. 454–455).

В апреле–июне 2002–2004 гг. автор принимал участие в ряде экспедиций, целью которых было исследование орнитофауны горно-лесной части НП «Башкирия». Всего по лесным биотопам было пройдено 138 км пеших маршрутов, в ходе которых отмечено 58 поющих самцов теньковки восточно-европейского подвида и только 3 пролетных самца (28 и 29 апреля) сибирского подвида.

С. А. Нехорошков (личное сообщение) в середине 80-х гг. прошедшего века в долине р. Нугуш регистрировал в июне сибирских теньковок выше заброшенного хутора Кашеля (53°10' с. ш., 56°50' в.д). Он же на территории Южно-Уральского заповедника встречал оба подвида в районе д. Реветь (54°15' с. ш., 57°38' в. д.), а в п. Инзер (54°18' с. ш., 57°35' в. д.) — уже только восточно-европейский.

26–29 июня 2004 г. автор прокладывал маршруты по самым вос-

точным кварталам национального парка (57°06–07' в.д) где были отмечены 12 поющих самцов восточно-европейской теньковки.

По личному сообщению М.В. Бакаловой, в последние годы на территории заповедника «Шульган-Таш» (крайний восток — 57°11' в. д.) пролетные сибирские теньковки встречаются только во второй половине апреля, а в гнездовой период слышны песни лишь восточно-европейского подвида. Интересно, что уже в Башкирском заповеднике (крайний запад — 57°43' в. д.) на гнездовании найдена только сибирская теньковка, а восточно-европейская там обычна в миграционное время (Багаутдинова, 2003).

Таким образом, в пределах горно-лесной зоны Южного Урала полоса перекрытия двух родственных форм в последние годы относительно неширока, а ось ее проходит примерно по 57°38' в. д.

ЛИТЕРАТУРА

Багаутдинова З. Т. Птицы Башкирского заповедника // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2003. С. 8–26.

Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 608 с.

О ВСТРЕЧЕ ФЛАМИНГО НА ЮГЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. А. Чибилев

Центр «Аркаим», ул. Молодогвардейцев, 57/1, Челябинск, 454021.
E-mail: steppe@steppe.ru

В Кизильском районе Челябинской области, на небольшом водоеме у подножия горы Чека (52°36' с. ш., 59°07' в. д.), 22 сентября 2003 г. отмечены три **розовых фламинго** *Phoenicopterus roseus*. Окрас оперения очень светло-серый, почти белый.

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ПТИЦ

Acanthis cannabina 42, 49, 52, 96, 124, 166, 177
- flammea 42, 75, 79, 84, 88, 96, 112, 142, 177
- hornemanni 61

Accipiter brevipes 11, 98
- gentilis 46, 77, 91, 111, 154, 170
- nisus 11, 27, 33, 46, 51, 91, 111, 129, 154, 170

Acrocephalus agricola 162
- arundinaceus 49, 116, 162, 175
- dumetorum 40, 88, 94, 104, 139, 162, 175
- palustris 48, 160
- schoenobaenus 48, 74, 79, 84, 88, 94, 138, 159, 175
- scirpaceus 24

Actitis hypoleucos 15, 35, 46, 67, 72, 77, 92, 132, 156

Aegithalos caudatus 42, 95, 112, 160, 176

Aegolius funereus 93, 146, 173

Alauda arvensis 38, 94, 100, 162, 174

Alcedo atthis 100, 115, 122, 158, 173

Anas acuta 10, 31, 45, 55, 64, 70, 79, 81, 90, 127, 153, 169
- clypeata 10, 31, 45, 65, 79, 91, 127, 162, 169
- crecca 10, 31, 45, 55, 65, 70, 79, 81, 88, 90, 109, 127, 153, 169
- penelope 10, 31, 45, 64, 70, 79, 81, 90, 127, 153, 169
- platyrhynchos 10, 31, 45, 64, 85, 88, 90, 109, 111, 127, 162, 169
- querquedula 10, 32, 45, 65, 79, 91, 109, 162, 169
- strepera 10, 45, 64, 90, 162, 169

Anser albifrons 45, 54, 70, 84, 90, 127, 168
- anser 9, 22, 30, 51, 64, 90, 162, 168
- erythropus 64, 70, 81
- fabalis 30, 55, 70, 76, 81, 127, 168

Anthropoides virgo 13, 97

Anthus campestris 180
- cervinus 29, 60, 75, 84, 174
- gustavi 83
- hodgsoni 38, 87, 94, 104, 136
- pratensis 75, 83, 94, 104, 136
- richardi 38, 122
- trivialis 38, 87, 94, 136, 162, 174

Apus apus 18, 37, 87, 93, 123, 135, 149, 173

Aquila chrysaetos 91, 154, 165, 169
- clanga 28, 121, 170
- heliaca 12, 51, 154, 169
- rapax 12, 91

Ardea cinerea 9, 21, 45, 64, 90, 152, 168

Ardeola ralloides 26

Arenaria interpres 57, 66, 99, 118, 121, 132, 156, 171

Asio flammeus 28, 37, 60, 79, 83, 86, 93, 135, 157, 172
- otus 18, 28, 37, 93, 162, 172

Athene noctua 146

Aythya ferina 10, 32, 45, 65, 76, 91, 99, 162, 169
- fuligula 10, 32, 45, 65, 70, 79, 81, 86, 88, 91, 128, 162, 169
- marila 11, 45, 55, 71, 84, 169

Bombycilla garrulus 40, 73, 87, 94, 112, 118, 120, 138, 175

Botaurus stellaris 9, 64, 90, 162, 168

Branta bernicla 54, 164
- leucopsis 54, 114

Bubo bubo 93, 102, 122, 157, 166, 172

Bucephala clangula 11, 32, 46, 65, 71, 81, 86, 88, 91, 128, 153, 169

Burhinus oedicnemus 14, 102

Buteo buteo 27, 33, 50, 91, 154, 170
- lagopus 29, 33, 56, 71, 84, 91, 150, 170
- rufinus 12, 101

Calcarius lapponicus 29, 61, 74, 84, 181

Calidris alpina 47, 58, 67, 84, 121, 133, 156, 171
- ferruginea 58, 100, 121, 133, 156, 171
- melanotos 58
- minuta 47, 58, 67, 84, 100, 132, 156, 171
- ruficollis 68
- subminuta 133
- temminckii 16, 35, 47, 58, 68, 72, 84, 133, 156, 171

Caprimulgus europaeus 37, 93, 122, 158, 173

Carduelis carduelis 42, 49, 96, 112, 162, 177

Carpodacus erythrinus 42, 87, 96, 162, 177
Certhia familiaris 95, 161, 176
Cettia cetti 52, 159
Charadrius alexandrinus 14
• dubius 14, 34, 46, 66, 92, 99, 118, 131, 162, 171
• hiaticula 14, 46, 57, 66, 72, 84, 99, 131, 155, 165, 171
Chettusia gregaria 14
Chlidonias leucopterus 18, 69, 93, 148, 162, 172
• hybrida 18
• niger 17, 47, 69, 93, 162, 172
Chloris chloris 96, 112, 161, 177
Ciconia nigra 21
Cinclus cinclus 94
Circaetus gallicus 179
Circus aeruginosus 11, 46, 65, 91, 162, 170
• cyaneus 33, 46, 71, 77, 82, 91, 129, 153, 170
• macrourus 11, 46, 51, 82, 129, 153, 170, 179
• pygargus 11, 91, 98, 170
Clangula hyemalis 56, 71, 84, 153, 164
Coccothraustes coccothraustes 29, 43, 96, 108, 112, 161, 177
Columba livia 93, 118, 135, 162, 172
• oenas 37, 93, 157, 172
• palumbus 18, 23, 47, 93, 100, 162, 172
Coracias garrulus 114, 173, 180
Corvus corax 40, 48, 73, 78, 84, 88, 94, 118, 138, 159, 174
• cornix 39, 48, 73, 79, 84, 87, 94, 138, 162, 174
• corone 39
• frugilegus 39, 48, 89, 94, 112, 162, 174
• monedula 39, 48, 94, 159, 175
Coturnix coturnix 13, 65, 86, 92, 131, 162, 170
Crex crex 34, 65, 86, 92, 162, 171
Cuculus canorus 18, 37, 47, 79, 88, 93, 103, 135, 162, 172
• saturatus 37, 78, 86, 93, 103, 135, 149, 157, 172
Cygnus bewickii 55, 81, 114
• cygnus 30, 51, 64, 76, 85, 88, 90, 127, 152, 169
• olor 10, 45, 51, 107, 108, 152, 169
Delichon urbica 94, 122, 173
Dendrocopos leucotos 37, 52, 93, 100, 158, 173
• major 19, 37, 48, 87, 93, 136, 162, 173
• minor 37, 52, 93, 158, 173
Dryocopus martius 37, 52, 87, 93, 136, 158, 173
Egretta alba 9, 90, 152, 164, 168
Emberiza aureola 43, 96, 143, 177
• citrinella 43, 96, 112, 162, 177
• hortulana 96, 105, 123
• leucocephala 43, 123, 142, 161, 177
• pallasi 74, 84
• pusilla 43, 61, 75, 79, 84, 143,
• rustica 43, 52, 143, 177
• schoeniclus 43, 49, 74, 79, 84, 96, 143, 149, 162, 177, 181
Eremophila alpestris 38, 60, 73, 84, 174
Erithacus rubecula 41, 87, 95, 176
Eudromias morinellus 66, 72, 82
Falco columbarius 33, 57, 72, 82, 121, 129, 155, 179
• cherrug 22, 169, 179
• naumanni 12
• peregrinus 22, 56, 82, 91, 112, 129, 169
• rusticolus 91, 179
• subbuteo 12, 29, 33, 46, 86, 91, 117, 123, 129, 155, 170
• tinnunculus 12, 28, 33, 65, 91, 130, 155, 170
• vespertinus 12, 33, 91, 114, 121, 129, 170
Ficedula hypoleuca 41, 79, 95, 105, 162, 176
• parva 41, 95
Fringilla coelebs 42, 88, 96, 112, 117, 162, 177
• montifringilla 42, 75, 79, 88, 96, 112, 117, 120, 124, 142, 161, 177
Fulica atra 13, 46, 66, 88, 92, 99, 162, 171
Galerida cristata 174
Gallinago gallinago 16, 35, 59, 68, 73, 83, 88, 92, 133, 162, 171
• media 78, 92, 171
• megala 35, 68
• stenura 59, 73, 83
Gallinula chloropus 13, 51, 66, 98, 155, 171
Garrulus glandarius 39, 94, 159, 175

Gavia adamsii 54
• arctica 30, 54, 70, 76, 84, 127, 152, 163, 167
• stellata 30, 54, 76, 80, 119, 126
Gelochelidon nilotica 7, 18
Glareola nordmanni 17, 51, 102, 157, 166
Glaucidium passerinum 93, 147, 173
Grus grus 13, 34, 50, 51, 65, 92, 131, 162, 170
• leucogeranus 118
Haematopus ostralegus 34, 49, 77, 86, 92, 100, 118, 121, 156
Haliaeetus albicilla 12, 33, 46, 56, 71, 77, 82, 86, 91, 101, 107, 129, 154, 165, 170
• leucoryphus 46
Himantopus himantopus 15, 121, 156, 165
Hippolais caligata 94, 160
• icterina 94, 149, 160, 175
Hirundo rustica 38, 48, 93, 162, 173
Hydroprogne caspia 7
Ixobrychus minutus 98, 99, 168
Jynx torquilla 37, 52, 78, 87, 93, 135, 159, 173
Lagopus lagopus 29, 34, 57, 72, 77, 84, 91, 130, 165, 170
• mutus 57, 72
Lanius collurio 39, 94, 137, 159, 174
• excubitor 39, 94, 137, 174, 180
• isabellinus 102
Larus argentatus 92
• cachinnans 17, 47, 162, 171
• canus 36, 47, 68, 73, 79, 88, 92, 135, 157, 172
• genei 17, 47
• heuglini 59, 68, 73, 79, 84, 134, 180
• hyperboreus 59, 83, 118
• ichthyaetus 7, 17, 51, 100, 157, 172
• melanocephalus 17
• minutus 7, 17, 47, 68, 76, 79, 148, 157, 172
• ridibundus 7, 17, 36, 47, 68, 76, 79, 92, 148, 162, 171
Limicola falcinellus 171
Limnodromus semipalmatus 166
Limosa lapponica 59, 134
• limosa 16, 36, 47, 68, 78, 86, 92, 100, 134, 162, 171
Locustella certhiola 40, 87, 138
• fluviatilis 94, 123, 175
• lanceolata 40, 88, 122
• luscinioides 159, 180
• naevia 94, 162, 175
Loxia curvirostra 43, 88, 96, 142, 161, 177
• leucoptera 74, 79, 124, 142
• pytyopsittacus 177
Luscinia calliope 41, 87, 116, 140
• luscinia 95, 162, 176
• svecica 41, 49, 61, 75, 79, 84, 95, 140, 162, 176
Lymnocryptes minimus 16, 58, 72, 77, 82, 133
Lyrurus tetrix 13, 34, 51, 91, 102, 130, 162, 170
Melanitta fusca 32, 46, 71, 76, 82, 169
• nigra 46, 56, 71, 79, 81, 128
Melanocorypha calandra 102
• leucoptera 23
Mergus albellus 11, 32, 46, 65, 77, 82, 91, 117, 128, 153, 169
• merganser 32, 65, 71, 120, 153, 169
• serrator 56, 75, 82, 128, 153, 169
Merops apiaster 18
Milvus migrans 11, 27, 33, 46, 65, 86, 91, 107, 128, 162, 165, 170
Monticola saxatilis 180
Motacilla alba 38, 48, 60, 75, 79, 84, 87, 94, 100, 137, 162, 174
• cinerea 38, 104, 122, 137, 159
• citreola 48, 52, 60, 84, 94, 137, 162, 174, 180
• flava 38, 48, 78, 83, 87, 94, 137, 162, 174
• lutea 48, 52, 174
Muscicapa striata 41, 87, 95, 140, 176
Neophron percnopterus 108
Netta rufina 153, 164, 179
Nucifraga caryocatactes 78, 88, 94, 138, 175
Numenius arquata 16, 36, 47, 68, 86, 92, 100, 134, 156, 166, 171, 180
• phaeopus 16, 36, 73, 121, 134, 171
Nyctea scandiaca 37, 60, 93, 157, 172
Nycticorax nycticorax 101
Oenanthe oenanthe 41, 60, 75, 84, 95, 140, 176
Oriolus oriolus 39, 94, 162, 174
Otus scops 146, 157
Oxyura leucocephala 50, 165
Pandion haliaetus 29, 32, 91, 98, 128, 169
Panurus biarmicus 50, 166, 176

Parus ater 42, 95, 160, 176
- caeruleus 95, 111, 176
- cinctus 87, 141
- cyanus 161, 176
- major 42, 95, 119, 141, 162, 176
- montanus 42, 79, 88, 95, 141, 162, 176

Passer domesticus 42, 61, 87, 95, 120, 142, 162, 176
- montanus 42, 49, 95, 142, 162, 176

Pelecanus crispus 6, 20, 152, 164, 168
Perdix perdix 13, 92, 121, 155, 170
Perisoreus infaustus 39, 94, 138
Pernis apivorus 27, 32, 107, 120, 153, 169
Phalacrocorax carbo 6, 20, 44, 152, 164
Phalaropus fulicarius 58, 67
- lobatus 15, 47, 58, 67, 72, 77, 84, 147, 156, 171

Philomachus pugnax 15, 23, 35, 47, 58, 67, 72, 77, 84, 92, 100, 132, 156, 171
Phoenicopterus roseus 21, 183
Phoenicurus ochruros 176, 180
- phoenicurus 41, 79, 95, 140, 176

Phylloscopus borealis 40, 75, 79, 123, 139
- collybita 40, 60, 74, 79, 84, 88, 95, 105, 139, 162, 175, 182
- inornatus 74, 88, 123, 140
- proregulus 25
- sibilatrix 95, 123
- trochiloides 40, 74, 104, 118, 139, 149, 160, 175
- trochilus 40, 60, 75, 79, 84, 88, 95, 139, 160, 175

Pica pica 39, 48, 79, 88, 94, 138, 162, 174
Picoides tridactylus 38, 78, 87, 93, 122
Picus canus 37, 93, 104, 111, 173
Pinicola enucleator 96, 101, 112, 177, 181
Platalea leucorodia 150
Plectrophenax nivalis 43, 62, 84, 96, 177
Pluvialis apricaria 14, 57, 66, 75, 84
- fulva 57, 66, 92
- sp 171
- squatarola 57, 66, 84, 121, 131, 155

Podiceps auritus 30, 44, 64, 76, 85, 90, 168
- cristatus 9, 44, 64, 90, 99, 162, 168
- grisegena 9, 44, 162, 168
- nigricollis 9, 44, 64, 90, 99, 162, 168
- ruficollis 9

Porzana parva 13, 121
- porzana 34, 66, 88, 92, 131, 155, 171
- pusilla 155, 165

Prunella atrogularis 123
- montanella 74, 78, 84

Pyrrhula cineracea 111, 177
- pyrrhula 43, 74, 79, 88, 96, 119, 142, 161, 177

Rallus aquaticus 13, 66, 155, 165, 171
Recurvirostra avosetta 6, 15, 102, 156, 165
Regulus regulus 95, 104, 176
Remiz pendulinus 49, 52, 95, 98, 101, 162, 176, 181
Riparia riparia 38, 48, 60, 73, 83, 87, 93, 136, 162, 173
Rissa tridactyla 59
Rufibrenta ruficollis 22, 54, 80, 98, 127, 164, 168, 179
Saxicola rubetra 87, 95, 160, 176
- torquata 41, 74, 87, 95, 118, 140, 160, 176

Scolopax rusticola 36, 68, 92, 100, 118, 121, 133, 156, 171
Sitta europaea 42, 88, 95, 112, 119, 141, 162, 176
Somateria mollissima 56
- spectabilis 56, 81

Spinus spinus 96, 112, 142, 162, 177
Stercorarius longicaudus 59, 73, 84
- parasiticus 59, 73, 84
- pomarinus 59
- sp 171

Sterna albifrons 18, 121, 172
- hirundo 7, 18, 36, 47, 69, 79, 86, 135, 149, 162, 172
- paradisaea 59, 73, 84, 135

Streptopelia decaocto 52, 122, 172
- orientalis 37, 52, 86, 97, 103, 162, 172
- turtur 52, 93, 103, 157, 172

Strix aluco 93, 111, 122, 173
- nebulosa 93, 122, 173, 180
- uralensis 37, 93, 122, 158, 173

Sturnus roseus 115, 180
- vulgaris 39, 48, 94, 162, 174

Surnia ulula 78, 108, 122, 173
Sylvia atricapilla 24, 95, 122, 123, 175
- borin 40, 87, 95, 139, 162, 175
- communis 40, 95, 100, 162, 175
- curruca 40, 79, 88, 95, 139, 162, 175
- nisoria 95, 175

Tadorna ferruginea 6, 10, 22, 45, 153
- tadorna 10, 51, 153

Tarsiger cyanurus 41, 74, 119
Tetrao urogallus 34, 77, 92, 131, 155, 170
Tetrastes bonasia 33, 86, 92, 121, 131, 170
Tetrax tetrax 14, 99
Tringa erythropus 15, 58, 67, 132, 171
- glareola 15, 35, 46, 58, 66, 75, 79, 84, 92, 132, 156, 171
- nebularia 15, 35, 66, 77, 86, 132, 171
- ochropus 15, 34, 46, 66, 86, 92, 132, 156, 171
- stagnatilis 15, 46, 114, 162, 171
- totanus 15, 46, 67, 92, 162, 171

Troglodytes troglodytes 49, 111, 122, 180
Turdus atrogularis 41, 79, 140
- iliacus 41, 61, 75, 79, 84, 95, 111, 141, 149, 176
- merula 116, 119, 123
- philomelos 42, 87, 95, 119, 141, 160, 176
- pilaris 41, 49, 61, 75, 79, 84, 88, 95, 108, 112, 120, 141, 162, 176
- viscivorus 42, 87, 95, 123, 141, 162, 176

Upupa epops 18, 48, 173
Uragus sibiricus 29, 43, 96, 97, 101, 111, 116, 177, 181
Vanellus vanellus 15, 34, 46, 66, 77, 92, 99, 131, 162, 171
Xenus cinereus 15, 35, 47, 67, 72, 79, 92, 132, 156, 166, 171
Zoothera dauma 176

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Для сборника представляют интерес сообщения, содержащие **новые данные по фауне и распространению птиц (места гнездования, зимовки, пути миграций, залеты и т. д.).**

Регион ограничен пространством от арктических морей до южных пределов Урала и Западно-Сибирской равнины, включая на юге Оренбургскую область и север Казахстана (на юг до широты г. Астана); на западе — восток Ненецкого автономного округа и Республики Коми, Удмуртию, Башкирию, крайний восток Кировской области и Татарии; на востоке — до р. Енисей и предгорий гор Южной Сибири.

Объем сообщений — от нескольких строк до нескольких страниц компьютерного текста в 1 интервал 12-м кеглем, но, за исключением самых интересных случаев, — **не более 10–15 строк на вид**. До трех сообщений от автора. **Если Вы желаете написать обзор фауны птиц какого-либо района, следует предварительно обсудить это с редактором.**

Рекомендуемая форма изложения — **в виде аннотированного списка**, лучше всего — по образцу сборников 2002 или 2003 гг., **без таблиц, карт и рисунков**. После названия сообщения, фамилии и инициалов автора (авторов) указать **полный адрес**, почтовый индекс, электронную почту (если есть) каждого из авторов. Ссылки и список литературы — по полной библиографической форме. Порядок перечисления видов и латинские названия следует приводить по «Конспекту орнитологической фауны…» (Степанян, 1990, 2003) или по справочнику-определителю «Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири» (Рябицев, 2001, 2002).

Убедительная просьба: давать привязки мест ваших находок к ближайшим городам или сообщать географические координаты. Следует приводить аргументы в пользу утверждений о гнездовании того или иного вида, а также свидетельства надежности определения «трудных» видов. Редактор оставляет за собой право сокращать присланные сообщения и обращаться к авторам за разъяснениями.

Мы вынуждены с 2003 г. сделать публикации платными:
за сообщение до 1 страницы (2500 символов) — 100 рублей,
за каждую начатую последующую страницу — еще 20 рублей.
Сообщения присылать до конца августа 2005 г.:

в компьютерном варианте в программах «Word–6,0; 7,0; 97 и т. д.», желательно — присоединенным файлом **в формате RTF**, **по электронной почте: riabits@etel.ru**

или на 3,5-дюймовых дискетах ***по адресу:***

РЯБИЦЕВУ Вадиму Константиновичу,
Институт экологии растений и животных УрО РАН,
ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144.

В виде исключения принимаем короткие машинописные и рукописные материалы.

Адреса для консультаций те же, тел. (3432) 2-605-605.

Деньги можно **передать** любым путем в ИЭРЖ УрО РАН В. В. Тарасову, Н. С. Алексеевой, В. К. Рябицеву. Или послать переводом:

ТАРАСОВУ Владимиру Васильевичу,
ул. Амундсена, д. 120 / 2, кв. 427, г. Екатеринбург, 620016.

В разделе «для письма» напишите: **«Оплата публикации в сборнике».**

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКТОРА 3

ОКОЛОВОДНЫЕ ПТИЦЫ ОЗЕРА АЙКЕ НА ВОСТОКЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 2004 ГОДУ
Е. В. Барбазюк 6

К ЛЕТНЕЙ ОРНИТОФАУНЕ БАССЕЙНА ОЗЕРА ШАЛКАР (неворобьиные)
В. П. Белик 8

НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ПОЛЕВОГО СЕЗОНА 2004 г. В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Ф. Белянкин 20

НОВЫЙ ЗАЛЕТ ЖЕЛТОЙ ЦАПЛИ В СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН
Н. Н. Березовиков, С. Н. Ерохов 26

ГНЕЗДОВАНИЕ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ В ВЕРХНЕМ ПРИОБЬЕ
Т. К. Блинова, В. Н. Блинов 27

ДОПОЛНЕНИЕ К ФАУНЕ ПТИЦ НИЖНЕГО ПРИВАСЮГАНЬЯ (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Т. К. Блинова, И. В. Громышев 28

ПТИЦЫ СРЕДНЕТАЕЖНОГО ПРИВАСЮГАНЬЯ
Т. К. Блинова, И. В. Громышев, М. М. Самсонова, И. А. Лютаев, А. М. Хабибулина, И. Н. Мариничева 29

К ФАУНЕ ПТИЦ РЫБОРАЗВОДНЫХ ПРУДОВ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА БАШКОРТОСТАНА
В. А. Валуев 44

ГНЕЗДОВАНИЕ КРАПИВНИКА В СРЕДНЕУРАЛЬСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ»
М. С. Галишева 49

КУЛИК-СОРОКА НА РЕКЕ УФЕ НА ЮГО-ЗАПАДЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
М. С. Галишева 49

К ОРНИТОФАУНЕ ЮГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В. А. Гашек 50

ЗАМЕТКИ К АВИФАУНЕ СТЕПНЫХ РАЙОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В. А. Гашек 51

К ОРНИТОФАУНЕ ГЫДАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА И ПОЛУОСТРОВА ЯВАЙ
П. М. Глазов, А. Е. Дмитриев 52

ПТИЦЫ ВОДОЕМОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ПРЕДГОРИЙ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ (НЕВОРОБЬИНЫЕ)
Н. М. Головина 63

К ОРНИТОФАУНЕ ПОЛЯРНОГО УРАЛА: БАССЕЙН РЕКИ ЛОНГОТЪЕГАН
М. Г. Головатин, С. П. Пасхальный 69

ЗАМЕТКИ О ФАУНЕ ПТИЦ ДВУОБЬЯ
М. Г. Головатин, С. П. Пасхальный, Д. О. Замятин 75

СВЕДЕНИЯ О ФАУНЕ ПТИЦ РЕКИ ЮРИБЕЙ (ЯМАЛ)
М. Г. Головатин, С. П. Пасхальный, В. А. Соколов 80

К ОРНИТОФАУНЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА «САМАРОВСКИЙ ЧУГАС»
А. А. Емцев 85

К ФАУНЕ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
И. Н. Еременко 88

ОРНИТОФАУНА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»
А. К. Жуков 89

К РАСПОСТРАНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПТИЦ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В. Д. Захаров 96

РЕМЕЗ В ОКРЕСТНОСТЯХ КАМЫШЛОВА
Л. С. Зеленцов 98

ЗАМЕТКИ ПО АВИФАУНЕ УСТЬЯ РЕКИ ГУБЕРЛИ И ДОЛИНЫ РЕКИ ЧЕБАКЛЫ (ВОСТОЧНОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ)
И. Г. Климова, О. К. Махрова, И. А. Морхова 98

ДОПОЛНЕНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ПО АВИФАУНЕ ГОРОДА ОРСКА
И. Г. Климова, О. С. Сеселкина, О. К. Махрова, Л. В. Катанова, Т. В. Лаврина 99

ИНТЕРЕСНЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НА ЮГЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 2004 ГОДУ
С. В. Корнев, Л. В. Коршиков, К. Чепенас 101

НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ К ОРНИТОФАУНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»
В. А. Коровин 103

О ВСТРЕЧАХ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕНЬКОВКИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
В. А. Коровин 105

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПТИЦАМИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ЛЕСНОГО
И. Б. Лашук 107

НАХОДКИ ЛЕБЕДЕЙ-ШИПУНОВ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ В БАШКОРТОСТАНЕ
А. Ф. Маматов 108

УТКИ НА ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОЕМАХ УФЫ
А. Ф. Маматов 109

О ЗИМНИХ ВСТРЕЧАХ НЕКОТОРЫХ ПТИЦ В ГОРОДЕ КУНГУРЕ (ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Д. В. Наумкин, А. А. Фуфаева, С. В. Чуприянов 111

ПЕРВАЯ ГНЕЗДОВАЯ НАХОДКА САПСАНА В ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
Н. Д. Нейфельд 112

К АВИФАУНЕ ЮГО–ВОСТОКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Н. Д. Нейфельд, В. В. Теплов 114

ИНТЕРЕСНЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. А. Нефедов 115

ЗИМНИЕ ВСТРЕЧИ ВЬЮРКОВ И ЗЯБЛИКОВ НА ЮГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. А. Нефедов 117
ИНТЕРЕСНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПТИЦАМИ В РАЙОНЕ САЛЕХАРДА В 2003–2004 ГГ.
С. П. Пасхальный, Д. О. Замятин 117
НАХОДКА КРАСНОЗОБОЙ ГАГАРЫ НА ЗАПАДЕ БАШКОРТОСТАНА
С. А. Петров, В. В. Петров 119
НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГНЕЗДОВАНИЯ ЧЕРНОГО ДРОЗДА В ОКРЕСТНОСТЯХ ВЕРХНЕГО ТАГИЛА
А. Н. Пискунов 119
ЗИМОВКА ЮРКОВ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
А. Н. Пискунов 120
К АВИФАУНЕ ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ
С. В. Попов 120
ИНТЕРЕСНЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ
С. В. Попов 123
ЮРКИ НА ЗИМОВКЕ В ПРЕДУРАЛЬЕ
С. Н. Постников 124
К ФАУНЕ ПТИЦ СИБИРСКИХ УВАЛОВ
В. К. Рябицев, А. В. Сесин, А. А. Емцев 124
СПЛЮШКА И СЫЧИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. М. Самигуллин 146
ДОПОЛНЕНИЯ К ОРНИТОФАУНЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
М. П. Сульдин 147
ЗИМНЯЯ ВСТРЕЧА ЗИМНЯКА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
Т. А. Суслова 150
ЗАЛЕТ КОЛПИЦЫ НА СРЕДНИЙ УРАЛ
В. В. Тарасов 150
К ФАУНЕ ПТИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В. В. Тарасов, И. В. Примак, В. Е. Поляков 151
ДОПОЛНЕНИЯ К ОРНИТОФАУНЕ СЕВЕРО-ВОСТОКА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В. В. Тарасов, И. В. Примак, В. Е. Поляков 163
ОБЗОР ОРНИТОФАУНЫ ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
О. В. Тарасов 166
К ФАУНЕ ПТИЦ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ»
О. А. Торгашов 178
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОГО И СИБИРСКОГО ПОДВИДОВ ТЕНЬКОВКИ В ГОРНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЕ ЮЖНОГО УРАЛА
О. А. Торгашов 182
О ВСТРЕЧЕ ФЛАМИНГО НА ЮГЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. А. Чибилев 183
УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ПТИЦ 184
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 189

Научное издание

МАТЕРИАЛЫ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПТИЦ
НА УРАЛЕ, В ПРИУРАЛЬЕ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Верстка Л. А. Хухаревой
Ответственный за выпуск Ф. А. Еремеев

Лиц. ИД № 05974 от 01.10.2001.
Подписано в печать 1.11.2004. Формат 84 × 108/32.
Уч.-изд. л. 11,4. Бумага офсетная. Гарнитура Arial Cur.
Печать офсетная. Тираж 250 экз. Заказ 2504.

Издательство Уральского университета, 620083,
Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.

Отпечатано в ИПЦ «Издательство УрГУ», 620083,
Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.