ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
УрО АН СССР
ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ им. В. П. ЧКАЛОВА
Всесоюзное орнитологическое общество
Уральское отделение

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ФАУНА ПТИЦ УРАЛА

Материалы к региональной конференции

Оренбург — 1989

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
УрО АН СССР
ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ им. В. П. ЧКАЛОВА
Всесоюзное орнитологическое общество
Уральское отделение

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ФАУНА ПТИЦ УРАЛА

Материалы к региональной конференции (краткие сообщения)

Оренбург — 1989

Редакционная коллегия:

А. В. Давыгора, кандидат биологических наук,
Э. В. Гавлюк, кандидат биологических наук, доцент

Э. В. Абдуршин

ВСТРЕЧА ОРЛА-КАРЛИКА В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ р. ИЛЕК

Сведений о распространении орла-карлика между Волгой и Аральским морем, а равно и в Предуралье практически нет (Степанян, 1975). Для Оренбургской области существуют лишь указания на отдельные встречи в прошлом веке (Эверсманн, 1866; Зарудный, 1888 и др.).

В настоящее время вид чрезвычайно редок, не установлены точные границы ареала, поэтому важны сведения даже об отдельных встречах.

Нами орел-карлик (светлой морфы) отмечен в пойме р. Илек, близ разъезда № 30 (Жулдуз) 20 июля 1988 года. Охотящаяся птица наблюдалась несколько раз в течение дня. В последующие дни не встречалась.

В. Н. Амеличев

НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА ГНЕЗДОВАНИЯ ОПОЛОВНИКА В ГОРОДЕ

В окрестностях г. Свердловска ополовник — редкий, кочующий вид. Отмечаются стайки в 12—15 особей. Чаще встречается с конца сентября по декабрь и в марте—апреле. 7 апреля 1988 г. пара ополовников наблюдалась на опушке лесного участка Ботанического сада. Птицы интенсивно носили гнездовой материал (пух, перья), укладывая его на боковой ветви сосны, на высоте 8 м. 19 апреля ополовники кормились близ достроенного гнезда, а 7 мая гнездо было разорено белкой.

В. Н. Амеличев

РАЗМНОЖЕНИЕ ВОДОПЛАВАЮЩИХ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ г. СВЕРДЛОВСКА

Если для крупных городов Европейской части СССР (Москва, Ленинград), Западной Сибири (Томск, Омск и др.) размножение некоторых видов уток (кряква, чирки, красноголовый нырок и др.) известно давно, то в городах Урала отмечено не было. В окрестностях Свердловска наиболее обычны на пролете кряква и чирок-свистунок, в небольшом числе гнездящиеся в пойме р. Пышмы, на торфяных выработках Широкой речки. 19 июня 1982 г. на акватории пруда около 0,1 га, находящегося в дендрарии Ботанического сада, обнаружен выводок свистунка из 8 утят с самкой. К моменту вылета осталось 3 птенца (остальные погибли по разным причинам). В конце июня 1988 г. здесь же найден выводок кряквы (7 птенцов с самкой), из которого выжило 4 птенца, державшихся на пруду до конца сентября.

В. Н. Амеличев

ГНЕЗДОВАНИЕ КОРОСТЕЛЯ В СВЕРДЛОВСКЕ

В результате выкашивания луговин в пойме бывшего притока р. Исети—р. Черемшанки, ныне протекающей под землей (южная половина застройки города), в конце июня 1986 г. обнаружена брошенная кладка коростеля из 8 яиц. 25 июня 1987 г. от удара косовища в кладке из 10 яиц шесть оказались разбитыми (из них одно — болтун). Из четырех яиц, помещенных в шерстяной перчатке на прогреваемое солнцем окно, появилось два птенца, которых удалось выкормить до начала смены гнездового наряда. В последующие годы на этих участках гнезд коростеля не обнаружено.

М. Г. Баянов, А. Ф. Маматов

НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОГАРЕ В БАССР

В 20 лет, предшествующие первой встрече, огарь нами в Башкирии не отмечался. В 1984 г. одиночную птицу несколько дней наблюдали на р. Худолаз, близ г. Сибай. В 1986 и в последующие годы одновременно видели до

11 уток. Стало известно гнездование 2—3 пар. Вероятно, угодья охотобщества г. Сибай — одно из последних мест гнездования огаря в республике*.

Б. А. Бельтиков

О ВСТРЕЧАХ ДЛИННОХВОСТОГО СНЕГИРЯ В КАРГАПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1986 года пары длиннохвостых снегирей неоднократно встречались во второй половине зимы на сорных травах по окраинам населенных пунктов.

Б. А. Бельтиков

ЗАЛЕТ КУДРЯВОГО ПЕЛИКАНА В КАРГАПОЛЬСКИЙ РАЙОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отмечены два случая залета одиночных особей кудрявого пеликана: в июне 1978 г. на оз. Салтасарайское и в 1983 г. на оз. Стрелковое.

Б. А. Бельтиков

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СТРЕПЕТА ИЗ ОРНИТОФАУНЫ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стрепет — ранее обычный обитатель лесостепной зоны Зауралья не встречается в данном районе с 1979 г. из-за повсеместной распашки открытых пространств, лишившей его удобных для гнездования мест.

---

* Прим. ред.: Скорее наоборот — имеет место современное расселение огаря к северу. Об этом свидетельствуют как материалы из расположенной южнее БАССР Оренбургской области (Самигуллин, Давыгора, 1985), так и данные, приводимые авторами сообщения.

Б. А. Бельтиков

ГОДОВАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ ОРНИТОФАУНЫ В ДОЛИНЕ р. МИАСС

Наблюдения проводились на территории Каргапольского района Курганской области с 1977 года за представителями 17 отрядов. Отмечены волны прилета и отлета птиц. Первыми весной появляются галки, затем грачи и чибисы, последними прилетают удоды, кукушки, иволги, козодои, черные стрижи, малые чайки. Гнездовой период длится с апреля до второй декады августа. Отмечены изменения в составе и зимней орнитофауны.

А. М. Болотников, Т. Л. Манийчук

МАССА ГАСТРОЛИТОВ В ЖЕЛУДКАХ ГЛУХАРЕЙ-САМЦОВ

У глухарей Чердынского района (север Пермской обл.) исследовали массу (вес) гастролитов. В сентябре у глухаря с массой тела 4200 г в желудке обнаружено 180 г гастролитов размерами 2—4 мм. У особи массой 5800 г, добытой в апреле, их было 40 г размерами 2—3 мм, а майской, массой 6200 г, обнаружено 35 г величиной 2,0 мм. Таким образом, за период зимы количество гастролитов уменьшается более чем в 4 раза.

М. И. Брауде

МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ ОРНИТОФАУНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Фауна птиц Урала исследуется давно, но до настоящего времени изучена недостаточно полно. В настоящем сообщении мы попытались обобщить результаты исследований по птицам Свердловской области. Предварительный список включает 254 вида, принадлежащих к 17 отрядам. Из них — 202 гнездящихся, пролетных — 28, залетных — 24. Среди отрядов наиболее многочисленными являются воробьинообразные — 108, ржанкообразные — 35, пластинчатоклювые — 27 и хищные — 23 вида. Наиболее богаты и разнообразные группы водо-

плавающих, болотных и прибрежных птиц, а также группы птиц, связанных с лесом. В Красную Книгу занесены 14 обитающих здесь видов.

М. И. Брауде

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ НА ЮГЕ СРЕДНЕГО УРАЛА

Орлан-белохвост. Последний случай гнездования на Сысертском пруду — в 1983 г. В окрестностях оз. Кожакуль (север Челябинской обл.) 2—4 сентября наблюдали пару орланов с летающим птенцом. По сообщению жителей, птицы держатся здесь регулярно. Скопа. Отмечаются изредка на пролете только одиночные особи. Сапсан. На мельзаводе в г. Свердловске несколько лет подряд отмечали взрослых птиц с выводком. Филин. Пара птиц постоянно обитает на лесном участке между оз. Синара и оз. Окункуль. Чернозобая гагара. 28 мая 1987 г. одиночная птица встречена на оз. Щелкун. Весной 1988 г. пара гагар около месяца держалась на оз. Чусовском. Камышница. Осенью 1988 г. регулярно встречалась на озере у с. Никольское. Урагус. Обычен зимой на Среднем Урале, а с 80-х годов нашего столетия гнездится. Соловей-красношейка. Одиночные особи регулярно встречаются под г. Свердловском, а в июле 1988 г. были отловлены слетки на территории электроремонтного завода.

В. А. Валуев

О РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПТИЦ В БАШКИРИИ

В сентябре 1988 г. произошел массовый залет кедровок на территорию республики. Особенно большие скопления наблюдались в Мелеузовском и Нуримановском районах, где они по своей численности превосходили остальных врановых птиц. Зимующие грачи отмечены нами в городах — Уфа, Туймазы, Мелеуз, Салават, Стерлитамак. В Мелеузе и Салавате их стаи насчитывали от 40 до 50 особей. Места концентрации — авто- и железнодорожные вокзалы.

В. А. Валуев

О ХИЩНЫХ ПТИЦАХ БАШКИРИИ

Погибший беркут найден в марте 1982 г. в г. Уфе. В 1983—1985 гг. в окрестностях д. Ирныкши Архангельского района встречалась пара больших подорликов. В 1986 г. там была зарегистрирована лишь одна птица. В Нуримановском р-не одна особь зафиксирована 14 октября 1988 г. в окрестностях пос. Чандар. В августе 1987 г. в Уфимском районе встречен кречет темной окраски. 4 сентября на стыке границ Архангельского и Иглинского районов отмечена скопа. В сентябре 1988 г. в г. Уфе найден мертвый сапсан; в настоящее время его чучело хранится в музее лесного хозяйства г. Уфы.

В. А. Валуев

ПТИЦЫ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ БАШКИРСКОЙ АССР

В 1983—1988 гг. черный аист постоянно встречался на реках Большой и Малый Кургаш в Архангельском р-не. В Балговарском р-не на р. Чермасан 8 сентября 1988 г. наблюдались самец и самка лутка. Зимородок отмечен нами 25 мая 1983 г. на оз. Большой Толпак в Кармаскалинском р-не. В 1985—1988 гг. он стабильно держится на р. Б. Кургаш. 12 сентября 1988 г. встречен на р. Уршак в Уфимском р-не. 14 мая 1985 г. на оз. Б. Толпак наблюдалась взрослая камышница. Здесь же, в сентябре 1986 г. добыта молодая особь. Другая молодая птица найдена под проводами в августе 1988 г. в Уфимском р-не.

Р. Н. Воронин

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ СЕВЕРОУРАЛЬСКОЙ ТУНДРЯНОЙ КУРОПАТКИ НА ПАЙ-ХОЕ

Хребет Пай-Хой — остаточный герцинский горный массив, который простирается от Полярного Урала в северо-западном направлении через весь Югорский п-в. Поскольку тундряная куропатка распространена до северных оконечностей Полярного Урала (Портенко,

1937), то ее нахождение на Пай-Хое вполне реально. Есть ли она здесь на самом деле, до последнего времени неизвестно (Потапов, 1985). В июле 1985 г. и в июне—августе 1987 г. мы обследовали Пай-Хой в районе оз. Сабуто и в среднем течении р. Большая Ою, но никаких следов пребывания тундряной куропатки здесь не обнаружили, хотя имеются россыпи камней с ягодниками и ерником, которые вполне соответствуют ее жизненным потребностям. Есть основания полагать, что куропатки отсутствуют и в других частях Пай-Хоя.

Э. В. Гавлюк

ГНЕЗДОВЫЕ НАХОДКИ СТЕПНОЙ ПУСТЕЛЬГИ В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. САКМАРЫ

Степная пустельга, будучи еще в 50-х годах нашего столетия обычным видом, сейчас встречается очень редко. 01.06.84 г. в долине среднего течения р. Сакмары в 3 км от села Ибрагимово (Кувандыкский р-н, Оренбургская обл.) на скале, на высоте около 80 м* найдено гнездо степной пустельги с кладкой из 5 яиц. Оно размещалось в расщелине, какой-либо выстилки не было. 16.06.85 г. в том же горном массиве на высоте 100—120 м* было обнаружено еще одно гнездо также с кладкой из 5 яиц. Месторасположение гнезда аналогично первому. В обоих гнездах происходило насиживание. В этот же период за селом Ибрагимово на правом берегу р. Сакмары постоянно держались 2—3 пары пустельг, возможно, степных. Детально район гнездования не обследовался.

---

* Прим. ред. В обоих случаях высота расположения гнезд — от подошвы горных увалов, на вершинах которых выходят скальные обнажения (шиханы) — места гнездования степной пустельги.

Э. В. Гавлюк

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЖЕЛЧНОЙ ОВСЯНКИ В СТЕПНОМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Северная граница гнездового распространения желчной овсянки в степном Предуралье проводится между селами Илек и Акбулак (Спангенберг, Судиловская, 1954). Встречи этого вида в окрестностях г. Оренбурга неизвестны. Нами желчная овсянка отмечена в гнездовой период 11.06.85 г. и 17.06.86 г. (две пары) у оз. Сулак, расположенного в городской черте. Самцы активно пели, время от времени меняя место присады. Поющие самцы наблюдались также в пойме р. Бердянка (15 км южнее г. Оренбурга) и здесь же, на проводах, в 5 и 2 км южнее объездной дороги (А. Давыгора, устн. сообщ.). Все эти встречи свидетельствуют о дальнейшем расселении желчной овсянки на северо-запад.

Э. В. Гавлюк, А. В. Давыгора

ВСТРЕЧА ОВСЯНКИ-ДУБРОВНИКА В СТЕПНОМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Южная граница распространения дубровника определяется находками в Зауралье (г. Миасс, Челябинская обл.), а в Европейской части СССР — в долине р. Волги и Суры (Спангенберг, Судиловская, 1954). О встречах этого вида в степном Предуралье сведений нет (Зарудный, 1888; Райский, 1951). Впервые в регионе дубровник отмечен нами 06.06.81 г. в пойме р. Урал, в окрестностях совхоза «Чкаловский» (20 км юго-восточнее г. Оренбурга). Поющий самец сидел на ивовых кустах, окружающих небольшое озеро.

С. Е. Генералов

ГНЕЗДОВАНИЕ ЧЕРНОГОЛОВОГО ХОХОТУНА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Долгое время считалось, что появление черноголового хохотуна в Челябинской области возможно лишь в случае залета отдельных птиц во время зимних кочевок

из Кустанайской области, где данный вид отмечен на гнездовании. Последние наблюдения позволяют отнести черноголового хохотуна к редким гнездящимся птицам Челябинской области.

21 июля 1983 г. в Увельском районе на Южноуральском водохранилище С. Б. Куклиным отмечены две птицы в стае серебристых чаек. 9 апреля 1984 г. здесь же С. М. Мирюков наблюдал еще трех птиц. 28 мая 1986 г. на Карасевском пруду у с. Верхние Караси Аргаяшского района в колонии серебристых чаек и черных крачек (5 и 8 гнездящихся пар) на площади около 100 м² В. Д. Захаровым отмечены две гнездовые пары черноголового хохотуна. 2 июня 1986 г. на р. Увелька у с. Кундравы Чебаркульского района в колонии серебристых (30 пар) и малых (50 пар) чаек, черных (25 пар) и речных (50 пар) крачек отмечено 18 гнездящихся пар черноголового хохотуна. 9 июля 1986 г. на Шершневском водохранилище в г. Челябинске в стае серебристых чаек встречена одна птица.

С. Е. Генералов

ЗАЛЕТ И ЗИМОВКА БОЛЬШОЙ БЕЛОЙ ЦАПЛИ В г. ЧЕЛЯБИНСКЕ

Зимой 1985—1986 гг. на р. Миассе в г. Челябинске отмечен залет и зимовка большой белой цапли. Причина залета не известна. Ближайшим местом гнездования большой белой цапли являются низовья р. Урал. Нам удалось проследить судьбу этой птицы.

16 декабря 1985 г. она встречена в пойме р. Миасс на двухкилометровом участке, не замерзающем вследствие сброса воды из Шершневского водохранилища. У птицы отсутствовали три первостепенных маховых пера на левом крыле. Однако 31 марта 1986 г. у нее были все маховые перья, что свидетельствует о благополучно закончившейся линьке.

Во время отдыха большая белая цапля укрывалась в прибрежном кустарнике или прямо на снегу. Белая окраска, желтый клюв и ноги делали птицу менее заметной для серых ворон и сорок, постоянно ее преследовавших. Кормилась цапля рыбой на мелководье незамерзающего участка р. Миасс длиной около 2 км и шири-

ной 7—12 метров. По мере таяния снега птица часто встречалась на прибрежных полях, где кормилась со стаей грачей.

Во второй половине апреля, когда полностью растаял снег и вскрылась река, цапля откочевала с места зимовки.

М. Г. Головатин

ВЕЛИЧИНА ГНЕЗДОВОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГУСЯ-ГУМЕННИКА В БАССЕЙНЕ р. ВОЙКАР

Гусь-гуменник в бассейне р. Войкар гнездится на участках термокарстовой тундры на плакоре. Плотность гнездования за два года исследований (1987—1988 гг.) на двух стационарах составляла 0,29—0,44 пары/км^2. Исходя из этого, величину гнездовой популяции можно оценить в 15—30 пар.

М. Г. Головатин

ПЛОТНОСТЬ ГНЕЗДОВАНИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ В ДОЛИНЕ р. ВОЙКАР

Протяженность р. Войкар составляет 65 км. В 1987—1988 гг. здесь проводили лодочные маршруты. Всего встречено на гнездовании 6 пар орлана-белохвоста, 1 пара беркута в 1987 г., 1 пара чеглока, 3—4 пары дербника, 1 пара сапсана. 11 июня 1987 г. в среднем течении реки отмечена одиночная скопа.

М. Г. Головатин

ПЛОТНОСТЬ ГНЕЗДОВАНИЯ ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ ПТИЦ В ПОЙМЕННОМ ЛЕСУ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. ВОЙКАР

В полевые сезоны 1987—1988 гг. плотность гнездования воробьинообразных птиц на участке площадью 40 га составляла: пеночки-таловки (соответственно) — 40 и 45 пар/км^2, овсянки-крошки — 45 и 38, пеночки-веснички — 30 и 20, варакушки — 28 и 23, юрка — 20 и 28, темнозобого дрозда — 8, белобровика, сибирской зави-

рушки, пеночки-теньковки — 5 и 3, малой мухоловки — 3 и 5, сероголовой гаички, кукши, камышовой овсянки, белой трясогузки — 3. Славка-завирушка, овсянка-ремез, щур гнездились только в 1987 г. с плотностью 3 пары/км^2.

А. В. Давыгора

КАМЕННЫЙ ВОРОБЕЙ — ГНЕЗДЯЩИЙСЯ ВИД СТЕПНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Небольшая гнездовая популяция каменного воробья известна нам с середины 60-х гг. в единственном пункте степного Предуралья — с. Междуречье (Беляевский район Оренбургской обл.). Первоначально (60-е—начало 70-х гг.) птицы гнездились в расщелинах сложенных из камня стен зимних кошар. С их разрушением гнезда размещают под шиферными крышами надворных построек (сараев, кладовых). Несколько пар с 1986 г. регулярно гнездится в пустотах бетонного перекрытия автобусной остановки у с. Междуречье. Здесь 16.06.84 г. из выводка добыт неуверенно летающий слеток. Его размеры (мм): длина тела — 133; крыла — 85; хвоста — 50; клюва — 10; цевки — 19. Масса — 27,3 г. Наиболее ранний прилет отмечен 29.03.86 г. Во второй декаде июля 1984 г. наблюдалась послегнездовая стая численностью около 90 особей.

А. В. Давыгора, С. В. Корнев

ГОРНАЯ ЧЕЧЕТКА В СТЕПНОМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Гнездится (исследования 1979—1988 гг.) на водоразделах рр. Уртабуртя и Бурды — левобережных притоков р. Урала и, видимо, в других, сходных по условиям районах региона. Населяет каменистую всхолмленную степь. Гнездовой биотоп — заросли степных кустарников по лощинам, балкам и склонам увалов южной экспозиции. Прилетает в первой декаде апреля. Гнездовой период растянут. Брачное поведение самцов (демонстрационные полеты, ухаживание за самками) наблюдалось 22.04.83 г. 15.04.84 г. Попытка спаривания — 28.04.86 г.

Гнезда в отдельно стоящих кустах по периферии зарослей. Ранневесеннее гнездо (строительство закончено 28.04.86 г.) у основания куста спиреи в углублении почвы под нависающими листьями ковыля. Поздневесенние (п = 3; окончание постройки в конце второй—начале третьей декады мая 1986 г.) на кустах спиреи. Размеры яиц полной кладки (мм): 15,7×12,3; 16,7×12,5; 17,0×12,2; 16,8×12,4; 16,2×12,5. Масса, соответственно (г): 1,26; 1,40; 1,33; 1,33; 1,28. В питании (весна) — вытаивающие из снеговых наносов семена диких трав, распускающиеся листья спиреи. В июне—июле — созревшие семена татарника (летучки отрывает) и птичьей гречишки.

В. М. Емельянов

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕГО УЧЕТА ПТИЦ НА р. БОЛ. ИНЗЕР И р. ИНЗЕР

Учет проведен 22—25.04.83 г. при сплаве на участке реки от д. Карталы до д. Карагайка (160 км). Учтено (особей): кряква — 10, чирок-свистунок — 100, шилохвость — 2, чирок-трескунок — 115, ширсконска — 4, гоголь — 14, большой крохаль — 34, коршун — 5, тетеревятник — 5, сапсан — 2, мелкие сокола — 1, серый журавль — 5, малый зуек — 5, черныш — 27, перевозчик — 89, зимородок — 1. Не определены из-за большого расстояния до встреченных особей: утки речные — 20, чирки — 78, нырки — 6.

В. М. Емельянов

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТА ПТИЦ НА р. БЕЛАЯ И р. УФА

Учеты проведены при сплаве в верхнем течении р. Белой (с. Кага—хутор Кузнецов, 230 км, 28.07—10.08.81 г.); р. Уфа (с. Сарана, Свердловской обл.—устье р. Тюй, 186 км, 23.07—2.08.82 г.). Число особей каждого вида приводится соответственно для названных участков рек: цапля серая — 0,4; серый гусь — 0,2; кряква и серая утка — 45,13; чирки — 8,8; скопа — 7,7; коршун — 9,44; полевой лунь — 1,0; перепелятник — 3,0; канюк — 28,29; мелкие сокола — 11,25; серый журавль — 0,2; малый зуек — 0,15; чибис — 8,0; кулик-со-

рока — 0,6; черныш — 7,14; перевозчик — 11,87; зимородок — 6,5.

В. М. Емельянов

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТА ПТИЦ НА р. БЕЛАЯ 5—7.09.85 г.

На участке реки от с. Старосубхангулово до Каповой пещеры (45 км) учтено (особей): кряква — 5, чирок-свистунок — 2, тетеревятник — 1, перепелятник — 5, канюк — 5, чеглок — 4, другие мелкие сокола — 6, черныш — 1, перевозчик — 2, зимородок — 9, кедровка — 2, оляпка — 1.

В. Д. Захаров

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕСТРОГО ДРОЗДА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Ранее пестрый дрозд отмечался в горно-лесных районах Челябинской области только в период весенне-осенних миграций. В 1986—1988 гг. поющие самцы встречены в темнохвойных лесах Южного Урала от г. Ицыл на севере до хр. М. Иремель на юге. Численность в елово-пихтовых лесах составила 1,8—3,0 особей/кв. км, в елово-березовых до 1,2 особей/кв. км. Слетки зарегистрированы в августе 1987—1988 гг. на хр. М. Урал. Вышесказанное подтверждает факт гнездования пестрого дрозда на Южном Урале.

В. Д. Захаров

ВСТРЕЧИ ПЕНОЧКИ-ТАЛОВКИ И ЧЕРНОЗОБОГО ДРОЗДА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

В мае 1986—1987 гг. поющие самцы пеночки-таловки отмечены в елово-пихтовом лесу на хр. М. Урал (около 55-й параллели), при этом численность составила 4,0—5,0 особей/кв. км. Один поющий самец чернозобого дрозда встречен в мае 1988 г. в верхнем течении р. Уфы, другой обнаружен в этот же период в елово-пихтовом лесу на западном склоне хр. М. Урал.

Е. В. Карев

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ ОРНИТОФАУНЕ г. СТЕРЛИТАМАКА

С 09.09.88 г. по 21.01.89 г. в течение 76 дней в жилом массиве было отмечено 30 видов птиц. Наибольшая частота встречаемости характерна для домового воробья и сизого голубя (100%), большой синицы (98,7%), галки (94,7%), серой вороны (77,6%), сороки (75,0%), снегиря (55,3%). У серой вороны и снегиря частота встречаемости возрастала, у грача — уменьшалась, у домового воробья, сизого голубя, большой синицы и галки — оставалась стабильной, у сороки и полевого воробья — колебалась.

С. В. Корнев

О ВСТРЕЧЕ ЗЕЛЕНОЙ ЩУРКИ У г. ОРЕНБУРГА

В конце прошлого века отмечено несколько залетов зеленой щурки в район г. Оренбурга. Птицы встречались в стаях золотистой щурки (Зарудный, 1897).

Более поздние сведения о наблюдениях этого вида у г. Оренбурга в литературе отсутствуют.

28.05.79 г. одиночная особь зеленой щурки встречена нами в окрестностях города. Птица наблюдалась на проводах ЛЭП в пойме р. Урал. В последующие годы этот вид у г. Оренбурга не отмечался.

В. В. Кривощеков

ВСТРЕЧИ ДЛИННОХВОСТОГО СНЕГИРЯ И ЧЕРНОГОРЛОЙ ЗАВИРУШКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ г. ПЕРМИ

Последние годы в третьей декаде октября—начале ноября в окрестностях г. Перми нами впервые отмечены кочующие длиннохвостые снегири. 25.10.87 г. самец урагуса встречен в ивняке в районе п. Закама. Птица перелетала низом на небольшие расстояния. 07.11.87 г. на приманную птицу отловлено 2 самца. 20.10.88 г. самка этого вида замечена в стае воробьев в г Закамске.

21.10.88 г. на р. Гайва поймана самка, а в районе ст. Ласьва — самец. Длиннохвостые снегири перелиняли в клетке. Питаются семенами конопли, лопуха, подсолнуха, рапса и др.

26.09.88 г. в районе закамских лугов нами поймана черногорлая завирушка. 08.10.88 г. пара этих птиц отмечена в тех же местах. По-видимому, черногорлая завирушка может быть внесена в список пролетных птиц Пермской области.

С. Г. Ливанов

ВСТРЕЧИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОДВИДОВ ТЕНЬКОВКИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Исследования проводились в 1983—1987 гг. на территории Пригородного района, приданной г. Кировограду, и в окрестностях г. Нижнего Тагила Свердловской области. Зарегистрировано несколько самцов с «европейским типом» песни. В 1984 г. встречено два самца в начале июня в лесах Висимского заповедника, в 1986 г. — по одному во второй половине мая в лесах близ п. Висим и во второй половине августа на зарастающих вырубках в Пригородном районе. Кроме этого, ежегодно регистрировалось за сезон по нескольку встреч (от 2 до 10) самцов со «смешанным сибирско-европейским типом» песни.

С. Г. Ливанов

ВСТРЕЧИ ПЕНОЧКИ-ТРЕЩОТКИ И ТАЛОВКИ В ПРЕДЕЛАХ ЮЖНОЙ ТАЙГИ СРЕДНЕГО УРАЛА

В 1-й половине июля 1984 г. встречен один самец пеночки-трещотки в Висимском заповеднике. В 1986 г. зарегистрировано по одному самцу в лесах близ г. Верхний Тагил в конце мая и в конце июня, в Висимском заповеднике в июне и близ п. Висим в августе. Самцы таловки в 1986 г. регулярно отмечались в окрестностях п. Висим, г. Верхний Тагил и в Висимском заповеднике в 1-й половине лета, а в 1987 г. в г. Нижний Тагил один самец встречен в июне. В предыдущие годы (с 1983 г.) данный вид не регистрировался.

А. В. Лоскутов

ДЛИННОХВОСТЫЙ СНЕГИРЬ В ЗАПОВЕДНИКЕ «ШУЛЬГАН-ТАШ»

Зимняя орнитофауна района заповедника довольно хорошо изучена (Кириков, 1952; Филонов, 1963), но длиннохвостый снегирь до 80-х годов нашего столетия не отмечался. За последние годы особи этого вида трижды наблюдались в с. Иргизлы: самка 14.02.86 г., самка и самец 28.10.88 г., самец 27.12.88 г.

А. В. Лоскутов

ПРОЛЕТ МАЛОГО ЛЕБЕДЯ ЧЕРЕЗ БАШКИРИЮ

В заповеднике «Шульган-Таш» 16.04.86 г. была отмечена стая из 34 малых лебедей, кормившихся на лугу в 11 часов 30 минут местного времени. Территория Башкирии не относится к зоне традиционных пролетных путей этого вида, однако есть сведения о единичных встречах малого лебедя в дельте р. Волги (Красная книга РСФСР, 1985).

А. Г. Ляхов

НОВАЯ ВСТРЕЧА ПОМОРНИКА НА УРАЛЕ

Пара гнездящихся короткохвостых поморников добыта Л. П. Сабанеевым в 1868 г. на Богословском пруду (ныне г. Карпинск Свердловской области). В литературе других данных о встрече поморников на Урале нет. Нами одиночный поморник (вид не определен, наблюдался в сумерках) отмечен 25 июня 1987 г. на Б. Княспинском озере в окрестностях Карпинска. Птица сидела на воде и подпустила лодку на 20—30 метров.

А. Ф. Маматов

ПЕРВАЯ КОЛОНИЯ СЕРЕБРИСТЫХ ЧАЕК В БАШКИРИИ

Встречи одиночных пар имели место в 1963 и 1978 гг. В 1980 г. загнездилось 1—2 пары, 1986 г. — 18 пар (об-

щая численность 80 экз.), в 1987 г. — около 30 пар (136 экз.). Новая колония сформировалась на островке оз. Карагайлы (Зауралье) в течение 8 лет.

А. Ф. Маматов, В. А. Валуев

О СТАТУСЕ РЕМЕЗА В БАШКИРИИ

В работах предыдущих авторов достоверных сведений о гнездовании ремеза в Башкирии нет. Первые гнезда обнаружены нами в нижнем течении р. Белой у оз. Толпак в 1983 г., а в 1985 г. там же нашли 7 гнезд. В последующие годы гнездование подтверждено. Ремез — новый, редко гнездящийся вид Башкирии.

А. Ф. Маматов, М. Г. Баянов, В. А. Гузеев

ВСТРЕЧИ ПТИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНЫЕ КНИГИ МСОП, СССР, РСФСР В БАШКИРИИ

В сообщении использованы данные с 1980 г. Кудрявый пеликан — Иглинский район. Черный аист — заповедник «Шульган-Таш», национальный парк «Башкирия» (Мелеузовский район). Краснозобая казарка — Краснокамский район. Скопа — Белорецкий, Бурзянский, Иглинский, Мелеузовский районы. Курганник — Абзелиловский район. Змееяд — Зилаирский район, Башгосзаповедник. Степной орел — крайний Юг и Юго-Восток Башкирии. Могильник — хребет Шайтан-Тау, Иремельский горный массив. Беркут — Баймакский, Балтачевский, Благоварский, Бирский, Благовещенский, Иглинский, Мелеузовский, Туймазинский районы. Орлан-белохвост — у г. Нефтекамска, Стерлитамакский район. Кречет — Белорецкий район, Башгосзаповедник. Балобан — недалеко от Стерлитамака. Сапсан — Кугарчинский, Мелеузовский районы, Башгосзаповедник, г. Стерлитамак, гора Иремель. Стерх — Краснокамский, Дюртюлинский районы. Дрофа — Стерлитамакский, Федоровский районы. Стрепет — Баймакский, Хайбуллинский районы. Кречетка — Абзелиловский, Баймакский районы.

Ю. Н. Минеев

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОГОЛЯ В МАЛОЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЕ

На п-ове Русский Заворот (междуречье рр. Хабуйки и Янгутейяхи) на озерах, протоках и реках постоянно регистрировались одиночные и стайки гоголей (3—10 особей) в июне—августе 1988 г. Основную массу птиц составляли селезни, самки встречались редко. 17—30 июня отмечен пролет гоголей (по 3—42 особи) вдоль морского побережья к северу. Плотность населения уток в летний период в данном районе составила 1,7 особи на 1 кв. км, гнездование не установлено.

Ю. Н. Минеев

БЕЛОЩЕКАЯ КАЗАРКА В МАЛОЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЕ

Белощекая казарка весной встречается вдоль побережья Баренцева моря от п-ова Канин до Югорского п-ова. Отдельные стайки (3—8 особей) залетают в устье р. Печоры, острова Коровинской губы (о. Ловецкий). На п-ове Русский Заворот пары и группы до 3—6 птиц наблюдались на озерах, протоках и по берегам рек до 20 июня 1988 г. С началом отлета на линьку белолобых гусей и гуменников исчезли и белощекие казарки. В районе оз. Белузейто (около 68° 50′ с. ш.) в 1987 г. рыбаки встретили два выводка (3 и 5 птенца) белощеких казарок. В 1974 г. на о. Колгуев загнездилось 6 пар казарок, кладки которых впоследствии были разорены песцами.

Ю. Н. Минеев

ВСТРЕЧИ ПОЛЯРНОЙ ГАГАРЫ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ПЕЧОРСКОЙ ГУБЫ

В междуречье рр. Хабуйки—Янгутейяхи на побережье Печорской губы и приморских озерах 18—20 июня 1988 г. встречены две пары и две одиночные полярные гагары. В дальнейшем птицы нами не регистрировались.

С. А. Нехорошков

О НОВОЙ НАХОДКЕ ЧЕРНОЗОБОЙ ГАГАРЫ В БАШКИРИИ

Одиночная, вероятно, кочующая птица встречена 18 июня 1985 г. в окрестностях пос. Нугуш Мелеузовского района. Держалась в нижней части Нугушского водохранилища, лежащего в полосе широколиственных лесов на границе Предуралья и Южного Урала.

С. А. Нехорошков, Н. М. Лоскутова

О НОВЫХ НАХОДКАХ ПЕСТРОГО ДРОЗДА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Пестрый дрозд отмечен на территории Башкирского государственного заповедника в мае, июне, июле 1966 г., осенью 1982 г., весной 1983 г. («Летописи природы»). Пение этой птицы мы слышали также в июне 1984 г в окрестностях пос. Инзер Белорецкого района и в том же году несколько раз в районе горы Иремель. Последняя находка может свидетельствовать о гнездовании пестрого дрозда, так как активное пение птицы отмечалось с 4 по 14 июля на одном и том же участке темнохвойного леса с примесью березы. Гнезда, к сожалению, найти не удалось.

С. Г. Нехорошкова, С. А. Нехорошков

ДОПОЛНЕНИЯ К ФАУНЕ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ БАШКИРИИ

На незамерзающей части Кармановского водохранилища на северо-западе Башкирии в январе 1983 г. впервые на зимовке отмечены чирок-свистунок (1 птица) и обыкновенная чайка (3 птицы). Одновременно здесь же наблюдали одиночного самца обыкновенной овсянки, который держался на пустырях вместе с полевыми воробьями. Эта находка — самая северная точка зимовки овсянки в пределах Южного Урала.

С. П. Пасхальный, В. В. Черемисин

ЗАЛЕТ ВОЛЧКА В НИЗОВЬЯ р. ОБИ

Молодая самка (возраст по наличию охристых каемок перьев на спине и пневматизация черепа) добыта 19.10.88 г. в районе Харбейского сора (25 км СВ г. Салехарда) на участке пойменного заболоченного кочкарника. Основные промеры: длина крыла — 149,0 мм, цевки — 43,6 мм, клюва (от границы оперения) — 42,1 мм, масса — 152 г. Птица очень жирная (отложения на брюхе и зобе); в желудке кости мелких рыб, немного растительных остатков. К моменту добычи установился снеговой покров, озера и небольшие протоки замерзли, но местами сохранились полыньи.

Б. Г. Петров, В. В. Борисов

ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛИМИНАЦИИ ЯИЦ СИЗОЙ ЧАЙКИ ОТ ИХ ОКРАСКИ

Типичная маскирующая окраска яиц сизой чайки в период гнездования зеленовато-серых и оливково-серых тонов с серыми, бурыми или оливковыми пятнами. Изменчивость окраски яиц происходит в двух направлениях: в сторону общего потемнения и посветления. Доля яиц с аномальной голубой, белой или кремовой однотонной окраской составляла в разные годы 0,5—1,5%. Яйца с аномальной светлой окраской уничтожаются серыми воронами практически все. Таким образом, отклонение окраски яиц от типичной в сторону светлых тонов приводит практически к полной их элиминации.

С. Н. Постников

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗИМОВКИ ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦ В ПРЕДУРАЛЬЕ И НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Ранее мы встречали одиночных зимующих перелетных птиц (ястреб-перепелятник, жаворонки и др.), однако чаще всего это были больные или старые особи, большая часть которых не доживает до весны. Массовые зимовки коррелируют с урожайными годами на основные

зимние корма. Так, у чечеток, по нашим 35-летним наблюдениям, отмечен 4-летний цикл с максимумом на 4-й год. После пика идет депрессия мигрантов, а затем постепенное нарастание количества птиц в течение 2-х лет. У чижей, питающихся зимой теми же видами кормов, что и чечетки, не отмечено строгой цикличности динамики зимующих птиц. В декабре 1988 и январе 1989 гг. отмечено 138 стаек чижей по 5—25 особей в пригородном районе Свердловска (юго-западная окраина). С ноября 1988 по февраль 1989 гг. отмечено 232 стаи зимующих дроздов-рябинников. Птицы ночевали в пригородных сосновых лесах, а питались ягодами рябины, мелких яблок и боярышника в городе. Зеленушки ежегодно в количестве 50—80 особей наблюдаются нами в Широкореченском лесном массиве. Урагус, ранее редко встречавшийся на осенней миграции в октябре—ноябре, последние 7 лет стал в это время обычен и многочислен, а зимой 1988—1989 гг. 45 птиц отмечены в декабре—феврале на торфянике в районе Визовского пруда.

С. Н. Постников

НЕОБЫЧНЫЕ ЗАЛЕТЫ И ГНЕЗДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ПТИЦ НА УРАЛЕ

23 июня 1968 г. на р. Бабка (приток р. Сылвы) в Пермской области, у ст. Кукуштан в 10 часов утра нами наблюдался зимородок. Одиночная птица рыбачила с сухой ветки валежника в 2 метрах от обрывистого берега. 28 мая 1969 г. в районе ст. Адищево (Пермская область) на лугу наблюдали 2 кормящихся удодов, а в 60—80-летнем ельнике с примесью березы в разреженной колонии рябинников найдено 8 гнезд обыкновенной чечетки (в 2-х были 2-дневные птенцы, а в остальных насиженные яйца). Все гнезда располагались на елках. 5 июля 1979 г. в районе станции Собь (Полярный Урал) встречен одиночный самец зяблика. 5 дней птица пела в первой половине дня. 25 августа 1959 г. на ясене в г. Перми наблюдался птенец обыкновенной чечетки, которого кормил самец, прилетая через каждые 30 мин.

В. Н. Руди

РОЗОВЫЙ СКВОРЕЦ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Большая колония розовых скворцов существовала в 60-е годы нашего столетия в гипсовом карьере пос. Дубенской Беляевского района. При добыче гипса во время взрыва взрослые скворцы поднимались в виде розового облака, а оставшиеся на гнездах нередко гибли. Погибали кладки и птенцы. В то же время скворцы ежегодно прилетали в карьер. В 70-е годы стая розовых скворцов была отмечена в степи в окрестностях ст. Донгуз (20 км южнее г. Оренбурга).

В. К. Рябицев

СЕРЫЙ СНЕГИРЬ ПОД СВЕРДЛОВСКОМ

Группу кормящихся птиц из двух самцов и самки мне довелось наблюдать и хорошо разглядеть 8 марта 1989 г. в смешанном лесу рядом с городом. О редких залетах в окрестности Свердловска сообщают птицеловы.

В. К. Рябицев

ЧЕРНЫЙ ДРОЗД В ОКРЕСТНОСТЯХ ВЕРХНЕГО УФАЛЕЯ

На экскурсиях в первых числах мая в 1980, 1983, 1986 и 1988 гг. у ст. Коркодин встречали одиночных поющих самцов. Предполагается гнездование.

А. Н. Сединкин, С. Е. Генералов

РАЗМЕЩЕНИЕ ОЗЕРНОЙ ЧАЙКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Озерная чайка в Челябинской области обитает практически на всех крупных водоемах. Излюбленным местом гнездования являются стоячие водоемы, реже — с медленным течением. В обоих случаях необходима богатая водная растительность, сплавины и острова, трудно-

доступные для человека. В горных районах редка. Гнезда здесь размещает на выступах отвесных скал по берегам рек на высоте до 10—15 м от уровня воды.

В степной зоне области в период гнездования озерные чайки держатся в основном колониями. В лесостепной и горно-лесной зонах колонии малочисленны, но встречаются чаще. Нередко чайки заселяют водоемы, не имеющие рыбы. В этом случае они кормятся на близлежащих полях и водоемах, удаляясь от места гнездования на 3—5, а иногда и 10 км.

Наблюдается тяготение к населенным пунктам, особенно в послегнездовой период. Во второй половине лета чайки — частые гости городских свалок. Встречаются в жилых массивах на бочках с пищевыми отходами и в других местах, где есть возможность легко добыть корм. Последние годы в области усиливается синантропизация этого вида.

А. Н. Сединкин, С. Е. Генералов

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ У ОЗЕРНОЙ ЧАЙКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Челябинскую область озерные чайки прилетают на протяжении первой декады апреля. На юге области первые птицы появляются раньше. Так, в районе г. Магнитогорска (по наблюдениям последних 15 лет) чайки прилетают 1—3 апреля, а в окрестностях г. Челябинска средний срок прилета — 12 апреля.

Появление птиц приурочено к вскрытию водоемов. Во время весенних заморозков чайки откочевывают в более южные районы. После прилета птицы приступают к ремонту старых и строительству новых гнезд не сразу, а спустя 1—2 недели, после спада уровня воды. Формирование колоний идет от центра к периферии. Ранние кладки отмечены на юге области (оз. М. Бугодак) 10—12 апреля, поздние в северных районах (оз. Чебаркуль) 8 мая. Массовая откладка яиц происходит в конце апреля—начале мая. Насиживание длится 23—24 дня.

К концу июня—началу июля основная масса молодых птиц покидает места гнездования и кочует небольшими стаями по водоемам до конца сентября. Массовый

отлет — в первой декаде октября. Отдельные птицы задерживаются до конца ноября. Неоднократно отмечались случаи зимовки озерной чайки на термальных водах в крупных промышленных городах.

А. А. Соколова

АНКЕТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРАЧЕВНИКОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведено четырежды в весенний период силами студентов биолого-химического факультета пединститута, учителей биологии, начальных классов и учащихся школ области. Результаты представлены в таблице.

Результаты обследования грачевников в Курганской области

Год	Количество колоний	Количество обследованных районов	Среднее число грачевников в 1 населенном пункте	Среднее число гнезд в грачевниках	Среднее число гнезд на 1 дереве	Количество гнезд, размещенных на березах (в % от общего числа)	Высота размещения гнезд (м)
1978	37	16	1,8	159,2	3,4	84,1	5—10
1980	80	18	1,8	299,0	2,5	75,6	5—7
1985	61	17	1,6	167,2	3,1	76,4	5—7
1988	55	14	1,8	297,6	3,9	72,3	3—10

А. А. Соколова, Н. А. Лунева

О ГНЕЗДОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ЛАСТОЧКИ В г. КУРГАНЕ

Наблюдения за гнездовой жизнью городской ласточки проводятся на территории г. Кургана с 1974 года. Прилет птиц отмечен в среднем с 10 по 19 мая. Строительство новых гнезд занимает 10—12 дней, подновление старых — 3—4 дня. Стаи формируются до 10 августа. Гнезда размещаются под балконами 4—5-этажных каменных домов на восточных и южных фасадах и под

лампами дневного освещения 9-этажного административного здания. В 1974 году зарегистрирован 1 центр с 69 гнездами на 5 жилых домах. В 1988 году в 9 выделенных центрах учтено 448 гнезд, размещенных на 22 домах. Наибольшее число гнезд (37,4%) расположено на уровне 4-го этажа. Плотность населения городской ласточки колеблется от 20 до 200 пар на 1 га.

В. И. Чебыкин, А. М. Болотников

КОЛИЧЕСТВО ГЛУХАРЕЙ НА ТОКАХ

Весной 1988 г. в Сивинском районе Пермской обл. учтены токующие глухари в 7 урочищах. В «Потерей» их было 4, «Зыряново» — 14, «Оськин хутор» — 5, «Факино» — 2, «Вятчина» — 2, «Чикмонов мыс» — 4 и в урочище «Карьер» 6 глухарей. Данные не претендуют на точность (тока посещались однократно). Но и они свидетельствуют о низкой численности токующих птиц. Четверть века назад на токах было по 25—30 глухарей.

А. В. Шварев, О. П. Таусамжи

БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ ЗИМУЕТ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

В черте города на 1 км участке незамерзающей р. Миасс одиночную белую цаплю встречали с 19 декабря 1985 г. по 31 марта 1986 г. Есть фотографии.

А. В. Шварев, О. П. Таусамжи

ГНЕЗДОВАНИЕ ЛЕБЕДЕЙ-КЛИКУНОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЧЕЛЯБИНСКА

На оз. Тишки (30 км к СВ от города) 25 июня 1986 г. видели пару кликунов с 6 маленькими птенцами. Две пары лебедей с 5 и 3 птенцами наблюдали на оз. Курлады под Копейском.

С. А. Шураков

ГНЕЗДОВАНИЕ ЧЕРНОГОЛОВОГО ЧЕКАНА В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. М. Воронцов (1949) считает черноголового чекана сравнительно редко гнездящимся видом северных районов Пермской области. По свидетельству С. Л. Ушкова

(1928), это гнездящаяся, довольно обычная под г. Пермью птица. 11 июня 1987 г. нами найдено гнездо черноголового чекана с пятью 2—3-дневными птенцами на территории Пермского аэропорта Б. Савино, а 25 июня этого же года в Косинском районе с семью птенцами-слетками. Регулярные встречи этого вида в гнездовой период в Кишертском, Уинском, Добрянском, Пермском районах позволяют считать черноголового чекана немногочисленной гнездящейся птицей Пермской области.

С. В. Шутов

О ГНЕЗДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОЛЯПКИ В СЕВЕРНОЙ ТАЙГЕ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

В нижнем течении р. Сывъю (левый приток р. Кожим) плотность гнездования оляпки в 1979—1986 гг. изменялась от 0,5 до 0,8 пары на 1 км длины речного русла и ограничивалась, в основном, наличием крутых скальных обнажений у уреза воды.

С. В. Шутов

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ЧИСЛЕННОСТИ ГАЛСТУЧНИКА НА р. СОБЬ (ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)

В окрестностях разъезда Полярный (Северная ж. д.) на 4 километрах береговой полосы реки 15 июня 1988 г. отмечено 5 беспокоящихся пар. В 2 найденных гнездах наблюдалась откладка последнего яйца.

С. В. Шутов

ВИДЫ — ВОСПИТАТЕЛИ КУКУШЕК В СЕВЕРНОЙ ТАЙГЕ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

Материал по гнездовому паразитизму собран в пойме нижнего течения р. Сывъю (левый приток р Кожим) в 1979—1986 гг. Яйца обыкновенной кукушки обнаружены в 5 кладках овсянки-крошки, 3-х — лугового конька, 3-х — таловки и в 2-х кладках — веснички. В 2-х гнездах варакушки отмечена откладка яйца глухой кукушкой.

В послегнездовое время встречены 3 пары овсянок-крошек и 2 пары весничек, кормящие кукушек неизвестного вида.

С. В. Шутов, В. К. Рябицев

СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКАЯ ВАРАКУШКА НА ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

Необычно ранней весной 1977 г. в пойме низовьев р. Сывъю левого притока р. Кожим, неоднократно отмечался самец варакушки с яркой белой «звездой» на синем пластроне. В сезоны гнездования 1979—1986 гг. все встреченные самцы этого вида были с рыжей «звездой».

В. П. Белик

О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАСШИРЕНИИ АРЕАЛА БЕЛОХВОСТОЙ ПИГАЛИЦЫ

В 60—70-х годах XX в. у пигалицы наметилась отчетливая тенденция к расселению в северном направлении (Виноградов, 1963; Залетаев, 1968; Лобачев, 1968; Хроков и др., 1979 и др.). Наши наблюдения подтверждают закономерность этого процесса. В ходе экспансии пигалица достигла уже северного берега Каспия и вдоль его побережья проникла на запад до дельты Волги, где в мае 1980 г. пару несомненно гнездящихся птиц добыл в районе пос. Ганюшкино Гурьевской обл. Г. Б. Бахтадзе (устн. сообщ.). В дельте р. Урал несколько колоний пигалиц было найдено нами в 1987 г.

06.06.87 г. три поселения белохвостых пигалиц обследованы среди фильтрационных болот вдоль каналов к юго-востоку от г. Гурьева. В первом из них гнездилась одна пара, у которой только что закончилось вылупление птенцов: в гнезде находился 1 необсохший птенец и скорлупа его яйца и 1 птенец постарше. Еще 1 птенец покинул гнездо и прятался в метре от него среди солянок. Рядом с гнездом обнаружено выкатившееся и погибшее 4-е яйцо пигалицы.

Во втором поселении также обитала одиночная пара, птенцы которой уже покинули гнездо. В третьем гнездилось не менее 10 пар пигалиц. Здесь было осмотрено 2 гнезда с насиженными кладками по 4 яйца и 5 пустых гнезд, недавно покинутых птенцами. Возле одного из них найден погибший 1—2 дня назад только что выклюнувшийся пуховичок, а поблизости — выводок из 3 птенцов 1—2-дневного возраста, скрывавшихся в траве.

09.06.87 г. обнаружена еще одна колония из 7—10 пар, загнездившихся на сухой гриве среди заболоченной приморской низины близ устья р. Урал. Здесь в 1 гнезде была насиженная кладка из 4 яиц и 3 гнезда были уже покинуты птенцами.

Поселения пигалиц на фильтрационных болотах были несколько обособлены от колоний других гнездившихся там куликов (морских зуйков, чибисов, ходулочников, травников, степных и луговых тиркушек). На приморском же болоте, где подходящие местообитания были редки, кулики сформировали смешанную 7-видовую колонию, в которой пигалицы резко выделялись своей активностью. Все поселения пигалиц располагались в окружении травянистых болот на голых участках солончаков с глинистыми или глинисто-ракушечниковыми грунтами. В одних случаях это были отсыпки грунта вдоль дамб, в других — залежь или старые прикошарные сбои.

В колониях гнезда пигалиц располагались в 10—20 м друг от друга. Представляли они собой вырытые птицами неглубокие ямки в грунте, выстланные сплошным слоем из разнообразного материала. При этом предпочтение отдавалось мелким раковинам моллюсков: мидий, прудовиков, катушек, сердцевидок, а при их отсутствии использовались кусочки сухих стеблей солянок, тростника, древесных прутиков, сухих травинок и т. п. Лишь одно из 13 осмотренных гнезд было совершенно лишено выстилки.

Размеры осмотренных жилых гнезд (в см)

№	Диаметр гнезда	Диаметр лотка	Высота гнезда	Глубина лотка	Примечание
1	19	13	2	0,5	Гнездо из солянок
2	14,5×17	10,5		2,3	Гнездо из мидий
3	15×17,5	11		2	Гнездо из мидий
4	21,5	12		2	Гнездо из тростника

Размеры яиц: 38,9—41,8×28,0—29,5, в среднем (= 12) — 40,39×28,65 мм.

Пигалицы, проявляя беспокойство у гнезд, очень ак-

тивны, крикливы и сразу привлекают к себе внимание благодаря своей внешности и голосу. Хорошо заметны и птицы, пролетающие вдали от гнездовий. Их тревожный крик — громкое, пронзительное «чи-кув-ва, ...», или «чи-чи-куува-ва, ...». При сильной мотивации слышны взвизгивающие крики «кувв-вяк, ...», или «чивв-вяк, ...». Сходные звуки, группируемые в быстрые дребезжащие трели («куувв-ва—куувв-ва—«кув-ва», близкие к «дживва» или «джигва»), имеют, очевидно, функцию токовых демонстраций.

Появление пигалицы в низовьях Урала относится, по-видимому, ко второй половине 1970-х годов, так как в 1974 г. здесь была отмечена лишь одиночная залетная особь (Хроков и др., 1979), а к 1980 г. птицы достигли уже дельты Волги. Их расселение на север связывалось с периодическими засухами в основной области гнездования, вынуждавшими пигалиц кочевать в поисках подходящих местообитаний (Хроков и др., 1979), а также с появлением необходимых для размножения условий за границами ареала (Залетаев, 1968; Лобачев, 1968). Но широта фронта и длительность периода экспансии этих птиц позволяют говорить о смене консервативного типа их эволюции на дисперсный (по Мальчевскому, 1968). Об этом свидетельствуют и залеты птиц в районы будущих гнездовий, непосредственно предшествующие расселению. А формирование сети специфичных станций в полосе северных пустынь способствует ускорению этого процесса. Поэтому в ближайшее время можно ожидать появления пигалиц в более северных и западных районах Прикаспийской низменности, а также в степях Северного Казахстана.

Т. К. Блинова

ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ И СТЕПИ ТУРГАЙСКОЙ ДЕПРЕССИИ

Исследования проводились в лесостепной и степной зонах в 1982—1984 и 1986 гг. на семи ключевых участках в долине р. Тобол, на Тоболо-Ишимском междуречье и в Тургайской меридианальной депрессии. Птиц учитывали без ограничения полосы на пятикилометровых

маршрутах с двухнедельной повторностью. Пересчет на площадь осуществляли раздельно, по среднегрупповым дальностям обнаружения (Равкин, 1967). Всего обследовано 78 ландшафтных урочищ; общая протяженность маршрутов составила около 2000 км. Рассматриваются усредненные показатели обилия птиц за первую половину лета (период с 16 мая по 15 июля).

Наибольшим обилием птиц характеризуются лесостепные населенные пункты (3889 особей/км^2); в поселках степной зоны этот показатель существенно ниже (734).

Из естественных местообитаний лесостепи Зауралья и степи Тургайской депрессии наибольшей экологической емкостью, судя по обилию птиц, обладают луго-болотно-тростниковые формации (2504 и 1425, соответственно в лесостепной и степной зонах), а также пресные и слабосоленые зарастающие озера (1150 и 1295). Суммарное обилие птиц в озерных местообитаниях уменьшается пропорционально снижению защитных свойств и продуктивности водоемов и повышению их минерализации; какой-либо зависимости от площади озер не прослеживается.

В лесных и частично облесенных местообитаниях плотность населения птиц снижается от увлажненных высокопродуктивных мелколиственных и березово-сосновых лесов северной лесостепи к остепненным лесостепным и степным аналогам (691—737 особей/км^2 против 346—500). Самый обедненный вариант лесных сообществ в лесостепи Зауралья представляют структурно упрощенные моновидовые сосновые посадки (370). Плотность населения птиц в зональных островных лесах зависит от площади массивов, их удаленности друг от друга и характера окружающих местообитаний.

В лесостепи луго-степные открытые местообитания населены птицами обильнее, чем в степной зоне (618 и 249). На открытых полях с посевами монокультур показатели обилия почти не различаются. По-видимому, в разных ландшафтных зонах поддерживаются сходные экологические условия в процессе ведения полевых работ.

В целом северная подзона лесостепи Зауралья населена птицами обильнее, чем южная, а лесостепная зо-

на — обильнее степной, что связано с уменьшением обводненности к югу, увеличением аридизации климата и соответственным снижением продуктивности и разнообразия растительных сообществ. Природно-зональные различия лесостепной и степной зон отчетливо сказываются на плотности населения птиц лесов, луговых и степных биотопов; в озерно-займищных ландшафтах, по-видимому, определяющими являются локальные особенности; в основном характер и площади зарастания тростником и рогозом.

Зональные лесостепные и степные ландшафты вследствие их значительной антропогенной трансформации уступают по плотности населения интрозональным (водно-болотным); последние служат своеобразными убежищами, в которых сохраняется наиболее самобытное население.

И. Л. Мельгунов, А. Н. Хохлов, А. П. Бичерев

О ВСТРЕЧЕ УКРАШЕННОГО ЧИБИСА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

Основная часть ареала украшенного чибиса находится в Южной Азии (Гладков, 1952). В СССР этот вид обитает лишь на юге Средней Азии по долинам рек Теджена, Кушки, Мургаба (Флинт и др. 1968; Степанян, 1975).

За 12 лет орнитологических наблюдений нами этот кулик встречен лишь однажды: 28 августа 1982 г., когда стояла очень жаркая и солнечная погода. Птицу заметили в стае обыкновенных чибисов в верховьях р. Айгурки (Ставропольский край). Стая из 32 птиц летела на высоте около 20 м с северо-востока на юго-запад и затем опустилась на сырой луг в пойме реки. У летящего украшенного чибиса были хорошо заметны лопасти красного цвета и менее отчетливо — ноги такого же цвета. Несколько минут стая активно кормилась, подпустила к себе на расстояние 60—65 м. По украшенному чибису был произведен выстрел, но добыть его не удалось. После выстрела вся стая улетела в юго-западном направлении.

В литературе имеются сведения о залете этого кулика в район г. Чарджоу и на север Узбекистана, в дельту р. Аму-Дарьи (Гладков, 1952). Следует отметить, что

украшенный чибис отмечается на Кавказе второй раз. Первый раз его наблюдали 24 мая 1956 г. на р. Акуши (юго-западное побережье Каспийского моря; Иванов, 1976).

В. П. Соустин, Ю. П. Семченко

МАТЕРИАЛЫ К ЭМБРИОГЕНЕЗУ ПТИЦ И ЕГО ВОЗМОЖНЫМ ПРАКТИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЯМ

Физиологическая атрезия ряда органов зародыша рептилий, птиц, млекопитающих и человека в последние годы (Лобко и др., 1983) рассматривается в сущности как новая глава эмбриологии. В эмбриогенезе птиц происходит временное закрытие гортанного отдела дыхательной трубки. По данным М. Н. Рогозиной (1961), у 10—11-дневных зародышей курицы полость в гортани отсутствует. Она заполнена эпителиальной «пробкой». Начиная с 12 суток, наблюдается освобождение полости гортани и восстановление сообщения между трахеей и глоткой. И. Н. Зусман (1964) изучил вопрос о связи между внутрикишечным способом питания птиц и физиологической облитерацией гортани.

На основе функциональной атрезии гортанной щели в силу различного рода неблагоприятных воздействий могут возникать врожденные аномалии системы дыхания, которые приводят к гибели плодов птиц при переходе к легочному дыханию. Это, в свою очередь, проливает свет на вопрос о соотношении кладки и фактического воспроизводства на момент вылупления.

Наряду с внекишечным способом питания за счет желточного мешка у птиц в плодном периоде основным способом становится внутрикишечное питание. Серо-амниотический канал обеспечивает переход белка белковой оболочки яйца в полость амниона, его заглатывание и внутрикишечное переваривание. В случаях нарушений в развитии гортани белковые массы попадают в просвет трахеи, что приводит к образованию белковой «пробки» и гибели плодов во время их выклева. Таким образом, вопрос о эмбриологических предпосылках возникновения врожденной непроходимости дыхательных путей у птиц представляет научный и практический интерес.

Настоящее сообщение основывается на изучении се-

рийных гистологических срезов зародышей и плодов сизого голубя и домашней птицы (курица, утка). Срезы производились во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях. Окрашивали гематоксилином и эозином, а также гистохимически на выявление гликогена и нейтральных гликопротеинов.

Установлено, что физиологическая атрезия полости гортани является результатом высокой митотической активности и роста эпителиального покрова и параллельно с этим сложных формообразовательных процессов в органе. Указанное явление обнаруживается в гортани всех изученных видов птиц. Горганная щель закрывается общей эпителиальной пластинкой, возникающей вследствие медиального роста стенок органа и последующего плотного соединения их покровных эпителиев. В общем эпителиальном пласте отмечается активное митотическое размножение клеток. Период эпителиальной атрезии гортанной щели кратковременный. Через 48—78 часов гортанные валики разъединяются, вновь восстанавливается сообщение трахейной трубки с глоткой.

Время возникновения, течение и способ обратного развития физиологической атрезии в эмбриогенезе изученных видов птиц идентичны.

Обращает внимание коррелятивная активность гистогенезов эпителия и окружающей мезенхимы. В целом эпителиальная атрезия указывает на большую пластичность в указанном периоде всего тканевого комплекса гортани.

Явление физиологической атрезии гортани у птиц рассматривается как своеобразная адаптация к условиям развития в амниотической жидкости и способу питания, в качестве ценогенеза, то есть полезного эмбриологического приспособления по Э. Геккелю и А. Н. Северцову.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абдуршин Э. В. 3
Амеличев В. Н. 3, 4
Баянов М. Г. 4, 19
Белик В. П. 29, 30, 31
Бельтиков Б. А. 5, 6
Бичерев А. П. 33
Блинова Т. К. 31, 32
Болотников А. М. 6, 26, 27
Борисов В. В. 22
Брауде М. И. 6, 7
Валуев В. А. 7, 8, 18
Воронин Р. Н. 8
Гавлюк Э. В. 9, 10
Генералов С. Е. 10, 11, 24, 25
Головатин М. Г. 11, 12
Гузеев В. А. 19
Давыгора А. В. 10, 12, 13
Емельянов В. М. 13, 14
Захаров В. Д. 14, 15
Карев Е. В. 15
Корнев С. В. 13, 15, 16
Кривощеков В. В. 16
Ливанов С. Г. 16, 17
Лоскутов А. В. 17, 18
Лоскутова Н. М. 21
Лунёва Н. А. 26
Ляхов А. Г. 18
Маматов А. Ф. 4, 18, 19
Манийчук Т. Л. 6
Мельгунов И. Л. 33
Минеев Ю. Н. 19, 20
Нехорошков С. А. 20, 21
Нехорошкова С. Г. 21
Пасхальный С. П. 21, 22
Петров Б. Г. 22
Постников С. Н. 22, 23
Руди В. Н. 23
Рябицев В. К. 23, 24, 28, 29
Сединкин А. Н. 24, 25
Семченко Ю. П. 35, 36
Соколова А. А. 25, 26
Соустин В. П. 35, 36
Таусамжи О. П. 27
Чебыкин В. И. 26, 27
Черемисин В. В. 21, 22
Шварев А. В. 27
Шураков С. А. 27
Шутов С. В. 28, 29
Хохлов А. Н. 33