КРАСНАЯ КНИГА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ,
ГРИБЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ • ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПАКРУС» • 2003

ББК 28. 088(2 Рос)
К-78

Учреждена
постановлением Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа
№ 439 от 28.10.99

РЕЦЕНЗЕНТЫ

Доктор биологических наук В.Г. Ищенко, доктор биологических наук В.А. Мухин, доктор биологических наук Е.П. Прокопьев, доктор биологических наук Ю.С. Равкин, доктор биологических наук В.К. Рябицев, доктор биологических наук В.П. Седельников, кандидат биологических наук В.В. Дубатолов, кандидат биологических наук Р.Ю. Дудко, кандидат биологических наук М.С. Князев, кандидат биологических наук А.А. Легалов, кандидат биологических наук М.А. Магомедова, кандидат биологических наук Л.М. Морозова, кандидат биологических наук Н.В. Николаева, кандидат биологических наук С.Э. Чернышёв, кандидат биологических наук Е.А. Шурова.

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель
А.В. Филипенко,
Губернатор ХМАО
Главный редактор
В.Н. Большаков,
академик РАН
Заместители председателя
В.А. Долингер,
советник Губернатора по экологии ХМАО
В.С. Пикунов,
начальник Управления по охране окружающей природной среды ХМАО
Члены научно-редакционного совета
В.Д. Богданов,
доктор биологических наук
Э.И. Валеева,
кандидат биологических наук
Л.Г. Вартапетов,
доктор биологических наук
А.М. Васин,
заместитель директора по научной работе заповедника «Малая Сосьва»
(редактор-составитель)
А. Л. Васина,
кандидат биологических наук
В.Г. Ищенко,
доктор биологических наук
М.С. Князев,
кандидат биологических наук
Т.П. Меркушина,
начальник отдела ООПТ Управления по охране окружающей природной среды ХМАО
В.Н. Ольшванг,
кандидат биологических наук
О.Ю. Прядко,
директор Федерального гос. учреждения «Специализированная инспекция аналитического контроля по ХМАО»

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

А.М. Антипов, С.П. Арефьев, А.С. Байкалова, В.Д. Богданов, В.Н. Большаков, Э.И. Валеева, Л.Г. Вартапетов, А.М. Васин, А.Л. Васина, С.Н. Гашев, В.А. Глазунов, П.Ю. Горбунов, В.В. Дубатолов, А.А. Егоров, Е.В. Зиновьев, М.С. Князев, Б.В. Красуцкий, В.Р. Крохалевский, Г.М. Кукуричкин, С.Ю. Лаврентьев, Е.Д. Лапшина, Н.И. Марков, А. К. Матковский, Е.Я. Мульдияров, В.Н. Ольшванг, О.Л. Орлов, О.Ю. Писаренко, Н.В. Седельникова, И.В. Ставишенко, В.В. Сыжко, Г.С. Таран, В.Н. Тюрин

ISBN 5-901214-50-1

© Управление по охране окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного округа, 2003.
© Васин А.М., составление, 2003.
© Издательский дом «ПАКРУС», оформление, макет, 2003.
© Солдатов В.С., оформл., 2003.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация о животных, растениях и грибах Ханты-Мансийского автономного округа, состояние которых в природной среде требует особого внимания

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Научный редактор
В. Н. Большаков

СЕВЕРНЫЙ КОЖАНОК

Eptesicus nilssonii
(Keyserling, Blasius, 1839)

Отряд Рукокрылые
Chiroptera

Семейство Гладконосые или
Обыкновенные летучие мыши
Vespertilionidae

Признаки. Летучая мышь средних размеров. Длина тела 49,5 – 61 мм, длина хвоста 39 – 51 мм, предплечье 37,5 – 46 мм. Уши небольшие, округлые. Длина уха 10 – 15 мм, козелка 4 – 6,5 мм. Масса тела 8 – 14,5 г. Мех довольно густой, высокий. Окраска спины двухцветная: на темно-буром фоне желтоватые пятна. Брюхо серое.
Распространение. Заселяет зону хвойных и смешанных лесов Евразии от Норвегии и Франции почти до Тихого океана, Северный Кавказ и Закавказье, Северный и Юго-Восточный Казахстан, горные районы Средней и Центральной Азии [1, 2, 4]. На территории округа проходит северная граница ареала вида.
Численность. Редкий вид. Отмечались одиночные особи лишь в летнее время года в северо-западной, западной и центральной частях округа [3, 5, 6].
Места обитания и образ жизни. Заселяет различные сооружения человека, дупла, пространства за отставшей корой. Зимует в пещерах, штольнях, скальных трещинах, сооружениях человека [2]. Питается насекомыми, главным образом, ночными бабочками и жуками. Самки во второй половине июня рожают 1-2 детенышей.
Лимитирующие факторы. Рубка старых дуплистых деревьев, использование пестицидов и инсектицидов.
Принятые и необходимые меры охраны. Запрещение непосредственного отлова и уничтожения животных, сохранение дуплистых деревьев, ограничение использования пестицидов и инсектицидов, создание резерватов в местах формирования выводковых и зимующих колоний.
Источники информации: 1. Большаков и др., 2000; 2. Кузякин, 1950; 3. Марвин, 1969; 4. Млекопитающие фауны ..., 1963; 5. Раёвский, 1982; 6. Скалон, 1935.
Составители: В. Н. Большаков, О. Л. Орлов.

ПРУДОВАЯ НОЧНИЦА

Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Отряд Рукокрылые
Chiroptera

Семейство Гладконосые или
Обыкновенные летучие мыши
Vespertilionidae

Признаки. Самая крупная летучая мышь среди зимующих на Урале. Длина тела колеблется от 51 до 73 мм, хвоста – от 40 до 55 мм, уха – от 15 до

19 мм, козелка – от 6,5 до 8,5 мм. Предплечье 44 – 48,5 мм; масса тела 14,5 – 25 г. Спина прудовых ночниц окрашена в оливково-серый цвет, брюхо белое или светло-серое [1, 2].

Распространение. Ареал прудовой ночницы простирается от Северо-Восточной Франции, Бельгии и Нидерландов до Енисея. Но юге до Молдавии, Средней Волги, нижнего течения реки Урал, озера Зайсан. Северная граница проходит примерно вдоль линии: Санкт-Петербург – юг Архангельской области – Ханты-Мансийск [1, 2]. В пределах ареала вид распространен крайне неравномерно. На территории округа находится крайний северо-восточный предел распространения вида.

Численность. В Ханты-Мансийском округе известны лишь две летние находки отдельных особей прудовых ночниц: пос. Шухтунгорт (северная часть заповедника «Малая Сосьва») [4, 5], г. Ханты-Мансийск [1].

Места обитания и образ жизни. Обитает недалеко от стоячих водоемов или у водоемов с медленным течением. Заселяет различные сооружения человека, дупла. Зимует группами в пещерах, штольнях. Возможно, часть особей на зимовку откочевывает в пещеры на близлежащих территориях Свердловской области и Республики Коми. Может зимовать также в подвалах, погребах, канализационных сооружениях [3]. Питается насекомыми, отлавливая их на небольшой высоте над поверхностью водоемов (отсюда и название). Детеныши (один, реже два) появляются во второй половине июня.

Лимитирующие факторы. Уничтожение на зимовках в пещерах туристами, уничтожение мест летнего обитания и охоты при рубке старых дуплистых деревьев и отравлении водоемов промышленными стоками.

Принятые и необходимые меры охраны. Запрет на непосредственный отлов и уничтожение животных, запрет на рубку старых дуплистых деревьев вблизи стоячих водоемов или водоемов с медленным течением, строгое регулирование сброса отравляющих веществ в водоемы, создание резерватов в местах формирования выводковых или зимующих колоний.

Источники информации: 1. Кузякин, 1950; 2. Млекопитающие фауны..., 1963; 3. Пониматко, 1998; 4. Раевский, 1982; 5. Скалон, 1935.

Составители: В. Н. Большаков, О. Л. Орлов.

НОЧНИЦА БРАНДТА

Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

Отряд Рукокрылые
Chiroptera

Семейство Гладконосые или
Обыкновенные летучие мыши
Vespertilionidae

Признаки. Мелкая летучая мышь с массой тела 5 – 10,5 г. Длина тела колеблется в пределах от 38 до 50 мм, длина хвоста 32 – 46 мм. Предплечье длиной 32 – 39 мм, ухо 13 – 16 мм, козелок около 6,5 мм. Окраска темнее, чем у прудовой ночницы. Спина окрашена в темно-бурый цвет. Брюхо серое. Основания волос темнее, чем кончики. Основания уха и козелка высветлены.

Распространение. Ареал ночницы Брандта протянулся от Северо-Западной и Центральной Европы до Дальнего Востока и почти целиком лежит в пределах лесной зоны [1, 5, 6]. На территории округа проходит северная граница ареала.

Численность. Редкий вид. В Ханты-Мансийском округе известно несколько находок в летнее время года середины XX века в верховьях Конды, близ устья р. Нюрих (на территории бывшего Кондо-Сосвинского заповедника) и в окрестностях г. Березово [3, 4].

Места обитания и образ жизни. Заселяет различные сооружения человека, дупла, пространства за отставшей корой. Зимует в пещерах, штольнях, в том числе, возможно, на территории близлежащих районов Свердловской области и Республики Коми. В районах, удаленных от пещер, может зимовать в сооружениях человека [2]. Питается насекомыми. Охотится в самых разнообразных местах: в лесу среди деревьев на высоте 1,5 – 2 м над землей, над полянами, водоемами. Самки во второй половине июня рожают по одному детенышу.

Лимитирующие факторы. Рубка старых дуплистых деревьев, использование пестицидов и инсектицидов.

Принятые и необходимые меры охраны. Запрещение непосредственного отлова и уничтожения животных, сохранение дуплистых деревьев, ограничение использования пестицидов и инсектицидов, создание резерватов в местах формирования выводковых или зимующих колоний.

Источники информации. 1. Млекопитающие фауны..., 1963; 2. Пониматко, 1998; 3. Раевский, 1982; 4. Скалон, 1935; 5. Стрелков, 1983; 6. Стрелков, Бунтова, 1982.

Составители: В. Н. Большаков, О. Л. Орлов.