
А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
У РА Л СКИЙ ФИЛИАЛ

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫХ

МАТЕРИАЛЫ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ

ЛАБОРАТОРИИ
ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ
ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

ВЫПУСК 4



СВЕРДЛОВСК
1971

УДК 591.55

Сборник содержит 35 рефератов докладов сотрудников отдела популяционной экологии животных Института экологии растений и животных Уральского филиала АН СССР, заслушанных в декабре 1969 г. по итогам работы за этот год.

Темы рефератов группируются по нескольким разделам: экологический анализ проявлений изменчивости популяций, эколого-географические исследования, вопросы экологической генетики, экология рыб и водных беспозвоночных, динамика и продуктивность популяций и сообществ.

Каждый реферат отражает законченный раздел работы.

Сборники представляет интерес для зоологов широкого профиля и отдельных специалистов.

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Уральского филиала АН СССР

Ответственный редактор В.Г.Ищенко

В.Н.Большаков

ОБ АРЕАЛЕ КРАСНО-СЕРОЙ ПОЛЕВКИ НА УРАЛЕ

В хребтовой части Урала особенности распространения красно-серой полевки до последнего времени были неясны. Нашиими исследованиями 1960–67 гг. установлено, что наиболее южные места нахождения вида в горной части Южного Урала – окрестности ст. Ишля Белорецкой узкоколейной дороги, окрестности пос. Инзер Белорецкого р-на Башкирской АССР и верховья р. Привязь. На Южном Урале красно-серая полевка встречается по россыпям камней

в горных лесах, подгольцовом и гольцовом поясах хребтов. В большом количестве (отловлено более 500 экз.) она найдена нами в каменистых россыпях гор. Кукшик (хр. Сулея). От г.Свердловска далее на север вид встречается во всей горной части Урала до Полярного Урала включительно. Однако на территории около 2 широтных градусов (гор. Кукшик - ст. Исеть Свердловской обл.) красно-серая полевка, несмотря на многочисленные и детальные исследования ряда зоологов и работников санитарно-эпидемиологической службы, до последнего времени не была обнаружена.

В 1969 г. нами были обследованы вершинные части ряда гор Среднего и севера Южного Урала - горы Аракуль (Челябинская обл.) и Азов - горы (Свердловская обл.). Установлено, что красно-серая полевка обитает в этих районах, однако имеет здесь четкую биотопическую приуроченность - встречается только в каменистых россыпях привершинных частей гор. Как и на Южном Урале, здесь обнаружены кормовые столики полевок, состоящие из разгрызенных и обглоданных веточек малины, рябины. По морфологическим признакам отловленные полевки не имеют отличий от южно-уральских полевок.

Таким образом, в ареале красно-серой полевки нет разрыва в более низких частях Среднего Урала - здесь зверьки встречаются в каменистых россыпях наиболее значительных вершин этого района.