

УДК 599.742.2: [591.471+591.13]: [550.424:546.027](470.5)

СОДЕРЖАНИЕ ИЗОТОПОВ ^{13}C И ^{15}N В КОЛЛАГЕНЕ КОСТЕЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, ВОЗРАСТНЫХ И ПОЛОВЫХ ГРУПП УРАЛЬСКОГО ПЕЩЕРНОГО МЕДВЕДЯ (MAMMALIA, CARNIVORA, URSIDAE, *URSUS (SPELAEARCTOS) KANIVETZ VERESTCHAGIN, 1973*)

© 2023 г. П. А. Косинцев^{1,*}, К. Ю. Коновалова¹, Г. В. Симонова²

Представлена академиком РАН В.Н. Большаковым

Поступило 08.08.2023 г.

После доработки 30.08.2023 г.

Принято к публикации 02.09.2023 г.

Проведен анализ данных о содержании изотопов ^{13}C и ^{15}N в коллагене костей уральского пещерного медведя (*Ursus (S.) kanivetz Verestchagin, 1973*) с Северного и Среднего Урала. Кости датируются первой половиной МИС 3. Изучены кости новорожденных особей, особей в возрасте 1 год, самцов и самок в возрасте 2 лет, 3 лет, 4 лет и старше 4 лет. Различия значений $\delta^{13}\text{C}$ между возрастными, половыми и географическими выборками не достоверны. С возрастом значительно уменьшается величина $\delta^{15}\text{N}$, что связано с переходом от молочного питания к самостоятельному питанию. В составе диеты взрослых медведей Среднего Урала была выше доля мясной пищи, чем в составе диеты взрослых медведей Северного Урала. Заметные различия изотопных подписей между самцами и самками разного возраста отсутствуют. Большие пещерные медведи Урала и Европы имели сходный тип диеты.

Ключевые слова: *Ursus kanivetz*, уральский пещерный медведь, поздний плейстоцен, Урал, стабильные изотопы, ^{13}C , ^{15}N , коллаген

DOI: 10.31857/S2686738923600565, **EDN:** HRRPRQ

Анализ содержания изотопов ^{13}C и ^{15}N в тканях живых организмов широко используются для реконструкции среды обитания и экологии видов в прошлом и настоящем. Он позволяет оценить положение вида в трофической цепи и охарактеризовать особенности его питания. Особенно большое значение изучение изотопов имеет для вымерших видов. Один из самых больших массивов данных по изотопному составу углерода и азота в коллагене костей получен для больших пещерных медведей (*Ursus (Spelaearctos) spelaeus* s.l.) Западной и Центральной Европы [1–7]. Данные о содержании изотопов ^{13}C и ^{15}N в коллагене костей больших пещерных медведей Восточной Европы и Урала крайне малочисленны [8].

Анализ морфологических данных и ядерной ДНК показал, что в Восточной Европе и на Урале в позднем плейстоцене обитал один вид большого пещерного медведя – уральский пещерный

медведь (*Ursus (S.) kanivetz Verestchagin, 1973*) [9, 10]. В Центральной Европе обитало три вида – *U. (S.) spelaeus* Rosenmüller 1794, *U. (S.) eremus* Rabeder, Hofreiter, Nagel et Withalm, 2004 и *U. (S.) kanivetz Verestchagin, 1973*; в Западной Европе обитало два вида больших пещерных медведей – *Ursus (S.) spelaeus* Rosenmüller 1794 и *U. (S.) eremus* Rabeder, Hofreiter, Nagel et Withalm, 2004 [10, 11].

Изучено содержание изотопов ^{13}C и ^{15}N в коллагене костей уральского пещерного медведя из пещеры Тайн на Среднем Урале [8] и пещеры Медвежья на Северном Урале. Выборка из пещеры Тайн дополнена новыми образцами. Пещера Медвежья ($62^{\circ}05' \text{ с. ш.}, 58^{\circ}05' \text{ в. д.}$) имеет карстовое происхождение, горизонтальный тип строения, длину 480 м и высоту над уровнем моря 280 м [12]. Это северо-восточный край ареала (*Ursus (S.) spelaeus* s.l.) [9]. В отложениях пещеры найдено более 3000 костей большого пещерного медведя, среди которых есть остатки всех возрастных групп от новорожденных до старых особей. Это типичное “кладбище” пещерных медведей, где животные погибали во время зимней спячки. По костям пещерного медведя получены радиоуглеродные (AMS) даты: $>48\,600$ BP, no.? [13]; $42\,000 \pm 450$ BP, OxA-19608; $45\,150 \pm 600$ BP,

¹Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия

²Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия

*e-mail: kpa@ipaee.uran.ru

Таблица 1. Значения $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{15}\text{N}$ (\textperthousand) и стандартное отклонение (sd) в коллагене костей уральского пещерного медведя (*U. (S.) kanivetz*) Северного и Среднего Урала

Пол ¹	Возраст	n	$\delta^{13}\text{C}_{\min}$	$\delta^{13}\text{C}_{\max}$	$\delta^{13}\text{C}_{\text{cp}} \pm \text{sd}$	$\delta^{15}\text{N}_{\min}$	$\delta^{15}\text{N}_{\max}$	$\delta^{15}\text{N}_{\text{cp}} \pm \text{sd}$
Северный Урал								
♂	>4+	9	-23.6	-21.2	-22.3 \pm 0.84	2.4	5.4	3.9 \pm 1.04
♀		5	-23.4	-21.8	-22.6 \pm 0.58	2.8	4.9	3.8 \pm 0.93
♂	3+, 4+	4	-22.2	-21.7	-21.9 \pm 0.21	3.9	5.8	4.8 \pm 0.84
♀		3	-23.6	-21.7	-22.4 \pm 1.01	3.4	4.2	3.9 \pm 0.44
♂	2+	4	-23.1	-21.9	-22.5 \pm 0.61	4.3	6.6	5.2 \pm 0.98
♀		4	-22.1	-20.2	-21.0 \pm 0.94	4.6	11.3	7.1 \pm 3.08
?	1+	23	-22.9	-21.4	-22.4 \pm 0.35	5.0	8.4	6.7 \pm 0.86
?	0+	2	-23.9	-22.4	-23.2 \pm 1.08	8.3	9.0	8.7 \pm 0.52
Средний Урал								
♂	>4+	5	-22.1	-21.3	-21.7 \pm 0.37	3.2	4.9	4.1 \pm 0.68
♀		2	-22.2	-21.8	-22.0 \pm 0.26	4.6	4.6	4.6
♂	3+, 4+	3	-22.5	-22.1	22.2 \pm 0.23	3.2	4.0	3.7 \pm 0.42
♀		4	-22.0	-21.4	-21.7 \pm 0.28	3.0	4.6	4.0 \pm 0.78
♂	2+	1		-22.8				7.2
♀		3	-22.1	-21.7	-21.8 \pm 0.23	5.4	5.7	5.6 \pm 0.15
?	1+	5	-22.8	-21.9	-22.5 \pm 0.34	4.8	7.8	6.4 \pm 1.11
?	0+	2	-24.2	-23.2	-23.7 \pm 0.71	7.5	9.0	8.3 \pm 1.06

¹ ♂ – самцы, ♀ – самки, ? – пол не определен.

OxA-19568 [10], что соответствует первой половине морской изотопной стадии 3 (MIS 3) позднего плейстоцена. Пещеры Тайн и Медвежья имеют один тафономический тип (“кладбище”), накопление костей происходило в один период – первая половина MIS 3 (57000–40000 лет назад).

Для анализа взяты 45 плечевых, 8 лучевых, и 1 большая берцовидная кость. Определение пола и возраста особей, которым принадлежали кости, проведено на основании анализа их размеров и состояния эпифизов (приросли – не приросли) [14–17]. Среди них есть кости самцов и самок в возрасте 2+ лет, 3+ и 4+ лет (полувзрослые, *sub-adultus*) и старше 4+ лет (>4+, взрослые, *adultus*) (табл. 1). Пол особей в возрасте 0+ и 1+ лет не определен. Каждая кость принадлежит отдельной особи. Особи в возрасте 0+ имеют только молочное питание, особи в возрасте 1+ имеют смешанный тип питания (молочное и самостоятельное), с возраста 2+ животные переходят на самостоятельное питание [18].

Определение изотопного состава углерода ($\delta^{13}\text{C}$) и азота ($\delta^{15}\text{N}$) в коллагене костей проведено методом изотопной масс-спектрометрии с использованием изотопного масс-спектрометра DELTA V Advantage (Thermo Fisher Scientific, Германия), оснащенного элементным анализатором

Flash 2000 (приборы предоставлены центром коллективного пользования ТомЦКП СО РАН) по стандартной методике. В качестве международного стандарта углерода принят эталон VPDB. В качестве международного стандарта азота принят газообразный N_2 атмосферного воздуха. Лабораторные рабочие газы сравнения CO_2 и N_2 калибровали по международному стандартному образцу МАГАТЭ – IAEA-600 Caffeine. Абсолютная погрешность измерений трех последовательных измерений анализируемых образцов для $\delta^{13}\text{C}$ не превышала $\pm 0.2\text{\textperthousand}$, а для $\delta^{15}\text{N}$ не превышала $\pm 0.4\text{\textperthousand}$.

Значения изотопного состава углерода и азота в коллагене костей уральского пещерного медведя представлены в табл. 1.

Средние значения $\delta^{13}\text{C}$ в группах полу涓ростных и взрослых самцов и самок на Северном Урале различаются не более чем на $0.5\text{\textperthousand}$, а значения $\delta^{15}\text{N}$ не более чем на $0.9\text{\textperthousand}$ (табл. 1). На Среднем Урале эти различия составляют для $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{15}\text{N}$ не более $0.5\text{\textperthousand}$ (табл. 1). В целом, значения $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{15}\text{N}$ для групп полу涓ростных и взрослых особей близки.

Различия значений $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{15}\text{N}$ в группах молодых особей – 2+, 1+ и 0+ лет значительно больше. Различия в величине $\delta^{13}\text{C}$ между самцами и самками в группе 2+ года на Северном Урале состав-

ляют 1.5‰, а на Среднем Урале – 1.0‰. Различия в величине $\delta^{15}\text{N}$ составляют соответственно 1.9‰ и 1.6‰ (табл. 1). Различия в величине $\delta^{13}\text{C}$ между группами 1+ и 0+ на Северном Урале составляют 0.8‰, на Среднем Урале – 1.2‰, а различия в величине $\delta^{15}\text{N}$ соответственно 2.0‰ и 1.9‰ (табл. 1).

Распределение значений $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{15}\text{N}$ возрастных групп 1+ с Северного и Среднего Урала практически совпадают и почти полностью лежат за пределами значений для взрослых особей (рис. 1). Распределение значений для возрастных групп 2+ Северного и Среднего Урала совпадают и частично перекрываются с распределением значений взрослых групп (рис. 1). Совпадают значения возрастных групп 2+ и со значениями для возрастных групп 1+. Значения для особей 0+ находятся за пределами значений для остальных возрастных групп (рис. 1).

Статистическая оценка различий между выборками (при $n > 4$) проведена по непараметрическому тесту Манна-Уитни. Значения $\delta^{13}\text{C}$ между всеми выборками статистически значимо не различаются. Значения $\delta^{15}\text{N}$ достоверно отличаются между 4 парами выборок. На Северном Урале значения $\delta^{15}\text{N}$ достоверно (уровень значимости 5%) больше в выборке возраста 1+ по сравнению с объединенной выборкой самцов и самок возраста 2+ и в объединенной выборке возраста 2+ по сравнению с объединенной выборкой полузврсовых (3+, 4+) самцов и самок. На Среднем Урале значения $\delta^{15}\text{N}$ достоверно (уровень значимости 1%) больше в выборке возраста 1+, чем в объединенной выборке полузврсовых (+3, +4) и взрослых (>4+) самцов и самок. В объединенной выборке взрослых (>4+) самцов и самок со Среднего Урала значения $\delta^{15}\text{N}$ достоверно (уровень значимости 5%) выше, чем в аналогичной выборке с Северного Урала.

Полученные данные показывают, что почти все значимые различия значений $\delta^{15}\text{N}$ наблюдаются между выборками молодых особей (1+ и 2+) или между выборкой молодых особей (2+) и полузврсовых и взрослых (3+ и старше) особей. Различия в значениях $\delta^{15}\text{N}$ определяются долей белковой пищи в питании [19]. Высокие значения $\delta^{15}\text{N}$ в младших возрастных группах (0+, 1+) связаны с их молочной диетой, которая содержит большое количество белка. В возрасте 2+ животные переходят к самостоятельному питанию, но в коллагене костей сохраняется подпись от предыдущего периода молочного питания. Одна особь в возрасте 2+ имеет очень высокое значение $\delta^{15}\text{N}$ – 11.3‰. Возможно, она продолжала питаться молоком на втором году жизни.

Имеются достоверно значимые географические различия между выборками взрослых особей. Значения $\delta^{15}\text{N}$ у медведей Среднего Урала




Рис. 1. Распределение значений $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{15}\text{N}$ (%) в коллагене костей уральского пещерного медведя (*U. (S.) kanivetz*) Северного (синий цвет) и Среднего (красный цвет) Урала разного возраста и больших пещерных медведей Европы (*U. (S.) spelaeus* s.l.). Distribution of $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ (%) values in the collagen of the bones of the Ural cave bear (*U. (S.) kanivetz*) of the Northern (blue) and Middle (red) Urals of different ages and large European cave bears (*U. (S.) spelaeus* s.l.).

(4.5‰) больше, чем у медведей Северного Урала (3.9‰) на 0.6‰. Эти отличия указывают на различие диеты, в нашем случае – на разное соотношение растительной и мясной пищи. На Среднем Урале доля мясной пищи в структуре питания была выше, чем на Северном Урале, но это различие меньше различий между трофическими уровнями [20].

Распределение значений $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{15}\text{N}$ в коллагене костей уральского пещерного медведя практически полностью совпадает с распределением $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{15}\text{N}$ в коллагене костей пещерных медведей (*U. (S.) spelaeus* и *U. (S.) eremus*) Западной и Центральной Европы [1–7] (рис. 1). За пределами распределения находятся 3 особи, две из которых новорожденные (0+) и одна молодая (2+) особь с аномально высокой величиной $\delta^{15}\text{N}$. Это указывает на сходство диеты всех трех видов пещерных медведей – уральского (*U. (S.) kanivetz*) и европейских (*U. (S.) spelaeus* и *U. (S.) eremus*).

Анализ полученных данных показывает наличие значительных возрастных и географических

различий в значениях $\delta^{15}\text{N}$ в коллагене костей уральского пещерного медведя Северного и Среднего Урала. Наблюдается значимый трофический сдвиг между возрастными группами, связанный с переходом от молочного питания к самостоятельному питанию. Имеются географические различия в питании взрослых особей на Северном и Среднем Урале. В составе диеты медведей Среднего Урала была выше доля мясной пищи. Различия значений $\delta^{13}\text{C}$ между возрастными, половыми и географическими выборками не достоверны. В целом, взрослые и полувзрослые самцы и самки Северного и Среднего Урала находятся на одном трофическом уровне, т.к. различия значений $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{15}\text{N}$ (табл.1, рис. 1) не превышают уровня различий между разными трофическими уровнями [20]. Большие пещерные медведи Урала и Европы имели сходный тип диеты.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-24-01025, <https://rscf.ru/project/22-24-01025/>.

БЛАГОДАРНОСТИ

Благодарим музей Института экологии растений и животных УрО РАН за предоставленные для исследования образцы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bocherens H. Isotopic insights on cave bear palaeodiet // Historical Biology. 2019. V. 31. № 4. P. 410–421.
2. Robu M., Fortin J.K., Richards M.P., et al. Isotopic evidence for dietary flexibility among European Late Pleistocene cave bears (*Ursus spelaeus*) // Canadian Journal of Zoology. 2013. V. 91. № 4. P. 227–234.
3. Bocherens H., Stiller M., Hobson K.A., et al. Niche partitioning between two sympatric genetically distinct cave bears (*Ursus spelaeus* and *Ursus ingleseus*) and brown bear (*Ursus arctos*) from Austria: Isotopic evidence from fossil bones // Quaternary International. 2011. V. 245. № 2. P. 238–248.
4. Bon C., Berthonaud V., Fosse P., et al. Low regional diversity of late cave bears mitochondrial DNA at the time of Chauvet Aurignacian paintings // Journal of Archaeological Science. 2011. V. 38. № 8. P. 1886–1895.
5. Pérez-Rama M., Fernández-Mosquera D., Grandal-d'Anglade A. Recognizing Growth Patterns and Maternal Strategies in Extinct Species Using Stable Isotopes: The Case of the Cave Bear *Ursus spelaeus* ROSEN-MÜLLER // Quaternary International. 2011. V. 245. № 2. P. 302–306.
6. Müntzel S.C., Stiller M., Hofreiter M., et al. Pleistocene Bears in the Swabian Jura (Germany): Genetic replacement, ecological displacement, extinctions and survival // Quaternary International. 2011. V. 245. № 2. P. 225–237.
7. Nejman L., Wood R., Wright D., et al. Hominid Visitation of the Moravian Karst during the Middle–Upper Paleolithic Transition: New Results from Pod Hradem Cave (Czech Republic) // Journal of Human Evolution. 2017. V. 108. P. 131–146.
8. Косинцев П.А., Симонова Г.В., Коновалова К.Ю. Первые данные о питании уральского пещерного медведя (Mammalia, Carnivora, Ursidae, *Ursus (spelaeus)*) kanivet Vereschagin, 1973 по результатам анализа изотопов ^{13}C и ^{15}N // Доклады Российской академии наук. Науки о жизни. 2023. Т. 510. № 1. С. 288–291.
9. Гимранов Д. О., Косинцев П. А. Пещерные медведи (*Ursus spelaeus* sensu lato) Урала // Палеонтологический журнал. 2022. № 1. С. 97–106.
10. Rabeder G., Hofreiter M., Nagel D., et al. New taxa of alpine cave bears (Ursidae, Carnivora) // Cahiers scientifiques-Museum d’histoire naturelle de Lyon. 2004. V. 2. P. 49–68.
11. Barlow A., Paaijmans J.L.A., Federica A., et al. Middle Pleistocene genome calibrates a revised evolutionary history of extinct cave bears // Current Biology. 2021. V. 31. № 8. P. 1771–1779.
12. Гуслицер Б.И., Канивец В.И. Пещеры печорского Урала. М.–Л. Наука, 1965.
13. Барышников Г.Ф. Семейство медвежьих (Carnivora, Ursidae). СПб.: Наука, 2007. 542 с.
14. Воробьев А.А. Размеры длинных трубчатых костей большого пещерного медведя Среднего Урала // Современные проблемы популяционной, исторической и прикладной экологии: Материалы конференции молодых ученых; 23–27 апреля 2001. Екатеринбург: “Екатеринбург”; 2001. С. 38–41.
15. Воробьев А.А. Этапы постнатального онтогенеза скелета большого пещерного медведя // Биота горных территорий: История и соврем. состояние: Материалы конференции молодых ученых; 15–19 апреля 2002 г. Екатеринбург: Академкнига; 2002. С. 22–28.
16. Косинцев П.А., Воробьев А.А. Биология большого пещерного медведя (*Ursus spelaeus* Ros. et Hein.) на Урале. Ю.А. Розанов (ред.). В кн.: Мамонт и его окружение: 200 лет изучения. М.: Геос; 2001. С. 266–278.
17. Fosse P., Cregut-Bonouire E. Ontogeny/growth of (sub)modern brown bear (*Ursus arctos*) skeleton: A guideline to appraise seasonality for cave bear (*Ursus spelaeus*) sites? // Quaternary International. 2014. V. 339–340. P. 275–288.
18. Liden K., Angerbjörn A. Dietary change and stable isotopes: a model of growth and dormancy in cave bears. Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences. 1999. V. 266. P. 1779–1783.
19. Chisholm B.S. Variation in Diet Reconstructions Based on Stable Carbon Isotopic Evidence // The Chemistry of Prehistoric Human Bone. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989. P. 10–37.
20. Bocherens H., Drucker D. Trophic level isotopic enrichment of carbon and nitrogen in bone collagen: case studies from recent and ancient terrestrial ecosystems // International J. of Osteoarchaeol. 2003. V. 13. № 1–2. P. 46–53.

**CONTENT OF ^{13}C AND ^{15}N ISOTOPS IN BONE COLLAGEN
OF GEOGRAPHICAL, AGE AND SEX GROUPS OF THE URAL CAVE BEAR
(MAMMALIA, CARNIVORA, URSIDAE, URSUS (SPELAEARCTOS)
KANIVETZ VERESTCHAGIN, 1973)**

P. A. Kosintsev^{a, #}, K. Yu. Konovalova^a, and G. V. Simonova^b

^a*Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russian Federation*

^b*Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems Siberian Branch Russian Academy of Sciences,
Tomsk, Russian Federation*

[#]*e-mail: kpa@ipae.uran.ru*

Presented by Academician of the RAS V. N. Bolshakov

Data on the content of $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ isotopes in the collagen of bones of the Ural cave bear (*Ursus (S.) kanivetz* Verestchagin, 1973) from the Northern and Middle Urals were analyzed. The bones date from the first half of MIS 3. The bones of newborn individuals, individuals at the age of 1 year, males and females at the age of 2 years, 3 years, 4 years and older than 4 years were studied. Differences in $\delta^{13}\text{C}$ values between age, sex, and geographical samples are not significant. With age, the value of $\delta^{15}\text{N}$ significantly decreases, which is associated with the transition from milk nutrition to independent nutrition. The proportion of meat food in the diet of adult bears in the Middle Urals was higher than in the diet of adult bears in the Northern Urals. There are no noticeable differences in isotope signatures between males and females of different ages. The large cave bears of the Urals and Europe had a similar type of diet.

Keywords: Ursus kanivetz, Ural cave bear, Late Pleistocene, Ural, stable isotope, ^{13}C , ^{15}N , collagen